





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1959/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1959/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1959/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1959/A

1959
A
E XII

R. 9. १. २. ३.
 ७. ४. ५. ६. ७. ८. ९. १०. ११. १२. १३. १४. १५. १६. १७. १८. १९. २०. २१. २२. २३. २४. २५. २६. २७. २८. २९. ३०. ३१. ३२. ३३. ३४. ३५. ३६. ३७. ३८. ३९. ४०. ४१. ४२. ४३. ४४. ४५. ४६. ४७. ४८. ४९. ५०. ५१. ५२. ५३. ५४. ५५. ५६. ५७. ५८. ५९. ६०. ६१. ६२. ६३. ६४. ६५. ६६. ६७. ६८. ६९. ७०. ७१. ७२. ७३. ७४. ७५. ७६. ७७. ७८. ७९. ८०. ८१. ८२. ८३. ८४. ८५. ८६. ८७. ८८. ८९. ९०. ९१. ९२. ९३. ९४. ९५. ९६. ९७. ९८. ९९. १००.

ficney de imaginatione



This man

coll. complete

Inguier

56214

FRANCISCI
DV PORT, CRE-
SPEIENSIS VALESII,
DE SIGNIS MORBORVM
libri quatuor.


CVM EIVSDEM AV-
*thoris annotationibus : in quibus signi ,
cuiusque causa traditur.*



PARISIIS,

Apud Dionysium Duvallium, sub Pegaso,
in vico Bellovaco. 1584.

Cum privilegio.





A D I A C O B V M

G V E S L Æ V M, R E G I S I N

S A C R O C O N S E S S V C O N -

filiarium, & generalem eius

cognitorem, Franciscus

du Port, Crespeien-

sis Valesius.



*Merouæo, ceterisque, deinde nu-
merosa serie Gallicis regibus,
paucos admodum, ornatissime
Gueslæ, legimus, in scriben-
do sibi peperisse gloriam. Hoc
ideo contigisse putem, quod
prisci illius seculi principes,
vel de tuendis propagandisque finibus, vel augē-
da religione solliciti: vel etiam otio nimio torpē-
tes, eorum curam non gessere, quorum ingenio
poterant omni seculorum memoria commendari.
Verum, ab eo tempore, quo Franciscus Valesius,
huius nominis primus, tutor, fautorque Musa-
rum, in regnum ascitus est, tantus ad hunc us-*

A ij

PRÆFATIO.

que diem scriptorum in Gallia chorus emerfit, ut illi possint cum fecunda Myrmidonum origine numero contendere. Quorum voluminibus recondendis Ptolemæi Philadelphi bibliotheca non satis ampla sit: nec emendis, ab Alexandro Magno reperta Darii gazæ sufficiat: aut à Paulo quondam Æmilio Persei victi supellex, in Romanum ararium translata. Sed sæpe fit, ut sine numis, sine domo sint, qui literis omnino vacant. Quare prægnantibus librorum sarcina bibliopoliis, paucisque, virorum illustrium scripta legentibus, contingit immensas eorum vigilias intermori: quique syderibus, & calo digni erant, eos Cimmeriis offundi tenebris. Id quidem me sæpius à scribendo deterruit, cogitatem porro quam multi sint ex Parisiensium medicorum, ex quo sum, ordine, qui me non sedulitate, nec industria forsân, at ingenio longè superent. Verùm enimvero, quum ab annis decem Hippocratis aphorismorum opus, à me poema factum, non modo legi audiam, sed etiam non improbari, tentare sum ausus aliud. Quod, quia possit me solo tuente periclitari, maioris cuiusdam indiget patrocini. Poteram equidem ad aulicos, eosque, quos novi, maximi nominis confugere: quorum lanceis, ut Teucer Aiæcis clypeo, tectus, hostium infensa


PRÆFATIO.

sa tela vitarem. Hic verò, non Vulcani, Martisve, sed Palladis arma querenda sunt. In quibus, tam felix faustusque fuit ingressus, mi Gueslæe, tuus, ut primis annis non tyro, sed triarius inter eruditos habereris. Ideo mirentur ceteri, quòd adolescens eam provinciam subeas in supremo senatu Parisiensi, quam senes olim, in iure dicundo plurimum experti, suscipere quondam erubuerunt. Ego, qui mores incorruptos, acumen ingenii, facundiam, linguarum & artium varietatem in te novi, Regis & Senatus censuram admiror, qui summi procuratoris dignitatem tibi concesserunt, dignum spectatae tuæ doctrinæ præmium, & eximiam, licet gravem, ad ciendas in posterum virtutes heroicas cotem. His, ut tibi publicè gratuler, libellos in medicina quatuor, quibus DE SIGNIS MORBORVM nomen imposui, prelo datos, nomini tuo committo, voueoque, pignus amoris erga te mei singulare. Quos, ut spero, Ioannis Gueslæi, præsidis æquissimi, charissimi parentis tui (per quem tu mihi primùm notus es, & olim ad instituendum traditus) unicè commendabit, ac tuebitur authoritas. Titulus quidem operis inauditus non est, sed noua scribendi ratio: & ut noua, sic ardua: quemadmodum agnoscere poterit, quis-

A ij

P R Æ F A T I O.

*quis medicus poeta quid simile fuerit aggressus.
Sed si fructum aliquem ex hisce lucubrationibus
meis est collectura posteritas, illum tibi referat
acceptum, cuius auspiciis fretus, eas in apertum
lucemque profero. Vale. Parisiis, Calend.
Februar. Anno 1584.*





FRANCISCV
PORTCREPEIENSIS

*Valesii, De signis morbo-
rum libri primi*

Proœmium.



¹IGNA, quibus genitos humano
in corpore morbos
Agnoscit Pæon, mihi nunc aperire
volenti

Des animum: siquidē, sine te, Deus
alme, recessus

Corporis illius, cuius ²mirabilis author
Existis, tentare nefas, & nosse prophanum.

Tu solus teneris ³medicam vim suggeris herbis,
Eque mari, tellure, polo mortalibus ægris
Cuncta salutifera largiris munera dextra.

I Quod nostris sensibus obuium, nos in alterius cuiuspi-
am latentis & occulti cognitionem deducit, id signum est.
Quod in medicina necessarium, quia plurimi sunt affectus in
intimo corporis recessu conditi, qui quum nullis sensibus per-
cipi queant, solis signis intelliguntur. Sunt autem genera si-
gnorum omnino triplicia: nempe cruditatis & coctionis, sa-
lutis & mortis, & crisma, seu decretoria. Quorum nonnulla
salubria, ut quæ coctionis & salutis signa sunt: infalubria quæ-
dam, ut cruditatis & mortis: Alia neutra, qualia sunt crisma:
quæ si coctionis signa præcellerint, salutem; sin cruditatis,

A

mortem indicant. Insalubrium alia morbi speciem declarāt, alia sedem affectam, alia morbi causam. Et in vnoquoque genere nonnulla propria sunt & inseparabilia, pathognomonica dicta Græcis, essentiam morbi comitantia: *Quædam* assidentia, & communia. De omnibus his libris agitur.

2 Hoc Galenus, quamvis de Deo perperam sentire vulgo creditus, fatetur multis quidem in locis, sed inprimis opere De usu partium. Id enim dicare se Deo velut hymnos quosdam ait, quod eius sapientiam, virtutem, providentiam, bonitatem admiretur in humani corporis admirabili structura. Cuius contemplationem, perfectæ theologiæ, quæ medicina major est, principium statuit.

3 Quod Apollini, seu Phœbo, qui Sol est physicis, poetæ tribuunt, longè melius id nos astruimus rerum omnium conditori. Quinquam enim utrumque verum est, Solque vim herbis ingentem suo vigore suscitatur, id tamen nec primò, nec per se facit, sed ab eo nactus potentiam, qui verbo condidit omnia. Cuius immensum numen quum ut in hoc opere, sic in omni re nobis, fontibus licet, fore propitium speremus, ab hoc exordiri dignum duximus, eumque medicinæ principem statuere, ministrum autem eius medicum: qui vi mētis & intelligentiæ Divini numinis opera scrutatur, quæque sunt in huius aut illius morborum corporis commodum usumque celsura prospicit, eaque seligit, & nocitura vel segregat, vel ita commiscet, ut interdum ex lethali veneno salubre componat alexiterium.

SIGNA PERFECTÆ SANITATIS.

CAPVT PRIMVM.

QVIS QVIS in arcanum descendit Apollinis antrum,

Phœbigenæque senis sacram festinat in ædem,
Arceat ut querulos hominū de corpore morbos:
Inquirat primū tranquillæ signa salutis.
Namq; salus, scopus est, in quo medicina quiescit.
²Floridus ergo color, ³facilis spiratio, sensus
Integer ac motus, pulsusque sine ordine nūquam
Tactus, & à placido lux non ingrata sopore:
Vesicæque serum, media consistere forma

Quod

Quod solet, & croceo perfundi sæpe colore.
 Idque, quod excludit solers natura per alium,
 Molle, figuratum, nec terri vllius odoris.
 Denique quæque suæ sic libera functio parti,
 Ut dolor in nullos quiuis se porrigat artus,
 Sanorum sunt ista notæ, contraria morbi.

1 Medicinæ duæ sunt primæ summæque partes: vna tuenda sanitatis, altera morbi profligandi. Quorum officia sunt quidem inter se contraria: quum illi sit propositum tueri, huic immutare statum corporis. Sed vtriusque facultatis inueniendæ communis ratio, quum nec sanitatem præsentem seruare, nec amissam restituere possis, si quid ipsa sit, quid morbus, ignores. Ideo nos morborum species suis notis hoc opere distincturi, sanitatis (quæ morbo dignitate prior est ac tempore) signa præmittimus. Sanitas quidem est duplex: optima, quam habitum simpliciter bonum appellat *Galen⁹, & vitio proximè exposita, qualis est Athletarum constitutio. Prioris hoc, posterioris sequenti capite notas exponimus.

* libro de
 optimo
 corporis
 habitu.

2 Floridus color, i. velut ex albo rubroque mixtus, fit à quatuor humorum symmetria. Quanquam enim hic major est quantitas sanguinis, quam vel pituitæ, vel bilis, nullius tamen dominium existit, sed quasi iustitiæ ritu quatuor humores inter se confusi, corpus *εὐκτατον* statuunt. Ideo sanitas inculpabilis, quæ hoc capite describimus, habitus est omnium tutissimus.

3 Quæ sequuntur, trium principiorum optimam constitutionem renuntiant. Sensus quidem ac motus integer, tranquillus ac suavis somnus, cerebri: spiratio facilis, ac pulsus æqualitas, cordis: vrina cum alui fecibus laudabilem nacta colorem & consistentiam, hepatis, & partium naturalium: indolentia verò, & cuiusque partis facultatum integritas, nec intemperie, nec solutione continui, nec alio quouis præter naturam affectu detineri corpus indicat.

SIGNA PLETHORÆ.

CAPVT SECVNDVM.

SANGVIS vbi peccat, venæ² tenduntur, & artus,
 Incessus⁴ grauis est, somn⁹ grauis atq; ⁶pfund⁹,
 Et sudor, ⁷vultusque rubor, ⁸plenusque, ⁹potensque

A ij

Pulsus, & ex minimo sequitur¹⁰ dyspnœa labore.
Vena resecta¹¹ leuat, ¹²tenuis potúsque cibúsque.

** Aphor.
3. libro 1.* 1 Plethoræ, seu plenitudinis nomine, sanguinis, seu quatuor humorum in sanguine contentorum redūdantiam intelligimus. Quæ non præsentem quidem, sed imminentem morbum denunciat. Hinc eorum qui tali plethora turgent (quales Athletæ sunt) habitum solui iubet * Hippocrates.

2 Cum obtuso doloris sensu.

3 Turgentes enim præ copia venæ majores, se in minores exonerant, unde musculosas partes impleri distendiq; cōtingit.

4 In plenitudine vasorum, de qua præsertim sermo hic audiendus est, sanguis omnem venarum capacitatem occupans, p- indeque nec meabilis nec diffilabilis crassescit, & præ pōdere partes inferiores magis affectat. Hinc tibiæ musculi crasso multoque sanguine pleni laboriosius incessum promouent, siquæ spontanea lassitudo.

5 Vaporibus multis ex sanguine in cerebrum à toto corpore meantibus. Qui quū mediocres existunt, placidus obrepit somnus. Sin exuperent, capitis grauitatem, & oculorū dolorem interdum inuehunt.

6 Ob continuum vaporum ascensum.

7 Omnis color, similis humori cujus dominatu corpus tenetur, efflorescere solet, cum in omni cute, tum in facie. Hæc enim quum tenuis raraque sit, vapores sursum elatos prōptius & facilius excipit. Quamobrem in plethora rubet facies, quia sanguis, colore ruber, exuperat.

8 Nam venæ pleniores ex copia sanguinis quem continent, nonnihil per anastomosi transfundunt in arterias, nisi humores admodum crassi viscosique sint.

9 Quum enim multus existat sanguis, multi quoque sunt spiritus. Est namque spirituum materia sanguis.

10 Musculi quippe thoracis ex copia sanguinis pigri respiratio nis difficultatem inducunt. Est autem respiratio frequentior ob usum: minor, quoniam arctatur interna thoracis capacitas.

11 Plethoram soluendo depletionem vasorum.

12 Quo non tantum influit substantiæ, quantum effluit, sicq; plenitudo minuitur.

S I G N A

SIGNA FLAVÆ BILIS EXUPERANTIS. CAPVT TERTIVM.

Si quando superat bilis,¹ color ictericorum
 Assimilis tingit² corpus, cutis³ aret, & ⁴acer
 Tangenti calor est, nec⁵ hypostasis vlla micanti
 Citrinoque subest⁶ lotio, ⁷durúsque, ⁸frequénsque
 Sentitur pulsus, ⁹vehemens, ¹⁰veloxque: ¹¹furoris
 Somnia plena vigent, omnisque¹² excretio bilis
 Vtilis est, ægrumque¹³ leuat: sunt frigida¹⁴ cordi.

** Quo an-
 thore pri-
 mam hu-
 jus dictio-
 nis corri-
 piamus,
 annotavi-
 mus in
 Aphori-
 smu.*

1 Pallidus, flauus, aut citrinus.

2 Corpus quidem omne, sed præsertim faciem & oculos. In his enim partibus color ictericius magis elucet. In oculis quidē ob natium adnatæ candorem, cuius alteratio vel minima visu detegitur: in facie verò ob raritatem ac tenuitatem ejus loci cutis.

3 Ex humoris calidi sicci (ex quo siccum & gracile corpus est) dominio. Cutis autem naturaliter constituta quàm optimè temperata sit, ex carne molli, neruoque duro constans: proindeque duri mollisque, & humidi sicci medium occupa- uerit, excessus cuiusque continuo fit particeps: vt ex eius conta- ctu liceat de corporis vniuersi temperamento iudicare.

4 Bile dominante calor tactu perceptibilis est. Tenuissimus enim is humor facillimè cutim afficit: qui acer est, ob caloris exuperantiam.

5 Crassior vrinæ portio caloris insiti vi secreta, hypostasis est. Quum autem bilis tenuissima sit, ea reliquos humores in cor- pore superante materia crassa vel nulla, vel pauca est. Vnde se- quitur vrinam quæ tunc exernitur, aut nullum, aut exiguum habere sedimentum.

6 Bilis qualitatē retinente sanguinis fero.

7 Ob arteriarum siccitatem. Vt enim carnosæ partes, ita so- lidæ retinent vinctis qualitatibus impressum vestigium.

8 Vsu sic exigente. Quum enim vitalis facultas ab acri multo- que calore lancinetur, frequens requirit refrigerium.

9 Ex acri qualitate biliosi sanguinis, & spirituū vitaliū robore.

10 Bile in cerebrum effusa, cuius calore motuque spiritus fer- uent ac incenduntur.

11 Bilis, si non excernitur, & in cerebro residet, vigilias ex- citat, & deliria, rixarum & iracundiæ plena. Si in ore ventriculi,

A iij

stium, nauseam, inappetentiam, oris amarorem, animi defectionem parit: vt in intestinis diarrhœam, ac dysenteriam. Hæc igitur exuperantem excerni vel sponte, vel cholagogo pharmaco, quale Rheum est, diaprunum, cassia, perutile, morbi metu, qui ex retentione consequeretur, si iam ipsa morbum non facit.

12 Refrigerato corporis habitu.

13 Quia ferocientem bilem compescunt, eam alterando,

SIGNA MELANCHOLICÆ DOMINANTIS. CAP. 4.

F'v s c v s ei color est, nigra qui bile redundat,
Corporis &² gracilis totius, &³ arida moles,
⁴ Horridus aspectus, ⁵ vaga mēs, ⁶ nō garrula lingua,
⁷ Ingenium solers, &⁸ mœror acerbus, &⁹ horror
Exanguis, trepidusque ⁸ paupor, qui nocte silenti
Sæuior insurgit, ¹⁰ spectris & commouet atris.
Sæpe ¹¹ canina viget, ¹² citò nec sedatur orexis
Et ructus sunt acidi, pulsatio ¹³ rara
Lentaque: quodque serum madidis é renibus exit,
Albicat, ac ¹⁴ tenue est, interdum ¹⁵ liuet, & atrum
Cernitur, & crassum. Cibus hinc, qui flatib⁹ implet,
Sit procul: ¹⁶ euchymus tantum laudatur, & illa
Pharmaca sola iuuant, ducunt quæ ¹⁶ nigra per aluū.

1 Obscurus & nigricans, humoris melancholici tenuissima portione è venis in cute effusa. Quod est in Ictero nigro conspicuū.

2 Gracilitatis causæ sunt vicius, & humorum tenuitas, raritas corporum, curæ, digerentis in corpus, vel nutrientis, vel ambarum facultatum naturalis imbecillitas, & intemperies sicca. Postrema graciles facere solet melancholicos, vt & curæ, perpetuò ferè comites.

3 Corpus melancholicorum vtpurimum exuccum est & aridum: quum ejus partes alantur adusto, feculentoque, ideo sicciore sanguine.

4 Non aspectus tantum, sed & vultus melancholicorum horridus est, quia rugosus, ob temperamenti siccitatem.

5 Ob

5 Ob agitationem spirituum animalium. Agitantur verò spiritus à flatibus (quorum in melancholicis maximus est prouentus) ex toto quidem corpore suscitatis, sed potissimum è præcordiis.

6 Sermo, mentis nuncius est ac interpres: sermonis primum organum, lingua. Quum verò melancholicorum mens variarum rerum imagine confusa sit, hique omnia tuta metuant, non mirum, si taciturni sunt, quæruntque latebras, vitantes hominum confortia.

7 Nam intelligentiæ causa siccitas est. Ideoque dicebat Heraclitus splendorem siccum animum esse subtilissimum. Imprimis autè ingeniosi sunt melancholici, qui ab adusta bile contraxerunt habitum.

8 Mœror, est opinio mali præsentis; ut futuri, metus. Vtriusque causæ multæ sunt. Sed in melancholicis, qui hos affectus perpetuò comites habent, vna est spirituum obscuritas. Ut enim spiritus splendidi recreant, speque beant animum: ita caliginosi deiiciunt, sine rerum expectatione meliorum.

9 Spirituum ac humorum à flatibus concitatore motu per sensibilia corpora: vel à refrigeratione sanguinis. Hinc enim horrorem fieri scribit * Hippocrates.

10 Talia sunt, squalidorum hominum, ut victorum phantasmata, mortuorum è sepulcro surgentium fictæ voces, hæque lugubres: fumorum, rerumque nigrarum imagines, & alia generis eiusdem, metus mœstitiæque plena. Quorum causa est fuliginosus aterque vapor ex subditis partibus in mentis sedem irrepens, aut ibi genitus.

11 Ab imbecillo ventriculi calore, cibos mutante quidem at non vincente. Vel potiùs ab excremento melancholico, quod flatulentum est, è liene sese in ventriculum insinuante. Quod quum acidum manet, & in ventriculi superius os effertur, appetentiam ingentem, ut sæpe caninam, excitat. Quum autem corrumpitur, eadem deiicit, atque prosternit. Non autem id citò corrumpitur, quum acidum sit: ideoque melancholici solent esse famelici.

12 Ab intemperie frigida sicca tum cordis, tum corporis arteriarum.

13 Obstructis renibus, aut imbecilla coctione.

14 Lien, melancholici succi copia turgens, exonerat sese per intestina, vel per vesicam. Per intestina quidem, naturaliter: per vesicam verò, veluti modo critico. Quam viam quum affectat solutis obstructionibus, vrina crassa est, insuperque livida, virescens, aut nigra. Qui colores non periculum denunci-

A iij

* libro 1. de
Morb.

ant in iis quibus antè lien intumescēbat, aut alius quispiam melancholicus erat affectus: sed aliquando morbi solutionem, vt in quibusdam experti sumus: alias, malum. Virescens enim & liuidus color imbecillitatem summam natiui caloris, niger extinctionem portendit. Quod certissimum esse putes, si sit, vel præcellerit acuta febris, & tenuis vrina cernitur.

15 i. boni succi, qualis est pullorum gallinaceorum, & Indico-
rū, vitulique caro: panis filigineus, aut similaceus: & vinum, ge-
nerosum quidem ac lene, sed lymphā dilutum. Id enim inter
cibos referre cum * Galeno placet, quum alat citissimè. Adde
quòd, si quibusdam naturis, melancholicis imprimis conducit
vinum. Nam mœrorem discutit, quia cardiacum: & nigrum
aridumque temperat humorem, quia calidum humidum.

* lib. 3. de
Aliment.

16 Quæ melanagoga Græci vocant, qualis est senna: & in du-
rioribus naturis, si vires ferunt, & contumacior affectus est, cō-
fectio quæ dicitur Hamech. Per hæc enim & similia cum dele-
ctu purgantia sublata causa, symptomata conquiescunt.

PITUITÆ SVPERANTIS INDICIA. CAPVT 5.

QVVM pituita grauat, cutis¹ albicat, humet, &
²alget,
Corporis & sese niuea³ pinguedine moles
Porrigit, vrinæ⁴ pallent, meiuntur & albæ,
⁵Mollefcit⁶ paruo lentoque arteria pulsu,
Mens⁷ hebes est, sensusq; grauis, somnūsque, pfund⁹.
Phlegma⁸ subire vias, queis se natura repurgat,
Vtile: conueniunt⁹ calidi potūsque cibi que.

1 Interdum etiam plumbi colorem refert, & liuet, imminu-
to, fereque penitus oppresso calore natiuo ob pituitæ copiam.

2 Qui frigidum & humidum est illius, vt totius corporis
temperamentum.

3 Adeps fit ex pinguiore sanguinis portione per tenues venas
frigidis exāguibūsque membranis affusa, quarum vi olei crassio-
ris instar cogitur. Cuius magnam copiam pituitosi congerunt.
Illis quippe minor est cordis reliquarūque partium calor, quàm
qui humidum pingue, quod in eorum sanguine copiosum est,
posuit

possit resolvere.

4 Si tenues etiam sunt, magnam cruditatem denunciāt: pal-
lidæ quidem, minorem: albæ, maiorem. Aliquando verò crassæ
turbidæq; cum multo sedimento visuntur, ex materiæ pituito-
sæ copia.

5 Ex humido corporis totius temperamento.

6 Paruus est pituita dominante pulsus, ob frigidum cordis,
vt & iecoris, temperamentum: vnde venæ arteriæq; sunt exi-
les, paucumque continent sanguinem. Tardus verò, quia mi-
nima motus arteriarum necessitas est.

7 Humidiore cerebro quàm par sit. Enimuero, si totum cor-
pus ex pituitæ dominio redditur humidum, multo magis cere-
brum, pituitæ fons & scaturigo.

8 Motu naturæ, vel phlegmagogo cathartico: cuius generis
existunt agaricus, electuarius diacarthami, diaphœnicon, &
alia non pauca.

9 Qui contrariis qualitatibus humorem impense frigidum
humidumque temperāt.

HVMORIS AQVOSI NOTÆ.

CAPVT SEXTVM.

CORPV^s aqua prægnās¹ pallet sine flore colo-
lliūsq; cutis nōnunquā² œdemate molli (ris,
Laxatur, digitiq; refert insigne prementis.
³Fluctuat abdomen, turgent⁴ faciēsque, manūsque.
Instar⁵ aquæ lotii color est, &⁶ fluxilis alius.

1 Infiti caloris penuria. Nā humoris serosi copia, refrigeratio-
nis viscerum, præsertimque iecoris, signum est. Quod sic affe-
ctum, minus conficit sanguinis quàm alendis partibus sit satis.
Ideoque remotiores partes (qualis est cutis, ejūsque vicinia) suo
pabulo destitutæ pallescunt: aut obscuro, non viuido colore
cernuntur.

2 Quod vel vniuersam cutim extendit, vt leucophlegmatias:
vel ipsius portionem, vt ascites.

3 Exundante è venis humore seroso in epiptoi, peritonæi, &
intestinatorum spatium. Quod aliquando quidem, non semper
fit: nempe tum, cum ad hepatis vel renum obstructionem con-
tumacem accedit venarum quæ sub abdomine sunt, laxitas.

4 Vniuersum sæpe corpus intumescit in humoris aquosi dominio, sed præsertim manus, itemque pedes, quia natura frigidiores, & à fonte natiui caloris remotiores. Facies autem ob flatulentum spiritum (cuius tum prouentus est) è ventriculo vicinisque sedibus eò delatum.

5 Venosum enim genus aqueo humore scaturit, ob alteratricis iecoris imbecillitatem, qua vera denegatur hæmatosis.

6 Illuc ex habitu corporis aqua confluenta, ob materiæ grauitatem, loci decliuem situm, & sphincteris musculi laxitatem.

FLATVS DOMINANTIS INDICIA. CAPVT 7.

T¹ENSIVI²colum, flatu domināte, dolores
³Ventriculumq; premunt, corpúsq; ⁴per omne
vagentur,

Pit⁵ructus, ⁶crepitúsq; frequēs, ⁷tinnitus & auris,

⁸Palpitat & membrum, ⁹celeri que per aera cursu

Creditur in somnis tonitruve, aut turbine ferri.

1 Flatus dolores creant, quum per membranas neruosa que corpora feruntur, tensionis verò sensum inuehant, quia quum aeris naturæ sunt participes, ideoque tenues ac mobiles, se in poros corporum insinuant, eaque diducunt, ac diuellunt.

2 Intestinum crassum, seu colum, præcipua flatuum sedes est, quorum vi id nonnullis amplissime dilatatum dissectis corporibus vidimus. Cuius interior membrana neruosa est, ideoque flatibus distenta, dolorem inuehit acerbissimum.

3 In ventriculo, sicut in colo, flatus fiunt. Ille enim imbecillius cruditates parit, à quibus spiritus flatulenti suscitantur, natiui caloris inopia.

4 Violentia, & tenuitate flatuum, quibus & corpus rarefit, & carnes interdum finduntur, ait *Hippocrates.

* libro de
flatibus.

5 Flatu per os exeunte.

6 Eodem per sedem elabente.

7 Flatulento spiritu auditus organa, quæ sicca sunt & solida, membranea videlicet, & cartilaginea, feriente.

8 Collecto in membri cavitare crasso vaporosoque spiritu, nec exitum habente.

9 Si flatuosi spiritus celeri blandoque motu cerebri corpus disten-

distendunt, insomnia sunt instar rei currentis aut volantis: sin
agminatim, & vi concurrunt, instar turbinis ac tonitrus.

IMMINENTIS MORBI SIGNA. CAPVT 8.

Si prater solitum¹ macies, aut corpus obesum,
Aut² calor, aut³ grauitas, aut sōnia⁴ plena tumult⁹
Eque⁵ breui somno sopor, aut⁶ cutis vlcere fœda est.
Si sudor⁷ pectus, ceruicem, crura, genuve
Permeat, aut⁸ animus languet, corpusve fathiscit.
Si² dolor aut oculos tenet, aut præcordia, pectus
Aut capitis venas,¹⁰ horrôrve perambulat artus,
Spiritus aut¹¹ grauis est, repetitus &¹² oris hiatus,
Affore prædicas, vel adesse in limine morbum.

1 Quum aliquis plenior est, speciosior, & coloratior quàm
consueuit, suspecta habere bona sua debet, ait * Celsus. Quia, * libro 2.
quum in eodem habitu subsistere, nec vltra progredi possit, ferè capite 2.
retro, quasi ruina quadam reuoluitur. Hic igitur habitus con-
festim soluendus. Peius tamen signum est, quum aliquis contra
cōsuetudinem emarcuit: quoniam in his quæ superât, est quod
morbis demat: in his quæ defunt, nō est q̄ ipsum morbū ferat.

3 Calor, siue sit vniuersalis, seu particularis, noxijs. Vniuer-
salis enim, aut visceris alicujus, præsertimque iecoris, aut cor-
dis intemperiem calidam, aut humoris accensi motum, ac fe-
brem indicat. Particularis verò partis eius quæ calet, alteratio-
nem. Quod de insigni calore sentiendum.

3 Humore multo in musculis cumulado, per fluxionem aut
congestionem.

4 Fumis aut vaporibus calidis cerebrum obsidentibus.

5 Mixtis in cerebro pituita & bile.

6 Quod cacochymiam designat.

7 Sudor, qui nec vniuersalis est, nec criticus, malus. Quum
ergo sudor in pectore, ceruice, genu, coxis particularis exultat,
symptomaticus habendus est, & morbi nuncius, vtpote pleni-
tudinis aut imbecillitatis soboles. de quo scripsit * Hippocrates, * Aphor.
vbi sudor, ibi morbus. 36. lib. 4.

8 Spiritibus interceptis & humoribus compressis à copia.

9 A quantitate, vel qualitate sanguinis: vel à flatibus.

10 Quod signum est vel obstructionis meatuum cutis, vel alui suppressæ. Ex quibus metuenda febris putrida.

11 Ex plenitudine totius corporis, ex qua venarum thoracis tensio sequitur, quæ pleuritidem nõ raro parit: aut pulmonis cordisque calore, ex quo plus sanguinis quàm deceat in eorum venas illabatur, quæ peripneumoniam sæpius inducit: aut à destillatione asthmatis parente.

12 i. oscitatio, ab humiditate ventosa, vaporosove spiritu in musculis inferioris maxillæ contento, ut ait *Galenus.

comment.

5. ad part.

4. libr. 6.

Epidem.

SIGNA FEBRILIS ACCESSIONIS INCIPIENTIS. CAP. 9.

INCIPIT & febris, gelido si frigore corpus
Cōtrahitur, nālúsque ²riget, ³tussisq; recurrit,
⁴Vísq; labat, ⁵capitisq; dolor, ⁶vomitúsq; , ⁷soporq;
Obsidet, atque latens negat ⁸altum arteria motum.

1 Initio febrilis accessionis externæ corporis partes frigent, quia calor cum spiritibus & sanguine fertur ad cor, obsessum à materia vaporeve febrili.

2 Quia, quum sit osseus & cartilagineus, quicquid habet caloris, citissimè relinquit.

3 Tenui pituita decumbente in fauces & thoracem. Eò verò tunc potius inclinat fluxio, quia cerebrum caloris minùs habēs (affluente ad cor sanguine) nec bene coquit, nec retinet. Quod verò non retinet, via declui in fauces pulmonésque decumbit. Adde, quòd cor impense calidum attrahit instar cucurbitulæ quod sibi vicinius est.

4 Vapore febrili in cor illapso.

5 Vaporum è corde in cerebrum metastasi.

6 Humoribus è ventriculi fundo, vicinísque partibus, in stomachum refluentibus. Interdum verò sola fit nausea.

1. de locis

affectû.

7 Refrigerato cerebro, ut vult *Galenus.

8 Accessionis febrilis initio parvus ac contractus est pulsus, isque profundus, quia tum calor intro cogitur, & cor obsessum vitales spiritus per omnem arteriam non æqualiter effundit.

AUGMENTI SIGNA.

CAPVT DECIMVM.

AUGETVR, si frigus abest, tepidoque calori
Cedit, & æqualem² solitus retinere tenorem
Pulsus, inæqualis fieri, maiorque videtur.

1 Calor in incremento mediocris est, nec in omne corpus æqualiter effusus, quia tum natura nō omnes suas copias explicat vt in vigore, in quo de summa rerum decernitur.

2 Ante accessionē. etenim initio paroxyfmi pulsus est inæqualitas, sed non, vt in augmento vigoreque conspicua.

3 Inæqualitas est in febre putrida. Tum quippe systole quàm diastole celerior est, vt putris expurgetur fuligo.

SIGNA STATVS.

CAPVT VNDECIMVM.

SI N vigor est, calor¹ omne tenet, corpúsque peruritur.

Quæq; minora priùs, ea tunc symptomata culmen
Sæuitiæ² summum retinent: perit inque³ vigore,
Viribus aut constans morbum supereminet æger.

1 In statu totum corpus incalescit ex æquo, nisi quum febris superuenit magnis viscerum inflammationibus, aut aliter maligna est. Tum enim inflammationis calor existit adeò vehemens, vt ad se, cucurbitulæ instar, sanguinem attrahat ex vniuerso corpore. Eique qui sic affectus est, exuruntur viscera, partes autem externæ, reuocato in corporis meditullium sanguine, frigent. Quod in acuis (quæ continuæ sunt, non intermittentes) locum habet.

2 In vigore sæuissima sunt omnia, quia tum est incluta natiui caloris morbi que pugna, nimirum in qua,

Aut vincit natura potens, aut victa fathisfit.

3 Æger in pessimo morbi statu moritur: igitur in vigore. Vigor enim est maximum morbi symptoma. morituri verò communia signa sunt morbi magnitudo, concoctionis defectus, & summa virium imbecillitas. Vt contrà morbi tolerantia facilis

(ἐπιρροεῖαν vocāt) pepasimus & virium robur securitatē pollicētur.

S I G N A C O M M V N I A

F E B R I V M . C A P V T 12.

SAEPIVS¹ hīc² capitis dolor est, ⁴ sitis, ⁵ arida lingua, ⁶ singultus, ⁷ inactio corporis, ⁸ aestus, ⁹ (gustus) Nausea, ¹⁰ lapsa quoque vis, ¹¹ vomitus, ¹² priuatio somni, ¹³ Lumborum grauitas, ¹⁴ anorexia, ¹⁵ mentis & error, ¹⁶ Improbus & gustus, ¹⁷ inala deglutitio, ¹⁸ ventris Profluuium, ¹⁹ dyspnœa, ²⁰ rigorque, ²¹ oppressio, ²² sudor.

1 Hæc quia simplicia signa non sunt, sed grauissima symptomata, quæ sæpe curationem in se cōuertunt, eaque multis febribus communia, de his hoc libro signis morborum vniuersalibus explicandis destinato scribimus, febrium signa specialia distinctius secundo libro tradituri.

2 i. in vigore.

3 Ex subiectis partibus vapore, vel tenuiore sanguine è venis maioribus sursum elato.

4 Interiore ventriculi tunica vel exiccata calore, vel imbuta nitroso quodam, & acri calidoque humore.

5 Ab aestu, vel acri calidoque vapore: cuius magna vis esse cognoscitur, quum lingua scabra fit.

6 Ab inanitione, vel repletione. Interdum etiam humoris corrupti, ventriculi tunicis impacti, acrimonia: vel eiusdem malignitate, qualem pestilens febris inuehit.

7 Turgente in venis materia, & huc illucque delata: vel cæca malignitate cor obsidente: vel aestu, vel oppresse.

8 Vapore quoquoersum expanso. (triculum.)

9 Vapore, vel humore, vel infesta qualitate lacescente ven-

10 i. λεπιδινία, seu deliquium animi. Cuius causa est, perniciēs febrilis humoris, vt æruginosa, vel prassina, vel atra bilis, ventriculi os, præcordiorumve membranas acriter vellicans. Aut symptomatum vehementia, vigilia, dolor, tumor, immodica repentinaque vacuatio: vel tenuis victus ratio.

11 His prægnante ventriculo, quæ aut mole sua grauant, aut mordacitate cōtristant.

12 Calido acrique vapore cerebrum exiccante, & supra modum attenuate, dissipanteque spiritus: Vel qualitate perniciose cor ob-

obterente: vel æstu, oppreffione, fiti, dolore: Denique causa quauis somnum interpellante.

13. Materiæ febrilis portione in venam cauam, aut maiorem lumborum arteriam decumbente: vnde lumborum renūque non rarò dolor insurgit, pondere ibi diutius consistente.

14. A causa multiplici, sed à calido præsertim ventriculum offendente. Calor enim solida corpora laxando dissoluit, & ad attractionis functionem, quæ deficit in *anapæzia*, reddit imbecilliora. Humida verò fundendo supra modum extendit. Aliàs cibi fastidium fit, corrupto vapore in stomachum expirante: vel infensa qualitate eò se inferente.

15. i. delirium, feruida bile cerebrum obsidente.

16. Gustus deprauatur, quum os linguaque perfusione bilis amarefcit, aut humoris corrupti substantia vaporéve polluitur.

17. Deglutiedi difficultas est, quum aliquis vapor crassus, aut pituita caloris vi siccescit in faucibus & ore ventriculi, viamque cibo saluæque reddit angustiorē.

18. De cuius causis infra, cap. 15. partic. 22.

19. Spirandi difficultas in febribus fit ex præcordiorum oppreffione, cordis & pulmonum æstu, bile & putredine ibi genita, vel è venis eo procumbente.

20. Calidus ac putris humor extra venas conditus si plurimus est, isque vehementer acer, ac mordax, & impetu magno in præcordia excussus, eorum membranas feriat, rigorem adfert: horrorem, si is minùs acer est, & minore copia. Sin paucus, & lentè languideque mouetur cum acrimonia minima, frigus inuehit. Est autem rigor, vt horror & frigus, febris intermittētis symptoma.

21. Ab ardore bilis prassinæ vel æruginosæ circum cor exæstuantis: Vel eiusdem in præcordiis aut visceribus firmatæ, ac ventriculum, diaphragmaque prementis copia: vnde præcordiorū distentio, & in contactu pressuque dolor.

22. Sudor, est humoris serosi per spiracula cutis excretio. Qui quum affatim, per totum corpus, in accessionis febrilium intermittentium fine, seu declinatione, in continuarum crisi, vacuata crassiore, coactaque reliqua materia profunditur, naturalis & salutaris est: aliàs symptomaticus, & præter naturam.

SIGNA DECLINATIONIS.

CAPVT DECIMVM TERTIVM.

HINC ardor febrilis¹abit,²placideque mouetur
Pulsus, & humores victrix natura³gubernat.

** libro de
rat. vult.
in acut.* 1 Perspirante caliditate, mediumque corporis relincente.
Quo tempore cibandum ægrum præcipit Hippocrates. Signū
verò potissimum ait, quum calor ad eius pedes descenderit.

2 i. naturaliter, dyastole systolen æquante.

3 Nam exclusa materia per crisin, quæ fit in vigoris fine, nihil
hostile suo sinu clausum natura continet. Quare, quum prouida
solersque sit, ordine sic cuncta moderatur, vt raro quis in declina-
tione videatur occumbere, nisi morbus alius priori succedat.

SIGNA MORBI SALVTARIS.

CAPVT DECIMVMQVARTVM.

TVM speranda salus, cūm paulum crura reducēs
In dextrum læuūque latus cōuertitur æger,
Atque die vigilans vmbrosa nocte quiescit.
Cūm fera vis morbi, dyspnœa, febrisque remittit,
Sputaque liberiùs calido de pectore cedunt,
Et quatiunt madidum sternutamenta cerebrum,
Cūm calet, & molle est corpus, sudorque per omne
Spargitur, ardorem soluēs. hypochondria quādo
Mollefcūt, nec in his dolor est: cū ventris habetur
Plana cutis, bilisque vnā, pituitaque fertur
Per vomitum. Nec spem, matulæ conclusa, minorē
Hæc vrina dabit, cuius sit hypostasis alba,
Læuis, & æqualis. Sic excrementa leuamen
Significare solent, decliuem missa per aluum,
Mollia si fuerint, connexa, & ruffa colore.

1 Hyperbolica figuræ, quæ nimium extensis neruis fiunt, do-
lorifica: doloris autem expertes, quæ medium situm habent.
Posterioris generis est crurum, vt ceruicis & manuum reductio
mediocris, validam indicans animalem facultatem, ideoque
morbi securitatem ægro pollicens.

2 Facultatis eius robore, quæ corpus per musculos mouet.

3 Vigiliæ diurnæ salubres. his enim & spiritus animales illu-
strantur ab aere diei luminoso, quiq; per somnum immobiles &
crassi redditī sunt humores, perspirabili cute digeruntur. So-
mnus item

mnus item nocturnus sanitatis signum est, quia spiritus animales reparat, & humores concoquit, calore in corporis medullarum seu fundum reuocato, qui per vigilias & diurnum aeris splendorem externam corporis faciem seu cutim affectabat.

4 Humor ferocia naturæ vi retusa.

5 Pectore partibusque in eo contentis temperiem suam seruantibus.

6 Febris intermittens secunda est. Etenim in intermissione natura cibos admissos concoquit, unde noui spiritus fiunt, ex quibus vires febrili calore debilitatæ refarciuntur.

7 Facultate cum vitali, tum animali robusta: & humore per pepasum reddito blandiore.

8 Quæ coctionem indicant, & robur excreticis in cerebro facultatis. Ideoque laudantur in omnibus, exceptis pulmonum affectibus.

9 Optimum est, si corpus omne calidum æqualiter ac molle sit. arguit enim hæc *ὑγίαι* optimam corporis constitutionem, cuius in humido calidoque sedes est.

10 Sudor per vniuersum corpus effusus, febrimque perfectè submouens, bonus. Affectum enim, eiusque causam sublata indicat.

11 Præcordia si mollia sunt & æqualia sine dolore, partium subiectarum, vt abdominis musculorum, mesenterii, lienis, hepatis, ventriculique temperiem renūciant: vt intemperiem, nempe phlogosin, aut phlegmonem, aut scirrhum, aut flatum, si tenduntur, attolluntur, obdurescunt.

12 Venter planus & æqualis est, quum omnes abdominis musculi suam *εὐκαρίαν* retinent: quorum robore facilius ab alio faeces excluduntur.

13 Vomitus pituita bilisque quammaximè permixtus ab Hippocrate laudatur, quia contrarius humori sincero omnium deterrimo. Nam syncerus humor si bilis est, caloris: si pituita, frigoris exuperantiam indicat. At pituitæ permixta bilis, ex calido frigidoque temperiem (in qua naturæ consistit essentia) denūciat.

14 Omnis hypostasis, humoris copiam designat: cocti quidem, si fuerit alba, læuis, & æqualis, unde morbi securitas: crudi verò, quæ ab his qualitibus defecerit. Alba quidem est ei tribuente natura colorem solidarum partium, nempe venarum & arteriarum quas permeat: læuis & æqualis, asperitate caloris vi domita.

15 Deiectio mollis, id est, nec impense liquida, nec dura nimis: itémque cohærens, bona. nempe quæ partium, unde manat, indicat temperiem.

16 Bile cœcæ felle intestina præterlabente. Quam in hunc

vsus natura destinavit, vt excrementa viscida crassaque diutius
in intestinis stabulantia per aluum excluderentur, eaque quasi
natio clystere proluerentur intestina.

SIGNA MORBI PERICV-
LOSI. CAPVT XV.

CORPORIS extremas in acuto¹ algescere partes,
Carnosumque genus subito² macilescere, pusque;
³Excerni, ⁴residere, viget cum morbus acutus,
Aut ⁴pulmo affectus premitur, sudore profuso
⁵Horrere, & ⁶vigilare nimis, cogitve sopore,
Dentibus humorem viscosum glutinis instar
⁷Affigi, ⁸fieri singultum, oculosque rubere
Post vomitum, à somno⁹ metuisset, ¹⁰cubare supinū
Cruribus expālis, manibusque, ¹¹hypochondria tēdi,
Cum capite¹² esse manus calidas, dū frigus utrique
Sentitur lateri, ventrique: dolore perenni
¹³Urgeri, mentēque, febre¹⁴incipiente, moueri
Sede sua, prauum. Nec damna minora minantur
¹⁵Inuitæ lachrymæ, ¹⁶febris irrequieta, ¹⁷frequēsq;
Spiritus¹⁷ & vehemēs, vomitus¹⁸ syncerus, & ¹⁹albū,
Si lædit phrenesis, lotium: & quod²⁰ furfuris instar
Aut fli sedimen retinet, penitusque²¹ repressā
Aluus, & in febre²² nimio furibunda fluore.

1 Concepto in visceribus incendio.

2 Colliquato per igneum calorem hoc humore secundo, qui carnis molem constituebat.

3 Pus, signum malum est, abscessus videlicet in thorace. Materiam tamen purulentam excerni bonum. Vindicatur enim pulmo (siquidem est expectoratio laudabilis) ab exesione, quæ aliis intra quadraginta dies contingeret.

4 In morbi vigore citra proprium pulmonis affectum erectū sedere velle, signum est inquietudinis, aut delirii. Qui enim bene morbum tolerat, immotus potius cubare cupit. In pul-
monis

monis autem affectu, malum quidem signum est, inflammationis nimirum tum eius, tum cordis. at ægro minus hac, quam alia figura stare molestum. Sic enim pulmo se magis explicat ad aeris attractionem, indeque maius refrigerium.

5 Ex sudore horror, malum. horror enim sudori superveniens indicat aliquid superesse materiæ morbificæ: itaque sudorem fuisse decretorium non decernens. At, ait * Hippocrates, de- *libro 2:*
cretoria quæ nō decernūt, partim pñiciosa sunt, partim *de morbis Epidem.*

6 Ex intemperie sicca primi sensorii, seu cerebri: vel siccis & *scit. 2.*
biliosis humoribus eo delatis, vigilæ sunt. Sopor contra frigidā intemperiem agnoscit, nempe crassos & pituitosos succos, cerebri, pituitæ primarium fontem, opplentes.

7 Pituita vi caloris exiccata. Quod est vehementis febris indicium.

8 A vomitu singultus, & oculi rubicundi, malum. Nam utrumque ventriculi vel cerebri, sed rubor oculorum cerebri potius inflammati signum est.

9 Metus à somno, malus. Significat enim fumorum præsertim melancholicorum copiam, aut *κακοχρεται.* Quam si natura superare per somnum (quo tempore calor intus est vegetior) nequit, multo minus per vigilias.

10 Talis decubitus fit motrice facultate languida, si nō ita cubare solitus est æger, nec facilè in utrumque latus convertitur.

11 A flatibus, vel phlogosi, vel tumore aliquo præternaturam, vel intemperie sicca partium subiectarum tenduntur hypochondria, eaque vel sine dolore, vel cum dolore. Si cum dolore, viscerum est inflammatio. Sin sine dolore, sanguinis eruptio per nares est expectanda, * Galeno.

12 Exoluto in visceribus nativo calore. Quod in perniciosis paroxysmorum inflammationibus fieri cōtingit, disfluente unā ** comment. ad part. 55 scit. 2. lib. 1. Epid.*
cum aliis in corpore etiam febrili calore, quemadmodum animaduertit * Aetius.

13 Materia quæ morbum facit, sensibilia corpora perpetuò ** retrab. 2. sermon. 2. cap. 56.*
lancinante.

14 Initio morbi delirium fieri, malum, quia metuenda phrenitis in statu.

15 Hic inuitæ lachrymæ sunt, retentrice facultate debili, non ab orgasmo, ut paulo ante crisin.

16 Nulla febris continua leuiter terrere debet. Ea namque primigenium humidum depopulatur, nullumq; relinquit tempus idoneum, quo attritæ vires per cibum instaurari queant.

17 Partibus quæ thorace continentur, affectis phlegmone.

18 Nam syncerus quivis humor præter sanguinem exclusus,

** commet.* prauam, ait ** Galenus*, indicat affectionem.

*2. in Pro-
gnostic.
part. 47.* 19 In phrenitide albicans vrina significat biliosum humorem in cerebrum rapi, indeque febrem, (quæ symptomatica tum est) augeri. Si febris est phrenitidis expers, & cum alui fecibus albet vrina, phrenitis metueda. Vrina porro candida sine febre, soboles est obstructionis & cruditatis, ideoque semper mala.

20 Quum in hypostasi surfures filæ cernuntur, flammeo febris calore solidæ partes attinguntur, atque tabescunt. Si febris non adsuit, vesica tantum afficitur.

21 Quæ nota est immodici ventriculi, vel iecoris, vicinarumque patrum caloris humidum absumentis.

22 Ani profluuium cum febre perniciosum. Illud enim spiritus excludit, exhaustiq; febris autem eosdem assat & absument. Fit autem ab intemperie calida humida, vel bilis erumpentis copia, vel languida retentrice, vel humorum è superioribus partibus decubitu, vel acri quavis materia ventriculi os inferius lancinante, vel copia ciborum grauante, vel denique maligna qualitate quam cæli constitutio pestilens inuexit, aut induxit humorum potredo.

S I G N A M O R B I L O N G I.

C A P V T D E C I M V M S E X T V M.

SI N minùs hæc noceant, morbi mora longa sequetur.

Cuius erūt hæc signa: calor ¹modò corpus habebit, Nunc frigus, sudorve fluet ²cum febre, colorve Vnus & alter erit, nec fiet ³marcidus ager.

⁴Quæ modò pura fuit, bullas vrina refundet, Albæ subsident, & ab illis rubra sequentur, Rubraque quæ fuerat modò, fiet hypostasis alba.

1 Quum calor & frigus in agro corpore sibi succedunt, signum est variarum affectionum. Quas quia natura non potest vno tempore subigere, morbum fore longum necessario colligendum est. Idem existimandum de coloris in morbo vicissitudine.

2 Sudor qui febrem non soluit, materię copiam subesse testatur, quæ non concoqui, nisi mora, potest.

3 In omni morbo natius calor atteritur, & imminuitur, nec

finis-

sufficiens sit alimenti in omne corpus distributio: vnde contingit carnosas partes consumi. Quum igitur morbi spatium corpus aut non, aut parum emarcuit, morbi diuturnitas expectanda. Humores enim qui vitium faciunt, crassi, lentique, vel multi sunt, nec facile, nec citò dissipabiles.

4 Urina quæ modò pura est & naturalis, modò bullas habet, aut maculas in superficie, quæve in fundo sedimentum nunc album ac læue, moxque rubrum deponit, iure morbi diuturnitatem accusat. Quòd enim interdum pura cernitur, interdum albam ac læuem habens hypostasim, signum est naturæ roboris, & coctionis alicuius materiæ. Quòd deinde bullas, aut maculas repræsentat, aut in imo rubet, argumentum est peccantis humoris: quem quum natura non dum aggressa sit, a deus peccatum tempus requirit.

·SIGNA FVTVRÆ CRISEOS.

CAPVT DECIMVM SEPTIMVM.

ANTE crisin currens variis nox aspera signis
Proditur, vt ²capitis, colli, stomachiq; dolore,
³Comate, ⁴dyspnœa, lachrymis non spòte profusis,
⁶Obtuso sensu, ⁷speculis lucentibus, auris
⁸Tinnitu, ⁹motu labii, ¹⁰lotioque retento:
¹¹Præuenit & tempus solitum, fræuòque rigore
Feruorem ingeminans accessio territat ægrum.
Hinc ¹²salit & clamat, vigil est, delirat, anhela
Conficiturque siti, ¹³nec spem putat esse salutis.

1 Quæ sunt ex orgasmo materiæ noxiæ naturam impetentis crisima, seu iudicantia signa vocata.

2 Turgente in his partibus materia morbifica.

3 Ex humorum, aut vaporum copia, cerebri ventriculos imbuente.

4 Obsesso corde, nec bene se ab excrementis fuliginosis expediente.

5 Turgente in oculis materia per orgasmum.

6 Propter obsessionem primi sensus, nempe cerebri.

7 Interdum etiam rubris, vel obscuris. Lucentibus quidem

B iiij

(εἰς μῆνιν καὶ ἀσπλῆν) ἀσπλῆν καὶ τεννικατέque spirituum influentium in oculos. Rubris, ἀ sanguinis spirituosus in minimas oculorum venas illapsi copia. Obscuris, ἀ fumis circumdiscurrentibus, unde scotodinia, seu tenebrosa vertigo.

8 De eius causa cap. 7. partic. 7.

9 Tremulo, ex concussione nervosi generis.

10 Obliqua peculiaris muneris natura in humore noxio propulsando, vel eadem oppressa supprimitur lotium. Quod utrum sit, cognoscitur ex praecedentibus coctionis aut cruditis signis.

11 Paroxysmus criticus anticipare solet ob coctiorem humoris motum. Humorem vero concitat uterque calor, natus, & adventitius: ille quidem, ut excludat noxium: hic, ut naturam opprimat.

12 Quae sequuntur, signa sunt vigoris accessionis criticae. in cuius declinatione libera sequitur & liberalis excretio, si crisis salutaris est, ut saepius accidit. Nam, ait Galenus, ex aegrotis plures servantur quam intereat: nisi pestilens sit caeli constitutio.

** commēt.
ad aphor.
13. lib. 2.
Aphorif.*

12 In tanta coctione naturae cum morbo de vita diffidit aeger, & familiares eius calamitatem deplorant. Sed medicus prudens terreri non debet, verum intrepidus spectator esse fabulae, si praeviderit concoctionem, quae criseos accelerationem, & salutis certitudinem indicat, a qua nullum unquam se vidisse qui perierit, cum Galeno prodit Aetius.

** 1. de Cris-
ibus.
* retrab. 1.
serm. 1.
cap. 24.*

SIGNA MALÆ 'CRISEOS.

CAPVT XVIII.

I²LLA quidem, veniunt si forsitan ³indice nullo, ⁴Atque suis malè se purgavit faecibus alvus, Sputa malè & pectus reiecit: ⁵aquosaque renes Crassave, temporibus aut nigra, aut foetida primis Deiecere, & vis moribundis viuida membris Nulla micat, crisis est, ⁷subiti sed plena pericli.

1 Crisis vel simpliciter & absolute, vel cum adiectione dicitur. Cum adiectione quidem, in melius peiusve mutatio Simpliciter verò, praecipue ad salutem mortemve transitus. cuius notas hic exponimus.

2 Cruda quae sunt, & incocta, inque malos abscessus conuersa, cri-

criseos frustrationē aut dolores, aut diuturnitatē, aut mortem, aut recidivas indicant, inquit *Hippocr. Ergo si cruditas præ-
1. epidem. sect. 2.
 cesserit, & superiori capite commemorata signa superueniunt: mala crisis est, eò periculosior, quò magis vires languerint.

3 Natura salutarem exitiosamq; crisin indice quodā die præmonstrare solet, siquidem toto morbi spatio cum causis noxiis dimicat. Quum ergo crisis nullo die præuisa contingit, lethalis est, quia nulla prius apparuit nota naturæ contendentis.

4 Signa cruditatis, ideoque criseos improbæ sumuntur ex vrinis, secessibus, & sputis. Vrinis quidem tenuibus, crassis, aquosis, nigris, & graueolentibus. Secessibus verò frequentibus, albis, pallidis, vehementer ruffis, virentibus, spumosis, viscosis, nigris, liuidis, pinguib*, fœtidis, æruginosis, prasinis, rametosis, biliosis, cruentis. Sputis deniq; pleno gutture feruentibus, nec eductis ex facili, sincere flauis, albis, viscosis, ac rotundis, viridibus, pallidis, spumosis ac nigricantibus, vt notat Hippocrat. in prognost.

5 Vrinæ aquosas interpretatur *Galenus pelluentes, seu tenues albas: quæ sunt maximæ cruditatis indices: vt humorum excessus, crassæ: fœtidae, putredinis: extinctionis natui caloris, nigra.

* cōment.
 ad aphor.
 72. lib. 4.
 aphor. &
 1. de Cris.

6 Primis morbi temporibus, principio nēpe, vel incremento, signa cruditatis apparere solent in mala crisi, quum ea veros dies crissimos vt plurimum anticipet. vt, in acutis rarò septimo, non rarò sexto comparet grauissimis stipata symptomatis, eaq; planè funesta. Quo fit, vt sextum diem (pessimum decretorium) tyranno Galenus assimilet.

7 Lethalis crisis magis est subita, quia fit natura minimū repugnante, crudaque (quæ quouis est morbi tempore) materia: Secura verò non æquē præcept. Natura namque tum occupatur & moras agit in humore noxio subigendo coquendóque.

SIGNA BONÆ CRISEOS. CAPVT XIX.

T V T A crisis fiet, critica si luce movetur,
 Si vires adsunt, & blandi signa pepasmi.

1 Dies critici sunt tertius, frequens in peracutis, quartus, septimus, nonus, vndecimus, decimusquartus, decimusseptimus, & vigesimus, ceterique quaternario septenarioque numero comprehensi ad quadragesimum, à quo die rarò crises fiunt, in-

B iij

* *cōment.* quit * Galenus. Crisis autem citius aut serius ventura cognoscitur ex morbi more, specie, & paroxysmorum circuitu. Sic febres, quæ malignæ sunt, quæque cum signis securissimis progrediuntur, quarto die, vel antè desinunt: pessimæ verò, quæque lethalia signa præ se ferūt, quarto die, vel prius, ægrum tollunt è medio. Et ex febribus tertiana celerius iudicatur quàm quotidiana, quia bilis citius, tardius pituita mouetur. Vtque paroxysmi festinauerint, & pristinam horam anticipauerint magis, ita citius indicationem affore significant. Sin pigrè moueantur, & in longius tempus extendantur, sera vel nulla crisis expectanda.

2. A viribus indicatio petenda semper est, cum vitam vel ipsas esse vires, vel ei actiones necesse sit, vt monet Gal. 9. Meth.

3. Pepasimus, vîtriciis naturæ signum est, ideòque crisis est optima, quæ præcurrentibus coctionis signis aduenit. Hæc verò petuntur ex urinis, secessibus, & sputis laudabilibus. Sputis quidem citò facileque expectoratis, ac dolorem sedantibus. Secessibus verò solitis horis egestis spissioribus, subfulnis, nec graucolentibus. Urinis denique lænem, albam, & æqualem habentibus hypostasim in consistentia mediocri, coloreque subaureo flauoque.

SIGNA MORTIS.

CAPVT XX.

A T lethale malū est, cum tēpora lapsa, cauique
Sūt oculi, nares acuuntur, & vtraque lāguet,
Versaque leniter est extremis partibus auris,
Tensa que durior est frontis cutis, & color ater,
Cum fugiunt oculi lumen, pituitaque canthis
Hæret, & extantes venæ pallore tenentur,
Palpebra nec iuncta est, tunica videatur vt album
In somnis. Lethale quoque est, resoluta iacere
Labra, videre nihil, nec quicquam audire, sopitum
Semper hiare, pedes gelidos pendere deorsum.
Nec minús horrendū est vlcus cum liuet, & aret,
Cruraque cum manibus nudatur, & vltima friget,
Spiritus efflatur gelidus, palæque leguntur,
Et dolor à coxis veniens in viscera transit.

I Si-

1 Signa, quæ quatuor primis versibus commemorantur, imminens exitium portendunt morborum acutorum initiis, si nec inedia, nec alui profluuium, nec alia quævis immodica vacuatio, nec vigilæ præcesserint. Aliàs minus, sed graue tamen periculum denunciant.

2 Obinopiam natiui caloris, quo destituti crotaphitæ musculi necessario consumuntur à calore febrili, si morbus acutus est: aut contabescunt, si longus.

3 Ossea quidem superflue, sed consumpta carnea substantia. Carnea verò moles citò consumitur ob calidam & humidam, ossea non item, ob frigidam siccamque temperiem.

4 Nares citius à calore nativo destituuntur, quia cartilagineæ, proindeque naturali constitutione frigidae.

5 Ob siccitatem & refrigerationem conuulsio sequi consuevit. Quum autem aures natura frigidae siccaeque sint, ideo sub mortem febrili calore redditæ sicciores, & natiui caloris penuria frigidiores, conuelluntur.

6 Cutis frontis, minimum carnis habet, ideoque promptissimè in acuta febre siccescit, & siccitate tenditur duriorque fit.

7 Faciei color in nigrum vergit refrigerato sanguine. Si verò pallescit, malus quidem, sed moderatior affectus est.

8 Imbecilla videndi facultate.

9 i. sordes pituitosum excrementum referens, à coëctricis oculorum facultatis imbecillitate.

10 In oculorum angulis hærent sordes potius quàm in adnata tunica. Illi namque rugosi sunt: hæc æqualis & lubrica. Sordes autem excrementum est semicoëcti alimenti, nullum interdum indicans periculum, vt in ophthalmia. Sed in acutis (vt hîc) accidentibus aliis signis lethalibus, imbecillitatem portendit regentis oculum facultatis naturalis, quæ coquere nequit alimentum.

11 Quum pallent, aut liuent oculi venæ, refrigerationis sanguinis; quum nigrescunt, extincti natiui caloris sunt indices.

12 Musculis, qui palpebras mouent, conuulsis ob siccitatem. Minus autem horrendum, si æger ita somnũ capere cõsuevit.

13 Languida motrice facultate.

14 Intereunte facultate sensifica.

15 Imbecilibus os claudentibus musculis.

16 Extincta facultate quæ corpus regit.

17 Aut etiam pallet, venularum, quæ vlceri adiacent, marcescente sanguine: bilioso quidem, cum pallet vlcus: atrabiliario potius, cum liuet.

18 Altrice facultate debili.

19 Quod inquietudinis est signum .

20 Calore tantum hærente circum viscera: quod intelligitur, si venter & latera calida sunt . Aut eodem emortuo: quod expiratione frigida cognoscitur .

21 Exhalantibus ad vasa, quæ oculis inseruntur, vaporibus, & sic in pupilla hæretibus, ut ob crassitiem, visorium splendorem, seu spiritum per se debilem foras egredi prohibeant, & imaginatione læsa putent ægri se vel in veste, vel pariete, vel alio similia corpuscula cernere, qualia sunt hæc, quæ in pupilla conserunt. Hoc autem phrenitidis signum est aduentantis aut præsentis, si contingit in morbi vigore . Sin emorientibus facultatibus, extinctionis spiritus animalis certissimum indicium .

22 Quod naturæ prostratæ certum est argumentum . Nam, quandiu natura superior, tandiu vitium à partibus nobilioribus detrudit in ignobiliores, nec vnquam permittit ab his in illas anadromen fieri .

LIBRI PRIMI FINIS.



DE SIGNIS

MORBORVM

liber secundus.

SIGNA CAPITIS AFFECTVVM VNIVERSALIA. CAP. I.



VVM ¹dolor est ²capiti ³mordax, va-
por acer abundat.

Quum grauis, humoris signatur co-
pia, pulsus

Arguit ⁴ardorem: si ⁵sola est ⁶tensio,
flatum.

Tensio sin grauis est, ⁷membranis humor inhæret
Plurimus, vt pulsans in eis notat esse calorem.

¹ Dolor, morborum ferè omnium assiduus, ac nimium fi-
delis comes, tristis ac molestæ rei sensus est: cuius causa, inæ-
qualis intemperies, & solutio continui à ^{*}Galeno statuitur.

² De cuius, vt & thoracis affectuum signis agimus hoc libro.

³ Vel in capite genitus, vel aliunde affluens. Acer autem, ero-
dens, ac perforans dolor est à bile, membranas, sensus eximii
partes, vellicante.

⁴ Arteriis tenui biliosoque sanguine, spiritûque distentis.

⁵ i. sine grauitate, pulsûque.

⁶ Quæ fit, cum humida flatulentâque substantia tanta est, vt
à parte, quæ hanc continet, capi nequeat.

⁷ Omnis capitis dolor in membranis est. Hic, aut externus,
aut internus. Si externus, afficitur pericranii membrana, do-

** lib. 2. de
loc. affect.
capite 1.*

torque sentitur in radicibus capillorum, qui pressu redditur acutus. Sin internus, nimirum intra caluam, cerebri meninges intemperiem contraxere.

SIGNA PHRENITIDIS.

CAPVT SECVNDVM.

DELIRANT ¹cum febre quibus manifesta ²phrenitis.

Affore quam, vel adesse docet ³priuatio somni,
Vel ⁴somnus varia turbatus imagine rerum,
Ex ⁵miti fera vox, ⁶squal lens, & ⁷lippus ocellus,
Effundensque acres lachrymas, venaque ⁸tumentes
Sanguine, per nares ⁹stillans cruor, ¹⁰aspera lingua
¹¹Garrulaque, ¹²exiguus potus, ¹³collectio vana
Floccorum, pulsusque ¹⁴frequens, durusque, celerrq;
Vrinae ¹⁵niueus color, & ¹⁶spiratio rara.

1 In phrenitide, perpetuum est cum febre delirium. Distinguitur tamen phrenitis à simplici delirio. Id enim tantum in vigore febrium ardentium suscitatur, earumque symptoma est. Phrenitidis verò delirium, non symptoma, sed causa febris: ideòque quandiu phrenitis, tandiu viget delirium, & contra. Differt porro phrenitis à melancholia, maniaque, quòd hæc deliria quidem sunt, sed febris expertia: Phrenitis verò, delirium febris particeps.

2 Phrenitis, est cerebri & membranarum eius phlegmone. Quæ diuiditur in exquisitam & spuriam. Illa cerebro primario laborante contingit: hæc per consensum diaphragmatis, vitium suum in cerebrum transmittentis facile, quum sit eius substantia plurimum nervosa, membranosaque.

3 Bile, causa phrenitidis cerebrum occupante.

4 Somnus turbulentus hic fit, non à flatibus, vt in melancholia, maniaque, sed ex biliosi vaporis, aut sanguinis acrimonia, calore, motu.

5 Ex miti ferox responsio phrenitidis signum est, nepe bilescens sanguinis in cerebro. Nonnunquã vero phrenitici prius feroces, placidi deinde sũt, vel metu quo refrigescũt spiritus, vt cum

VIN-

vincula proferuntur, vel sedato bilis paroxysmo.

6 Ab imbecillitate spiritus animalis, qui plurimus exhauretur per vigilias & febrem.

7 Adnata oculi tunica phlegmonen patiente propter imbecillitatem visorii spiritus, sanguinis venularum assidentium copiam & acrimoniam.

8 Per inflammationem venarum cerebri.

9 Erosa potius ab acrimonia sanguinis, quam aperta vena.

10 Appulsu fuliginis, unde lingua quoque nigricat.

11 Ob bilis humoris subtilissimi motum, multæ se phreniticis offerunt imagines, quas quoniam hi sermone conantur exprimere, in loquacitatis vitium incidunt.

12 Phrenitici potu contenti sunt exiguo, quia non sitiunt. nō sitiunt autem, vel quia siticulosam affectionem non sentiunt, extincta facultate appetitrice stomachi: vel quod ardoris causa longius abest à ventriculo: vel quod eorum mens agrotat. Alias multa siti torqueri debet, quum in illis causa sitis abundet, intemperies videlicet calida siccaque.

13 Nec enim phrenitici re vera colligunt floccos, aut paleas, aut simile quidpiam, sed colligere se putant, vel cogitationis, vel sensus, vel utriusque iudicio destituti. Cur autem id putent, à nobis expositum est lib. I. cap. 20. partic. 21.

14 Ut in phrenitide pulsus frequens, sic parvus tactu percipitur. Frequens quidem ob usum, siquidem affectus est ab immenso calore. Paruus autem ob arteriæ duritiem à siccitate contracta: quæ quoniam ideo satis distendi non potest, pulsus subtremit quodammodo videtur. Cum verò subtremit pulsus, & immodicè creber est, imminet, ait * Galenus, syncope. Perpetuum autem hoc habent phreniticorum pulsus, ut cum convulsione quadam motus eorum abrumpatur. Hinc in illis pulsus & tremulum, & convulsivum notamus, utrumque perniciosum.

15 Nec enim urina tingitur bile, quum hæc in cerebrum tota rapiatur.

16 Qui delirant, non norunt quando sit inspirandum, expirandumque, quum obliuiosi sint. Itaque magnum & rarum spirant, ut longitudine respirationis id natura compenset, quod breuitate debet & frequentia fieri. ex * Galeno,

* libro 4.
de caus.
puls.

* lib. 2. de
difficult.
respirat.

LETHARGI NOTÆ.

CAPVT III.

Est in lethargo sopor, & spiratio rara
Magnâq; turbatum lotium, velut oris hiat,

⁶Lenta febris, ⁷tremulaque manus, ⁸obliuio, ⁹vultus
Decolor, ¹⁰vndosumque refert arteria pulsum.

1 Affectu phrenitidi contrario. Nam phrenitidis materia bilis est, at lethargi pituita.

2 A pituita cerebrum imbuente.

3 Nam lethargus obliuiosus affectus est. Ab obliuione verò
part. 16. cur talis fiat respiratio, dictum est cap. superiore.

4 Nempe simile iumentorum, ab humore crasso, & spirituum in venis agitatione.

5 Cum ab humiditate ventosa, tum quòd obliuiosus est lethargicus.

6 Febris in hoc affectu sit à putredine pituitæ: lenta, quoniam humor pituitosus tardi motus est.

7 Insurgente facultate contraque nitente humore crasso, viscidòque, quo nerui manus imbuuntur.

8 Ab intemperie frigida cerebri.

9 Albicans, & velut exanguis à pituitæ dominio.

10 In lethargo pulsus est vndosus, magnus, rarus ac languidus. Vndosus quidem, ab arteriæ molliie: magnus, ab eiusdem facili dilatatione propter molliiem, & humoris copiam: rarus à caloris paucitate: à facultatis imbecillitate languidus.

RELIQVORVM A LETHARGO

SOPOROSORVM AFFECTVVM

signa. Caput quartum.

N V L L A caro ¹febris, sopor est sed tantus in
agro,

Vt ²motu sensuque vacet, ³clausique putentur

Interiisse oculi, sed inertes in corpore vitam

Esse docet ⁴facilis spiratio. Sic catalepsi,

Seu catochen, oculus signat ⁵referatus vterque,

Immotusq; manens. Notat ⁶omnem Coma soporē.

1 Quæ lethargum à caro distinguit. Hic enim febris est expers, ille particeps.

2 Sopita facultate motus & sensus ob humoris frigidi, lenti, cras-

crassique copiam.

3 Humor enim crassus in caro priores cerebri vetriculos obsidet, qui musculos palpebras mouentes premens, efficit ut oculi clausi sint.

4 Quia posteriores cerebri partes aut non, aut minimum offendentur in caro, satis spiritus in mouendi nervos illabitur, quo motus thoracis conseruetur, vnde facilis spiratio.

5 Apertos esse oculos, & in hoc habitu consistere quo correptus sit æger, pathognomonicum habetur catalepseos seu catoches signum. Causa est siccitas, oculorum musculos tendens. Quem affectum vidimus semel in muliere quinquagenaria, quæ nostris vsa remediis, pristina est restituta sanitati.

6 Coma velut cataphora, dicitur omnis in somnum delatio. Illud quidem duplex quum sit, soporiferum & vigilans, lethargus & caros soporiferi comatis nomine comprehendendi possunt, caralepsis & catоче, vigilantis. Quod elici potest ex Galeni comment. * 3. in prorrh. Quamquam soporosorum affectuum distinctio valde confusa apud authores est. * cap. 1.

APOPLEXIÆ SIGNA.

CAPVT V.

SIN apoplexia fit, ² motus sensusque ¹repentè Concidit, est ⁴dyspnœa, grauis stertor queprehendit.

Tollere quam nequeas, nisi sit ⁵resolutio membri.

1 Coniuncta. Nam antecedentia sunt capitis dolor acutus, & confertim, obsidens iugularium venarum elatio, vertigo, splendor oculorum, extremarum partium frigus, totius corporis palpitatio, motus difficultas, dentium inter dormiendum stridor, lotium æruginosum, nigrum, paucum, farinaceum sedimentum habens, inquit * Paulus Ægineta.

2 In apoplexia priuatio sensus motusque fit, quia principes ventriculi, corpusque cerebri turgent humore, quo facultatem impediende spiritus animalis aditu in nervos prohibetur. libro 3.
cap. 18.

3 Inde Galenus lib. 3. * de loc. affectis, Causam apoplexiæ contendit esse frigidum, aut crassum, aut viscidum humorem, cerebri ventriculos confertim imbuentem: qui tamen aliam etiam alibi * statuit, nempe diathesin phlegmonosam in cerebro. * cap. 5.
* coment.
ad aphor.
42. lib. 2.
Aphorif.

4 Quum apoplexia fiat ob plenam consummatamque priuationem virtutis ad nervos affluentis, mirum est, cur muscoli thoracis moveantur ad respirationem. Sed causa est respirationis necessitas, vim nervis contentam excitantis.

Aphor. 42. lib. 2.
Aphorif. 5 Apoplexiam fortem nullo prorsus modo, debilem ægrè curaveris, ait *Hippocrates*. Ergo sola debilis apoplexia (quæ dignoscitur ex æquali respiratione, ut fortis ex inæquali) degenerat in paralyin, protrusa nimirum è posteriore cerebri ventriculo in spinalis medullæ partem alterutram materia. Quod non contingit à caro, in quo tantum opplentur anteriores cerebri sinus, non etiam posterior.

VERTIGINIS NOTÆ.

CAPVT VI.

AURI S ¹tinnitus, ²capitis dolor, & ³grauè pondus,
⁴Externi vitium sensus, ⁵stomachive, notabit
 Affectum, ⁶verti quo creditur omnia circum.

1 Vertigo, capitis affectus est, quo ita cerebrum & sensus exagitantur, ut circumagi videantur omnia. *ἄστος* Græcis dicitur, cum simplex est: *ἑνοπέδιος*, cum offunduntur oculis tenebræ. Quorum commune nomen est *ἑνότωμα*.

2 A flatulento spiritu.

3 Cum vellicantur capitis membranæ,

4 Ab humoris copia.

5 Ut auditus & olfactus oblectio.

6 Cuius generis est anorexia, nausea, cardialgia. Tùmque cerebrum afficitur ventriculi sympathia, non affectu primario.

7 Periphrasis est vertiginis.

EPILEPSIÆ SIGNA.

CAPVT VII.

CONCIDIT, & ¹stertit, ²lotium seménque profundit,
³Membra quatit, ⁴stridet, ⁵spumat, ⁶clamatque ⁷caducus.

I Quæ

1 Quæ conuulsio totius est corporis. Hæc quidem in cerebro semper suam habet sedem, sed materia vel ibi gignitur, vel illuc e ventriculo, aut alia qualibet parte corporis, vt videri, crurè-ve transmittitur.

2 Affecto repente cerebro, motus sensusque principio.

3 Quale signum est in apoplexia, à qua nec sede, nec causa, sed sola magnitudine differt epilepsia. Stertor verò fit, decumbente in fauces, & tracheiam arteriam pituita, fauciumque & colli venis sanguine turgentibus, viasque pulmonis arctantibus.

4 Solutis vesicæ musculis. Quod tantum accidit in graui paroxysmo.

5 Labefactata, seu resoluta spermaticorum organorum retentrice facultate, ob motum tremulum & conuulsuum.

6 Stridor dentium fit, ait Galenus, musculis temporalibus & masticatoriis affectis motu conuulsorio, quo etiam contingit partes faciei epileptici perueriti.

*cement
1. in pigno
stic. part.
21.*

7 Ex motus vehementia.

8 Id fit cum repente cadit, affectus magnitudine. Aliàs ferè semper silet epilepticus, vt in multis obseruauimus, Hinc obmutescere, comitialis morbi signum esse vult auctor libri de morbo sacro.

9 Epilepsia sic dicitur, quia mens & sensus *ἐπιλαμβάνεται*, i. interceptiuntur ac vincuntur in hoc affectu. Qui caducus morbus à cadendo nominatur. hoc enim affecti repente concidunt. Comitialis à comitiis, quæ tum olim soluebantur, cum eo corripiebatur quispiam. Herculeus, itèmq; sacer, à magnitudine. Puerilis, quod pueros sæpe vexet, cum ob crapulam, tum intemperiem humidam eorum cerebri. Lunaticus, quod interlunio natos corripere soleat, & Lunæ motu concitetur. Veterib⁹ elephanticus, ob curationem desperatam. Vix enim ab anno 25. sanatur, vt habet Hippocratis aphorismus 7. lib. 5.

INCUBI SIGNA.

CAPVT VIII.

MENS stupet & sensus, spiratio læditur, & vox,
Et graue terret onus, quādo premit^r incubus agrū.

1 Crassioris pituitæ, vel melancholiæ vapore è præcordiis in cerebrum expirante.

C

2 Presso diaphragmate cum pulmonibus è subiecta crassa flatulentâque materia.

3 Putat enim æger ingenti se mole premi, suffocationisq̃ue non leui timore percellitur, ob grauem corporis oppressionem.

4 Qui maniam, epilepsiam, apoplexiâmve solet præcurrere. Ephialates & Pnigaliõ Græcis appellatur hic affectus, nec Deus, nec semideus, nec Dæmon, nec incubans vetula (quod veteres aliquando crediderunt) existens, sed vapor quidam crassus, qui partim vias spiritus animalis intercipit, vnde vocis, & spiritus difficultas, partim in cerebrum elat⁹, animũ spectris exagitat.

DE 'MELANCHOLIA MORBO.

CAPVT NONVM.

SIGNA 'melancholiæ³ duo sunt, mærorque, metúsque.

1 Quæ est imaginationis deprauatæ symptoma, cerebri frigidam, & siccam intemperiem consequens, idcõque sine febre: cui Lycanthropia, Maniâque plerumque succedit.

2 Melancholia triplex est: Vna, in qua cerebrum afficitur primario, quæ vulgo melancholia morbus (quam hîc notamus) appellatur: Altera per consensum vètriculi, quæ vocatur hypochondriaca. Tertia, totius corporis vitio fit. A toto corpore fieri cognoscitur, si niger est, & hirsutus corporis habitus, aut flauus, vigilæque præcellerint: si latæ venæ, ruboreq; saturata facies, si hæmorrhoids, aut alia quæuis consueta vacuatio suppressa: si fuerit ciborum atram bilem gignentium solitus esus, aut ætas in senium vergens, cum anni constitutione frigida sicca. A ventriculo, si sumptus fuerit concoctu difficilis cibus, si rustus acidus est, flatus, æstus, palpitatio, & in præcordiis fluctuatio quædam: si ventriculi dolores vehementes aliquãdo comitantur ad dorsum vsque protensi: vomitúsque subamarus, aut acidus insequitur. A cerebro melancholia primariõ fit, si superiora signa non assistunt, metúsque & mæstitia diu, sine causâ manifesta, perseverant.

3 Assidentia melancholiæ signa multa sunt commemorata lib. I. Sed hæc duo, melancholiæ morbi sunt pathognomonica.

capit. 4.

SIGNA

SIGNA CATARRHI.
CAPVT DECIMVM.

QVVM pituita mouet liquidum malè sana catarrhum,

¹Frigus inest capiti, facies fit pallida, ³murmur
Vox ciet, & ⁴sopor est, vrinæque ⁵crudior exit:
⁶Mens stupet & sensus, ⁷motus torpore tenetur.
Sin calor in causa est, ⁸oculus rubet, ⁹interiôrque
Pars oris ¹⁰lacerata dolet, dolet & ¹¹caput omne.
¹²Teter odor penetrat nares, color ¹³aureus extat
Emisso in lotio. ¹⁴Scapulas lumbosq; catarrhus
Permeat interdum, variôsque effusus in artus
Efficit innumeris corpus miserabile morbis.

1 Qui est humoris superuacanei è capite in subiectas fedes decubitus.

2 Ex pituitæ dominio.

3 Non habente liberum exitum vocali materia, quia fauces interceptiuntur.

4 Cerebri ventriculis pituita turgentibus.

5 Prolabente per venosum genus in renes pituita.

6 Eadem occupante cerebrum.

7 Ea pariter in cerebro contenta, vel in nervos, qui musculos mouent, effusa.

8 Tenuis biliosiq; sanguinis influxu in tenues oculorû venas.

9 Vt palatum & fauces. Tûmque catarrhus propriè branchus appellatur, vt coryza, cûm in nares illabatur. Vnde versus,

Si fluit ad pectus, dicatur rheuma catarrhus,

Ad fauces branchus, ad nares esto coryza.

10 Humoris influentis acrimonia.

11 Acri calore cerebri membranas pungente.

12 Humore corrupto circa priores cerebri ventriculos.

13 A bilis dominatu.

14 Per externas venas & arterias.

C ij

OPHTHALMIÆ SIGNA.

CAPVT XI.

Si ¹rubor ²adnatæ, ³fordes, ⁴lachrymæque, ⁵dolorque est
⁷Distendens, pulsansque, ophthalmia ⁸vera fatigat.

¹ Quæ est oculi phlegmone, lippitudo vulgò dicta.

² Ob sanguinis affluxum, quo tenues oculorum venæ turgēt, quæque in eorum adnata fuerant obscuræ, conspicuæ fiunt.

³ Adnata tunica (cuius color est candidus) ita dicitur, quoniam adnascitur corneæ: vt & coniunctiua, quia coniungit oculum cum orbita sua. Producitur autem hæc à pericranio.

⁴ In oculi cantho maiore.

⁵ Acres ob serum biliosum.

⁶ Ex calore.

⁷ Ex copia sanguinis, & spirituum.

⁸ Cuius causa est tenuis biliosusque sanguis, in oculorum venas illapsus.

CAPVT XII.

Si sit ¹hebes, vel ²nulla acies, ³pupillæque fulget,
⁴Humoris vitiū, ⁵nerui, ⁶cerebrive putandum est.

¹ Quem affectum ἀμβλυωπία vocant.

² Quam visus priuationem Latini cæcitudinem, ἀμαύρωσιν Græci nominant.

³ In qua nullum appareat vitium extrinsecus.

⁴ Crystalloidis. Est autem humor crystalloides videndi primum organum. Hoc igitur læso, læditur & visus.

⁵ Vel resoluti, vel obstructi, vel contorti.

⁶ Spiritum animale non suppeditantis, vel corruptentis ob intemperiem aut simplicem, aut cum humore. Tuncque non visus modò, sed & reliqui sensus afficiuntur. Spiritus autem visorius, vel crassus & paucus est, vt in senibus, & nyctalopibus: vel crassus, & multus, tuncq; longo quidem tempore sed in aere luminoso fit visio: vel paucus & subtilis, vt in myopibus: vel paucus

cus, subtilis, & lucidus, & tunc oculi noctu magis micant, sed statim hebescent; quod de Tiberio Cæsare prodidit Suetonius in eius vita: vel multus & lucidus, & tum acutè distinctèque cernitur: vt contrà perit visio, si paucus & obscurus insit oculis animalis spiritus.

SVFFUSIONIS NOTÆ.

CAPVT XIII.

Si fumi, muscæve oculum, tepidive vapores
Eludunt, & ab his ¹nubes hæere videtur
³Cerula ⁴pupillæ, vel ⁵grandinis amula duræ,
Detinet affectus, ⁶suffusio dicta Latinis.

¹ Suffusio duplex. Vna cerebri, de qua nunc agimus, & hæc propriè dicta suffusio: Altera ventriculi sympathia fit. In illa, vnus duntaxat oculus falsis rerum simulachris semper eluditur: in hac, visa discedunt, ac deinde recurrunt, & oculum vtrumque simul obsident.

² Pathognomonicum veræ suffusionis signum.

³ Qui color, vt & aureus, sanabilem indicat suffusionem.

⁴ Cuius foramen via est spiritus animalis, qua rerum externarum species cernuntur, & excipiuntur.

⁵ Talis color, vt & gypseus, incurabilis suffusionis est nota, quia perfectam indicat humoris concretionem. Sic, si clauso sano non tumet suffusus oculus, nec pupilla dilatatur, desperata res est. Idem iudicandum, si suffusio locum mutet.

⁶ Græcis *ὑπόχυσις*, & *ὑπόχυμυς*, vulgo catarrhacta. Quæ est humoris præter naturam, vel in pupilla, vel inter rhagoidem tunicam, & crystallinum humorem concretio. Prolabitur autem hic humor à cerebro per opticum neruum.

AVRIS PHLEGMONES

SIGNA. CAPVT XIII.

V¹ix tumor aut rubor est, auris cum accensa
tenetur,
Sed ³pulsans, ⁴pūgēnsq; dolor, grauis & calor intus

C iij

Æstuat, vnde ¹febris, factò quæ pure quiescit.

- ¹ Quæ colligitur inter crassiorem membranam, & eam quæ auris meatui prætenditur.
- ² Nisi geminato malo externa trahantur in consensum.
- ³ A spirituosæ sanguinis affluxu.
- ⁴ Ex acrimonia humoris, sensibili, nempe membranosa parte contenti.
- ⁵ Quæ lenta solet esse, quia materia pauca, & à corde longè distans.

PAROTIDIS NOTÆ.

CAPVT XV.

Post aures ¹tumor atque rubor, dolor, & calor ingens
Existunt, quando formatur ²vera parotis.

- ¹ Veræ phlegmones signa sunt tumor, rubor, calor, dolor. Eius generis est vera parotis, in iis glandulis sedem habens, quæ circum aures positæ iacent.
- ² Interdum enim parotis phlegmone vera non est, sed tumor œdematis particeps: tuncque superiora signa manifesta non habet, sed hoc magis remissa, quo pituitæ plus inest.

NARIVM AFFECTVVM

SIGNA. CAP. XVI.

Fœtet odor, ¹squallens si nares obsidet vlcus.
Sin tumor his ²calidus, ³farcoma, ³coryzave no-
⁴Interiit liquidi, minor est vel sêsus odoris. (xæ est,

- ¹ Putrido vapore foras exhalante.
- ² Vt ozæna, & vlcus è lue Venerea contractum, quod narium ossa tenella solet exedere, & si non occurritur, corrosa palati ossa, magna deformitate perforare.
- ³ A quibus affectibus sic obstruuntur aliquando nares, vt vapores

pores ex rebus odoriferis per eas efferri nequeant in anteriores cerebri ventriculos, in quorum finibus odoratorum sensus perficitur.

4 Si meatus narium penitus occupentur, ut potest in sarcomate polypove cōtingere carnis incremēto, perit omnino sensus. Si non, ut in coryza, in qua vel natura, vel arte pituita transfluit, odoratus minuitur, nec de rebus odoriferis integrum iudicium ferri potest.

LINGVÆ DEPRAVATÆ

SIGNA. CAP. XVII.

P¹ERVERSUS gustus, ²vox inconcinna,
³stuporve
Sæpius accedit, vitio si lingua tenetur.

1 Humore vitioso, sæpiusque vel salso, vel amaro, vel acido linguæ corpus, præsertimque membranam illius imbiente, qui vel ex inferis sedibus eò conscendit, vel illuc è cerebro decubuit.

2 Qualem habent blæsi, balbique, ob linguæ breuitatem, vel crassitiem nimiam, aliudve naturale vitium conformationis: aut ob humoris linguam proluentis copiam, aut exuperantem siccitatem.

3 Impeditis nervis septimæ coniugationis cerebri, qui linguæ motum dant, ut nerui tertiæ coniugationis sensum.

INFLAMMATÆ COLVMELLÆ

SIGNA. CAP. XVIII.

OESOPHAGVM faucésque tumens saepe
vua fatigat,
In cassumque voras, timet, hæc ne strangulet, æger.

1 Impedito aditu cibi in œsophagum ab vuulæ (quæ phlegmonem patiens distenditur longiorque fit) corpore.

2 Non tantum obstructa via cibi, sed etiam spiritus. Sed hic metus nullus est, cum respiratio sit libera.

C iij

ANGINÆ SIGNA.

CAPVT XIX.

Non bene deglutit, ¹spiratque Cynanchicus,
inque
Faucibus ardentem queritur se ferre ²dolorem.

¹ Angustioribus redditis meatibus, per quos cibi, potus, & spiritus introitus est, ab inflammatione gulæ gutturisque musculorū.

² Dolor in angina fauces aut cervicem occupans fit ob tumorem, quem in collo conspici bonum est. Foras enim vertitur morbus, inquit ^{*}Hipocrates. Si verò non apparet (inflammationis tantum laryngis, fauciumve musculis interioribus) tumor, febrisque derepentē cum suffocatione superuenit, eodem, tertiove ad summum die expectanda mors. Nec verò semper in angina dolor est, tumorve phlegmonodes: sed interdum tumor anodynus ac doloris exors excitari potest, interiore gutturis madefacta tunica ob copiam pituitæ decumbentis, ut monet

^{*} Galenus.

^{*} cōment.
ad Aph.
34. lib. 4.
aphorism.

OBSTRUCTI PULMONIS

SIGNA. CAP. XX.

SPIRITVS obstructo grauis est pulmone,
²premitque
Humor in ¹hoc latitans: quem si non aspera tussis
Excludit, sensim ⁴liccescit, & ³Asthma procurat.

¹ Causa est humor multus, crassus, atque lentus, grando, lapis, seu calculus, & crudum tuberculum pulmonis vias impediens, unde spiritus ægrè ducitur.

² i. oppressionis est causa.

³ In pulmone, vel potius ipsius alis, seu brōchiis qui continetur humor excrementitius, sensum oppressionis inuehit, tum quia grauis est, tum quia fuliginosorum excrementorum exitū, & aeris aditum prohibet.

⁴ Calore cordis, & pulmonis: tūmq̃ue stertor quidam & sibilus

bilus eliditur, partim quia siccus est reddit⁹ humor, partim quia pulmonum alis, quæ natura siccae sunt, pertinaciter impactus, vias spiritus angustiores reddit.

5 Asthma Græcis, suspirium Latinis appellatur, quoniam in eo tanta respirationis difficultas est, ut vix nisi recta ceruice sursum ducatur spiritus: unde & asthmatici verè dicuntur orthopnoici. causa est, humoris crassi lentique brōchiis pulmonum impacti copia, crudumve tuberculum in pulmonibus genitum: idēoque febris expers hic affectus est, quia frigidus.

CATARRHI PRÆFOCANTIS INDICIA. CAP. XXI.

SIBILVS, & stertor¹ citus, & ²dyspnœa, repentē
Confurgens, ³comes est iugulātis sæpe catarrhi.

1 In catarrho suffocante repentina fit, inopinataque fluxio, quæ suis symptomatib, imminentis exitii metum incutit.

2 Verius orthopnœa, cum altus & suspiriosus ducatur in hac affectione spiritus.

3 Sic dicti, quod subito iugulet, nisi quamprimum occurratur. Sunt autem asthmatis & catarrhi suffocantis signa communia. Sed in illo sensim, in hoc repentē se proferunt. Talis verò catarrhus asthma sequitur interdum, nempe cum ad pulmonum infarctus accedit repentina, multaque in illos fluxio, ab humidiore celo, vel solo, vel crapula contracta. Quem affectum nobis videre sæpe licuit, & conuenientem adhibere sanationem.

PERIPNEVMONIÆ SIGNA. CAPVT XXII.

IN¹ peripneumonia, ²dyspnœa, ruborq; ³genarum
Existunt, oculique ⁴tumēr, ⁵graue pōdus in imo
Pectore fit, sternum ⁶retrahens, hypochondria,
dorsum.

Spiritus exhalat ⁷calidus, sputumque cruentum

⁸Interdum tussī erumpit, febrísque perennis

⁹Æstuat, & pulsus ¹⁰mollis sentitur ut vnda.

1 Peripneumonia, seu pulmonis inflammatio duplex: vera, nothaque. Vera phlegmone, aut erysipelatis speciem gerit. Atque si non anginae, vel pleuritidi succedit, sed per se nascitur, fit ex sanguine bilioso, tenuique, è dextro ventriculo cordis per venam arterialem in pulmones violentius excusso, ibique putrescente. Quod rarum est. At notha peripneumonia, quæ frequentior in his locis est, ab acri tenuique destillatione contrahitur, è cerebro cõfertim in pulmones illapsa, sine cruenta (quæ in propria peripneumonix specie fit) expuitione.

*libro 4. de
loc. affect.
capit. 6.*

2 Ob vehementem in pulmone cordeque calorem, & viarum spiritus angustiam, aut virium imbecillitatem. Quæ tres constituuntur à Galeno dyspnææ causæ.

3 Ex tenui calidoque vapore è pulmone in eas elato, quo vicularum eius loci sanguis accenditur. Accensus verò rubere cõspicitur, ob tenuitatem & raritatem cutis.

4 Vapores enim ex pulmone resta conscendentes in oculos, humorem in eis contentum rarefaciunt, ac dilatant.

*libro 1. de
Morb.*

5 Attracta per calorem è vicinis venis & carnibus, vt loquitur Hippocrates, materia. Quæ, vt copiosior est, ita magis pulmonem onere grauat, & periculosum inducit affectum.

6 Vi caloris, cui trahendi concessa vis est.

7 Inclusa pulmoni materia calida.

8 Nō semper in peripneumonia cruetum expuitur: sed tum, cum hæc est vera phlegmone, coctaque materia. Sin erysipelas est, biliosum: vt album, si pituita decumbit à cerebro.

9 Ex materia pulmoni inclusæ qualitate febris maior, aut minor est. In bile quidem acutissima: remissior in sanguine: in pituita, ferè lenta.

10 Quia pars mollis, pulmo nimirum, afficitur. Cæterum paulo durior est pulsus à bile, mollior à sanguine, mollissimus & vndosus à pituita.

SIGNA PHTHISEOS.

CAPVT XXIII.

PROMINET his humerus, dira qui tabe tenentur,
Sunt graciles aures, oculus cauus, arida febris,
Tempora lapsa, fluunt supera de parte capilli,
Est pedibus, manuūque volis calor, excutiturq;
Per ruffim cruor, aut sanies fœtore molesta,
Spiritus

Spiritus ¹¹haud facilis, ¹³costæ sine carne, recondit
 Pectus ¹⁴onus, ¹⁵liuet facies, palletve, tumetve,
¹⁶Debilis est pulsus, ¹⁷languor, ¹⁸marcorque, caduci
 Corporis, ¹⁹incurui fiunt velut alitis vngues,
 Interdum fluit aluus, & hinc ²⁰prædicito lethum.

1 Phthisis exulceratio pulmonis est. Cuius duæ causæ sunt:
 vitiosa constitutio pulmonis & humor exedens.

2 Eius musculis marcescentibus, si tabis initium est, aut mara-
 smo consumptis, si phthisis est absoluta.

3 Carnosa substantia, quæ pauca est, citò consumpta, car-
 tilaginosaque superstite.

4 Ossea relicta substantia, dissipata carnea.

5 Consumit ea primò spiritus: deinde carnes colli, uat, partés-
 que solidas demum extorret, & exiccat.

6 Exhausto siccitate partis alimento, vel eo non affluente,
 quia naturalis facultas languet.

7 Volæ manus, & plantæ pedum naturali constitutione sic-
 cissimæ, ideoque glabræ. Quia verò siccissimæ sunt, incalescente
 per viscerum ardorem, & febrem in phthisi corpore, promptis-
 simè suscipiunt incendium, & calidæ siccæque tanguntur.

8 Ex acriore defluxione: qua tabidi non modò tussiculosi, sed
 & rauci fiunt.

9 Rupta, vel exesa in pulmonibus vena: vel corrupto pulmo-
 ne, cuius portio putris interdum excludi cernitur. Non autem
 omnes tabidi cruentum, aut purulentum excreant, vt nec peri-
 pneumonici, de quibus superiori cap. part. 8.

10 Aut pus: quo supresso, mors.

11 Qui tabe vexantur, si sputum quod extussiunt, carbonibus
 iniectum fœret, perniciosum. Hoc enim putrere pulmonis
 substantiam, & ex consequenti tabescere cor indicat, natiui ca-
 loris penuria.

12 Nec enim alæ pulmonis satis expanduntur ad cor flabellā-
 dum, ob illius siccitatem, & virium imbecillitatem.

13 In tabidis costæ primùm & maximè visuntur excarnes.
 Earum namque musculi promptissimè omnium colliquescūt,
 quia pulmoni cordique (caloris foco) vicini sunt, & natura val-
 de tenues.

14 Purulenta materia in pulmone contenta.

15 Extincto pene natiuo calore.

16 Imminuto vitali spiritu.

17 Ex virium impotentia.

18 A siccitate partium, etiam solidarum.

19 Ungues alimento suo destituti resiccantur: & siccitate curuantur, præsertim consumpta digitorum carne.

Aphorif. 20 Tria sunt apud Hippocratem & Galenum mortis ex tabe
11, 12, & signa certissima: fœtidū sputum, capillorum calus, aluique fluor.
14. libr. 5. Duorum primorum ratio nuper est exposita. Fluor autem alui
comment idcirco perniciem adfert, vel quia partes superiores (eas præser-
ad aphor. tim quæ thorace continentur) ita resiccat, ut nec tandem moue-
14. libr. 5. ri queant, nec aerem inspirare: Vel quia partes omnes debita
aphorism. instauratione fraudando vires deicit.

PVRULENTORVM SIGNA.

CAPVT XXIIII.

EMPYVS est, quisquis patitur sub pectore pondus,

¹In cassum tu silit, ²sudatque, rubore genarum

³Tingitur, atq; ⁴cauos oculos habet, aspicit ungues

⁵Curuari manuum, digitosque calefcere summos.

His ⁶febris comes est, & circum ⁷pustula corpus

Erumpēs, ⁸dyspnœa, ⁹pedum tumor, atq; ¹⁰ciborū

Auersus gustus, ¹¹sitis, & (si ¹²nulla salutis

Est via) pus ¹³viride, aut liuēs, ¹⁴spumāsve profusum.

1 Inter thoracem & pulmonein abscessu facto, sæpius ex inflammatione pulmonis, vel eiusdem vomica rupta, vel angina, vel pleuritide.

2 Nec enim commentatione dignum quid expuit purulentus tres ob causas, nempe lentorem puris, densitatem membranæ pulmone ambientis, & facultatis expultricis imbecillitatem.

comment. 3 Vel sudore, Galeni sententia, continuo: qui malus est, quia
ad caput virium imbecillitatem arguit, alimento discusso. Vel eodem in
de empye- sola remissione febris apparente, ut Aretæo placet: qui minus
mar. libro habet periculi.
prognost.

4 Inflammato pulmone.

libro 1. de 5 Oculi caui sunt in febribus, & acutis, & longis, ardore fe-
signis diu- brili populante, consumenrēque partes eorum carnosas: con-
turn. mor- festim quidem in acutis, in longis sensim.
bor. cap. 9.

6 Curuan-

6 Curnatur vngues in empyemate, quia caro, quæ hos utrinque firmat, consumitur. Vnde partes eorum solidæ, quæ reliquæ sunt, veluti siccitate conuelluntur.

7 In diuturnis morbis extrema digitorum magna ex parte refrigerescunt: quia quicquid est nativi caloris intro cogitur, & natura minus bene concoquens assumptum alimentum, ea suo genio fraudare solet. Est tamen, cum tabes viget, in summis digitis calor. Nam hæctica febris solidas sedes occupat: in quibus solis consumpta carne relinquitur humor, caloris pabulum.

8 Hæctica.

9 Erodente sanie in corporis habitum effusa.

10 Obsesso à materiæ purulentæ copia thorace: vnde nec pulmo, nec cor bene dilatantur.

11 Incipiente ab his totius corporis extinctione, utpote longè distantibus à fonte nativi caloris, & plus habentibus ossæ, membranosæque substantiæ, quam carneæ.

12 Appetendi facultate (quæ in ore ventriculi sedem habet) emoriente.

13 A siccitate partium, & febre.

14 Ut nulla est, cum dicta superius signa vigent. Contra verò maxima spes salutis affalget, quum febris eodem post eruptionem die dimiserit, ciborum appetitus citò redierit, sitis reliquerit, venter parua compactaque egresserit: pus album, læve, concolor apparuerit, & à pituita liberum, citràque dolorem, rullumque repurgatum.

15 Quod significat à calore flammeo assatum humorem serosum. Caterum per viride sputum intelligas æruginosum & croceum, ut monet apud Hippocratem *Galenus.

*comment.
2. part.
47. libr.
prognost.*

16 Quum in empyemate crassus ac viscidus humor in thorace contineatur, calorque sit pulmonis & cordis: calor hic agens in crassum & lentum humorem spumantis sputi causa fit. Quod colligere licet ex his quæ elixantur. Hæc enim, si tenacem naturam habuerint, spumam proferunt, ait *Galenus.

*comment.
ad aphor.
30. libr. 7.*

SIGNA PLEVRITIDIS.

CAPVT XXV.

QUUM ¹pleuritis habet, ²febris comitatur acuta,
Fitque dolor ³pungens lateris, ⁴spiratio ⁵parua

⁵Crebraque, ⁶nec facilis, ⁷tussis repetitq; frequēter,
⁸Exiguūque notat, ⁹durūque arteria pulsū.

1. Pleuritis, est inflammatio membranæ costas succingen-
tis. Quæ duplex. Interna, seu vera (cuius hîc signa pathogno-
monica commemorantur) & externa seu notha. Vera fit à san-
guine, quæ caua vena in eam, quæ azygos appellatur, ac dein
in tenues costarum venas impetu quodam incurrit: hisque vel
apertis, vel disruptis insilit in musculos mesopleurios, aut suc-
cingentem costas membranam. Notha fit à flatu: tuncque do-
lor vagus est. Aut destillatione, præcessitque vel in cernice, vel
scapula dolor. Aut sanguine, quæ caua vena in alam emergens
propagatur in partes thoracis externas. Distinguitur autem no-
tha pleuritis à vera: quod in hac dolor lateris internus est, & fa-
cilis in latus ægrum decubitus: In illa, dolor externus, tactu, pres-
suque excandescens, proindeque molestè in latu ægrum incli-
natur, in sanum facilius.

2 Ob cordis viciniam, & putridum, feruidūque sanguinem.

3 Quia membrana succingens lancinatur, ac diuellitur ab hu-
moris acrimonia, vt ab eiusdem copia tenditur.

4 Fuliginosorum excrementorum abundantia, pulmonis,
cordisque motum liberum impediēte.

5 Vt respiratio, quæ debet esse magna, nec potest, frequentia
compensetur.

6 Arctatur enim interna thoracis capacitas à materia phle-
gmonosa, succingente membrana contenta.

7 Tussis, est efflatio vehemens, qua quicquid instrumentis
spirandi molestum est, expellere natura contendit. Per quam si
laudabile sputum appareat initio pleuritidis, morbus brevis.
Sin differat, longus est futurus. Aut enim citò suffocabit, aut in
empyema vertetur, nisi venæ sectio (remedium in hoc affectu
singulare) ~~non~~ facta, causam antecedentem sustulerit. Quod
de vera pleuritide audiendum. Nec enim in notha (quæ ex-
ternos costarum musculos occupat) tussim, aut sputum non esse
damno est, vt neque tensionem, neque duritiem pulsus, nec
febrem, nec spirandi difficultatem. Eius quippe materia thora-
ce non clauditur, vt eius pondere pulmo grauetur, aut putri va-
pore cor laceffitum incandescat.

8 Cor namque minus dilatur, quoniam opprimitur.

9 Afficitur quippe membrana, quæ natura dura est, vt pote
densata frigore.

C R V-

CRVENTÆ EXPVITIONIS
E PVLNONE VEL THORACE*signa. Caput vigesimum sextum.*

P¹VRPVRVS, ²tenuisq; cruor, ³spumansque,
frequenti
Exclusus tussi ³nullo comitante dolore,
⁴Pulmonem accusat: Grauis est sin tussis, & illa
⁵Crassus in os resilit sanguis, grumofus, & ater
Inferius vitium est, & pectore conditur imo.

- 1 Qualis est pulmonis color & substantia.
- 2 Ob eius calorem, tenuitatem, motum.
- 3 Sanguis quum educitur è pulmone, dolorem non excitat, quia neruus interiorem illius substantiam non ingreditur. Quæ causa est, vt pulmonis affectus initio ferè lateant, & bene cogniti vix sentiantur.
- 4 Non tantum è thorace vel pulmone cruenta manat expuitio, sed etiam ex aliis locis. Quà peculiaribus signis internoscere licet. Qui enim è gula ventriculove sanguis profunditur, vomitione: Qui è gingiuis, lingua: Qui ex ore, expuitione simplici: Qui è faucibus & gurgulione, sreatu: Qui ex gutture, tussicula: vt qui ex pulmone, vel thorace, tussi reicitur.
- 5 E thorace crassus & grumofus, nigerque sanguis exit, quia postquam is è venis aut ruptis, aut apertis, aut erosis excidit in illius capacitatem, aliquandiu ibi retinetur, dum in asperas pulmonis arterias traducatur, ab hisq; per tussim excludatur.

SIGNA SYNCOPES.

CAPVT XXVII.

T¹EMPORA si subitò ceruixq; madore gelātur,
Ménsque labat, sensûsque, extremaque corporis
algent,
Si pallet facies, & pulsus nullus habetur,

Aut rarus nimium, cordis cadit ignea virtus.

1 Hæc omnia venientia repente, signa sunt resolutionis spirituum, in primis quidem vitalium, dein animalium, & naturalium. Ut enim partes principes inter se conspirant ad salutem: sic in morbo condolent, vnaque semel offensa trahit alteram in consensum.

SIGNA SPECIALIA FEBRIVM:
ET QVOTIDIANÆ
primum.

CAPVT XXVIII.

QVVM pituita putri¹ cor inficit vda vapore,
²Languidus est pulsus, ³grauc fit, turpique
⁴veterno.

Segne iacet corpus, lotium¹ tenuatur, & albet.

⁴Frigus in ingressu febris est, ²accessio longa,

³Nox grauis, & ¹liquidis crudisque resoluitur aluus.

1 Post signa Syncope, proprii cordis affectus, peculiare febrium persequimur notas, quia febris est cordis affecti symptoma, nempe, calor præter naturam e corde in omne corpus effusus. Quæ, vel est primaria, vel symptomatice. Hæc nobilium partium, ut pulmonis, hepatis, ventriculi comitatur inflammationem. Illa (de qua sequentibus capitibus ad libri finem) in spiritibus, aut humoribus, aut solida substantia residet. Quæ spiritus occupat, Ephemera: Quæ consistit in humoribus, humoralis: in solidis verò partibus, hectica nominatur. Humoralis vel à plethora fit, ut simplex, & putrida Sinochus: vel à cacochymia: eaque aut pituitosa, quæ Quotidianam: aut biliosa, quæ Tertianam: aut melancholica, quæ Quartanam facit, in maioribus quidem vasis, continuam: in minoribus, aut extra vasa, intermittentem.

2 Pulsus languidus, ut parvus & rarus est initio paroxysmi
quotidia-

Quotidianæ febris, quia facultas grauat ab humore multo frigido, crassoque: post autem crebrior euadit vi vtriusque caloris, natiui nimirum, & præter naturam, qui cum in accessionis augmento, tum in vigore consuevit pugnam indicere.

3 Humoris copia, & crassitie.

4 Cerebrum enim est sedes pituitæ, quæ mouetur, & peccat in quotidiana.

5 Obturatis namque meatibus tenue tantum percolatur, præsertim initio morbi. Sub finem verò crassescit vrina, solutis obstructionibus.

6 Cum est intermittens quotidiana. In cuius initio frigus est, languido motu progrediente pituita quæ extra venas est: post horror, eadem incalcescente, concussa que validius.

7 Horarum octodecim.

8 Quia noctu pituita mouetur. Proinde tunc in quotidiana continua fit anadiplosis: In intermittente, paroxysmus simplex.

9 In quotidiana febre, liquidæ, crudæ, pituitosæque sunt deiectiones, cum ob imbecillitatem ventriculi, tum ob humidi frigidi que succi dominium.

SYNOCHI SIGNA.

CAPVT XXIX.

NOSCITVR ex ²somno, ³lotii, ⁴vultusque rubore,
Et pulsu Synochus ⁵magno, ⁶celerique: calorque
Qui viget est ⁷blandus, ⁸turgescit vena, ⁹torisque
¹⁰Ponderis est sensus, ¹¹dyspnœaque iuncta fatigat.

Ι *Σύνχος*, Latinis cōtinens appellatur. Cuius materia sanguis est contentus vasis maioribus, inter alas & inguina positus. Hæc continua febris est, quia vapor eius assidue cor impetit, dum integrè sit soluta. Synochus porro duplex. Vna putredinis expers, quam Ephemeram plurium dierum nominat Galenus: altera putrida. Quæ cum vnicam tantum habeat accessionem, vt reliquæ continuæ, tres tamen eius differentiæ statuuntur. Aut enim æqualiter viget, neque crescens, neque decrescens: hinc *ἰσότητος πυρετός* dicitur & *ἀκμωτικός*. Vt sensim augetur, & *ἀνακαπτικός* seu *ἐπακμωτικός* vocatur. Aut ab initio ad finem vsque minuitur, vnde *παρακμωτικός*, deductis ex Græcia propriis nominibus,

D

appellatur.

3 Urina rubet in syncho, sero sanguinis eius copia referente.

4 Repete causam ex libro primo, capite 2. part. 7.

5 Ex sanguinis & spirituum arterias implentium copia.

6 Celer quidem est pulsus in omni syncho propter usum: sed æqualis in ea, quæ putredinis expers est, inæqualis aliquantulum in putrida. Nam in hac, systole quàm diastole concitator tactu percipitur, quia maior expurgandæ fuliginis, quàm refrigerandi cordis incumbit necessitas.

7 Referente qualitatem sanguinis.

8 Sanguis enim quantitate peccat: sola quidem in Syncho non putrente: in putrida verò, etiam qualitate. Quamobrem in hac non venæ sectioni tantum, sed & purgationi locus esse debet, quum sit cacochymia plenitudinis comes.

9 i. musculis.

10 Exonerantibus se venis maioribus in minores.

11 Vide cap. 2. lib. 1. partic. 10.

TERTIANÆ SIGNA.

CAPVT XXX.

QVVM viget hæc febris terna quæ luce recurrit,
Fit ² rigor, & ³ vomitus, ⁴ capitis dolor, & calor ⁵ acer

⁶ Percurrit corpus, ⁷ sitis, & ⁸ dyspnœa fatigat,
Sunt ⁹ vigiles oculi, lotium micat, instar & auri
¹⁰ Flauescit, pulsus ¹¹ vehemens, ¹² durusque resurgit,
Inque paroxysmi est extremo tramite ¹³ sudor.

1 Febris à bile, tertiana dicitur, quia tertio quoque die recurrit accessio, simplex quidem, si febris est intermittens: si continua, fit anadiplosis. Huic καύσος est ὁμοφύς. Eisdem enim causas agnoscit, eundem humorem: in iisdemque corporibus, & eadem anni parte solet excitari. Sed inter se maioris minorisque ratione distinguuntur. Nam quæ symptomata remissa sunt in tertiana, hæc in causo summè viget: inter quæ duo sunt πυρεσμοειδής, deurens calor, & sitis inexplebilis. Alia verò, ut lingua sicca, nigricans & aspera, vigiliæ, delirium σπρεδ' νεύρτα.

2 In febrium intermittentium initio frigus, aut horror, aut rigor fit, quia concitatus tum, quasi que turgens humor putridus mem-

membranas concutit: et, si paucus est, ut in leuioribus tertianis: aut parum acer, aut lentus ac languidus, ut in quotidianis, solum frigus inuehit. Sin copiosior, aut acrior, aut concitior, horrorem. Quum verò plurimus isque vehementer acer ac mordax, ut in exquisitis tertianis, magno impetu in præcordia fuerit excussus, rigorem infert, ut disertissimè docet eruditissimus Fernelius.

*libro 4.
pathol.
cap. 10.*

3 Sub rigoris finem excussa bile. Nam hæc è iecore venisque proximis, in quibus gignitur, commota per rigorem, orgasmo quodam in ventriculum influit, ex quo vomitu reiicitur.

4 Humore, vaporeve bilioso, & acri, cerebri membranas feriente.

5 Ex qualitate bilis.

6 Tenuissimus enim humor est.

7 Ob humoris calidi siccique dominium: & quòd materia febrilis non procul abest à stomacho.

8 Cuius causas vide cap. 12. lib. 1. part. 19.

9 A siccitate cerebri.

10 Quia bile perfunditur.

11 In incremento statùque paroxysmi, pulsus vehemens ac frequens est, sed initio paruus, ac contractus.

12 Ab arteriæ & humoris in ea contenti siccitate.

13 In accessionis declinatione sudor fit, reueratis caloribus vi cutis meatibus. Breuissima verò tertianæ febris est accessio, nempe duodecim horarum ad summum, quia biliosus humor (huius febris materia) paucissimus omnium est ac tenuissimus.

HEMITRITÆI SIGNA.

CAPVT XXXI.

HORROR³ continuæ iunctus notat hemitritæum.

1 Hemitritæus, seu semitertiana, sic dicitur, quia media materiæ pars ex huius humoris est genere, quo tertiana fit. Constat enim ex pituita, & bile: quæ quum æqualiter inter se miscentur, & peccant, exquisitam faciunt hemitritæum.

2 Accessionis quotidianæ signum est refrigeratio, tertianæ rigor: horror autem vtrinque medius. Quum igitur quotidianæ, tertianæque febris accessiones concurrunt in hac febre, fit horror. Hinc hemitritæus horrida febris appellatur. Quæ pericu-

D ij

lofa censerī debet, tum quia continua, tum quia contrariis cōstat humoribus, quorum vni si medendo conferas, alteri non rarò plurimùm incommodes.

3 Hemitritæus continua febris est. Vel enim ex cōtinua quotidiana fit, & intermittente tertiana: vel ex intermittente quotidiana, tertianaque continua. Coniicitur autem ex peculiari-
bus vtriusque signis, humorne pituitosus, qui quotidianam; an-
biliosus, qui tertianam constituit, exuperet. Nam, si biliosæ fe-
bris indicia plura sunt, qualia rigor, anorexia, vomitus, aut nau-
sea, sitis, sudor, vincit bilis. Sin plura dominantis pituitæ signa
comparent, vt frigus, sopor, albæ deiectiones, vrinæ crudæ, pi-
tuitosus humor abundat. Sin horror est, & humoris vtriusque
signa miscentur æqualiter, exquisita fit hemitritæus.

SIGNA 'QVARTANÆ.

CAPVT XXXII.

Si ¹ quartana venit febris, penetrabit in ² altum,
Ossaque cōtundet frigus, ³ tremor inde sequetur
Horridus, & stridor: lotium ⁴ tenuabitur, atque
Pulsus in ⁵ ingressu tardus, rarúsque ⁶ micabit,
Vt calor exister maior, propiórque vigori.
Sudor erit ⁷ paucus, reddentur sicca per aluum,
Lentaque ⁸ permultas accessio curret in horas.

1 Quartana febris, vel est vera, vel notha. Vera fit à melan-
cholico sanguine, nempe vsto, frigido, siccoque, præcipuam in
liene sedem adepto, senibus & autumnio familiari. Notha, sæ-
pius à flaua gignitur bile, non vsta quidem, sed quæ iam vritur
& transit in atram, sub medium ætatis, & ætate consistentes
corripere solita, cui fomes est in iecore. Fit interdū à pituita sal-
sa. Quod ex humoris dominantis peculiarib⁹ signis erit cōspicuū.

2 Melancholia putris, Quartanæ causā continens est. In qua
quarto quoque die paroxysmus, si febris est intermittens, reuer-
titur. Sin continua, quæ rarò fit, reduplicat accessio.

3 Melancholicus humor, sæculentus est, maximèq; terrestris:
ideoque in intimo corporis recessu conditus, si fortè, velut in
febre, concitatur, solidiores partes, vt artus & ossa, primùm ob-
sidet. Quinque sit frigidus & pondere grauis, frigoris & lassitu-
tudinis

rudinis sensum ibidem inducit, quem *ὀστέον*, i. ossium ex lassitudine dolorem appellāt, nō eum quidem, vt in tertianæ rigore pungentem, sed verè contudentem, quo dentes strident, vniuersumque corpus tremore concutitur.

4 Animalī facultate membrum attollente, sed id quidem diu nequeunte propter humoris, musculum aut neruum imbuentis grauitatem.

5 Obstructis meatibus. Quod fieri cōsuevit initio morbi. Pōst enim vrinæ crassescunt, reſeratis caloris febrilis vi ductibus, per quos ea transcolari aſſolet.

6 Accessionis initio pulsus rarus ac tardus est, nondum calfacta materia. Talis verò pulsus diurnus esse solet, cū ægrè calor accendatur, accēſitque vix sit per vniuersum corp⁹ æqualis, sed cum quadam permixtione frigoris, & permanēte quodam artuum ac ossium dolore.

7 Vt febris propius accedit ad statum, ita maior ac frequētiore est pulsus, agente in materiam magis magisque calore.

8 Quia frigidus ac siccus humor est, & in imo corpore veluti sepultus.

9 Nimirum in horas viginti quatuor.

EPHMERÆ SIGNA.

CAPVT XXXIII.

EXTERNA tantū fit febris Ephemera causa. Quam non sœua premunt symptomata: namque calore

Principium à 'blando ducens, in rore madenti
Definit, 'æqualis pulsus, lotiūmque colorem
'Natiuum, reliquāsque notas proferre videtur
Sanorum similes, 'speciem nisi denique mutet.

1 Euidentes (externas, & procatarticas synonymas appellāt) causæ, solæ non lædunt, nisi causa quædam interna deliteſcat in corpore, quæ impetum illarum excipiat, vt ait Galenus. At à solis euidentibus, idem inquit, causis, vt æstu, frigore, lassitudine, motūque vehementi, vigiliis, inedia, curis, mœrore, metu, febris Ephemera, seu diaria contrahitur. Ergo mirum non est, si leuia sunt Ephemeræ symptomata. Adde quòd Ephe-

*libro de
optima
seſſ. Es
de caus.
procatart.*

D iij

mera cōsider in solo spiritu, qui vt tenuis & vagus est, ita leuem citóque dissipabilem febrem adducit.

2 Caloris suauitas, proprium, & inseparabile signum est Ephemere febris, vt mordacitas, & acrimonia, putridæ. Ideo verò blādus est calor in Ephemeris, quòd soli spiritus (qui calidi, humidique sunt) effernescant.

3 Quamuis in Ephemeris sit æqualis pulsus, est tamen celer ac validus: eaque nota a sanorum pulsu distinguitur. Sed æqualis est, quoniam humores in arteriis contenti non impelluntur, nec vlli vapores putridi, vel acres, vel maligni cor impetunt, vt in cæteris sit febribus.

4 Vrinæ concoctionem primo statim die videri, proprium est, & inseparabile febris huius indicium. Nam in ea non languet natiuus calor, nec humores noxii naturam ab instituto reuocant, vt in cæteris febribus contingit: sed soli spiritus, (insistentes, non insiti) per arterias in omne corpus illabuntur placide, nullo consistentes loco.

5 Vera diaria viginti quatuor horarum spatio clauditur. Quæ si vertitur in synochum simplicem, quam ephemeram plurium dierum nuncupari iam antè diximus, aut putridam, aut hecticā, in plures dies profertur accessio. Et tunc alia signa comparent in vrinis, pulsūque, quàm in absoluta diaria. nec tum diaria febris, sed humoralis, aut hectica nominanda.

'HECTICÆ SIGNA.

CAPVT XXXIIII.

Ex sicco veniens calidóque diaria febris,
 Illius caput est, quæ dicitur hectica: quæ si
 Partibus incumbit solidis, durúsque, frequensque est,
 Debilis ac parvus pulsus, caua tēpora, plumbum
 Fœda refert facies, nullus dolor afficit ægrum.
 Tangenti primò blandus color esse putatur,
 Mox tamen est mordax, lotiòque innare videtur
 Pingue oleum, coriūque instar cutis aret, inanis
 Deprimitur venter, corpúsque fit ossea molés.

I Febris

1 Febris ea de qua nunc agimus, hectica propriè nuncupatur, quòd ægerrimè solui queat, & in habitu sit corporis: quamuis omnis febris contumax, à quocunque nata sit humore, communiter *ἡκτική* vocitetur, vt *ἡκτική* solutu facilis. *ἡκτική* enim, vnde nomè hectica, qualitas est à subiecto ægrè mobilis, vt *ἡκτική* facile.

2 Intemperiem calidam siccam ab externa causa profectam, *libro 9. mesh.* hectica principiū esse sic statuit Galenus: Quoties, inquit, alicui vel ex lassitudine, vel ira, vel pluribus curis, vel vigiliis, vel tristitia, vel inedia longa, vel vniuersis vnà coeuntibus siccatum corp⁹ est, ac febris inuasit, quæ & aridā reddit cutem, & igneum calorem refert, eum vtiq; timor est hectica febre correptum iri, potissimū æstate, cælique statu calido siccoque. Quamobrem is author prisanæ cremorem, aut sorbitionem ex alica, deindeque panem ilico dari præcipit: itémque frigidæ potionem, nisi putris humor, aut ingens phlegmone dehortetur. Præcipit & balneum, ne siccitas & calor in visceribus hærens, hecticam red dat insanabilem.

3 Solidæ partes, in quibus hæret hectica, triplici substantia constant, humida, carnosæ, fibrosæ. Si humidam (quæ proprium est partium alimentum) febrilis populatur calor, primus est hectica gradus: Si carnosam, secundus: Si fibrosam & membranofam, (quæ propriè similis & solida nuncupatur) absumit, tertius. Quæ postrema species, hectica marasmodi, seu tabes, & marcor appellatur, prorsus incurabilis. In hac enim, quam hoc capite præcipuè notamus, exhausto humido primigenio (cui in solidis partibus est peculiare domicilium) remanet extrema siccitas, & virium imbecillitas, vnde mortis necessitas inuitabilis.

4 Ob arteriæ, vt & totius corporis, siccitatem.

5 Vt refrigeretur cor crebro aeris in arteriam appulsu.

6 Ab infirmitate vitalis facultatis.

7 Pulsus in hectica parvus est, quia cor (cuius illa primū, deindeque reliquarum partium similium substantiam obsidet) caloris natui penuria marcescit, deseruntque spiritus cum sanguine, quibus existentibus in omnem dimensionem dilatetur arteria. Peculiare tamen hectica signum est, hora vna vel duab⁹ à cibo crebrescere pulsus, ac celeriore euadere. Quod non pendet à proprio naturalique, sed hectico calore partium solidarum, quæ cibo, velut calx aqua, prolutæ atque madentes, calorem acriorem in omne corpus effundunt.

8 i. plumbi colorem, necroseos imminenti signum.

9 Est enim æqualis intemperies.

10 Quia febrilis hectica calor internus est, potissimū in vī-

D iij

sceribus hærens, primò non sentitur. At si diutius admouetur manus, paulatim acredo quædam, & velut erosio percipitur. Quod ideo fieri putem, quia calor acer ad tangentis medici manum, quæ temperatior est, tanquam ad humidum accurrit.

11 Colliquatione partium solidarum.

12 Quod est summæ siccitatis indicium certissimum. Cutis quippe referre solet totius corporis temperamentum.

13 Consumpta parte carnosâ musculorum abdominis, subiectarumque partium adipe liquato.

SIGNA FEBRIS PESTILENTIS.

CAPVT XXXV.

A¹USTRINVS, ventisq; silens, & nubifer annus
Omne habet, Stygiæq; iacit fundamina pestis:
Quæ quâdo tremulum percellit & obsidet ægrum,
³Languidus apparet pulsus, crebërque, celërque,
⁴Paruus, ⁵inæqualis, ⁶capitis dolor, & graue pondus,
Mœror, & aspectus ⁷varius toruüsque, frequensque
⁸Defectus, ⁹vomitüsque, ¹⁰sitis, ¹¹dyspnœa, phrenitis,
¹²Egelidümque foris frigus, calor intus adurens,
¹³Lethæüsque sopor feбри coniunctus edaci.
Ne ¹⁴lotio fidas: sed quum ¹⁵tumor inguina pungit,
Auribus, axillisve subest, anthraxve perurit,
Effuge, si metuis. Sin vir cupis arte mederi,
Quære Deum primò, calida qui iustus in ira
Nos ¹⁶solet humanos fontes hoc perdere telo.

1 Auster, ventus est calidus humidus, qui si largos & longos imbres effudit, humiditatem inducit corporibus, eo maiorem, quo sine ventis fuerit. Nec enim tum corpora difflantur, nec digeri potest humor supernacaneus, vnde necessaria putredo. Quæ quum sit vulgaris, ex infecto aere (quem omnes hauriunt vel inuiti) genita, febrem infert Epidemiam. Ergo cum annus Austrinus, pluuius, à ventis in totum silens fuerit, pestilens febris expectanda.

2 Pestis, febris est Epidemia, contagione deleteria. Eam quidem

dem simplicem & puram, nullius intemperiei, vel putredinis esse sobolem, sed cæcam, malignam, & inexplicabilem aeris pernicië, quæ à superioribus aere causis manet ac deducatur, longa verborum rerumque serie demonstrat Fernelius. Qui ne videatur ab Hippocratis & Galeni (qui omnium pestilentium febriū causam esse putredinem statuunt) opinione omnino discedere, tria communium morborum, quæ pendent ab aere, genera constituit: Endemium, Epidemium, & Pestilens. Primum à terrenis, & inferioribus expirationibus putridis oriri vult: Secundum à vehementi temporum tempestatūque mutatione, quæ febres & putredinem pariter inuehit, proficisci: Tertiam ab occulta malignaque qualitate cælitus immissa deriuari. Cuius sententiam ut veram amplectimur. Nectamen hîc sola pestilentis febris ab eo constituta pathognomonica, sed & Epidemiæ communia signa persequimur, quum illa sine putridæ permixtione vix vnquam appareat.

libro 2. de
abdit. rer.
caus. c. 12.

3 Pulsus est in hac febre languidus, quia natiuus calor est minimus, præter naturam plurimus, à quo vitalis atteritur facultas. Etenim aura pestilens, ut omne veneni genus, genuina sua proprietate, cor, vitæ fontem ac domicilium primò petere solet, ac dein reliqua viscera, totūque corpus inuadere.

4 Vapore maligno natium cordis calorem agitante.

5 Eodem consumente spiritus animales.

6 Ex agitatione, siccitateque spirituum animalium, ob febris Epidemiæ calorē: vnde phrenitis ac mania nonnullos adoritur.

7 Aura pestilens inspiratione attrahitur in pulmones, ab eisque quamprimum sine sensu in cor penetrans, idēque, si minus resistere valet, inquinans, vires omnes, præcipueque vitales infringit. Vnde syncope, pathognomonicum, si quod est, pestilentis febris signum habendum est, ut pulsus parvus, frequens & inæqualis.

8 Qui fit, cum humores putridi, maligni, in ventriculi fundo turgent, ut cum sola infensa est qualitas, nausea contingit.

9 Quum pestilentis febris calor insigniter putridus, ideoque valde mordax acerbq; fit, si Galeno credimus: in ea sitim esse necessarium videtur. Sitis tamen interdum exigua, vel nulla viget, aut quia caput humore multo rigatum, mentem & sensus hebetat, aut naturalis ventriculi facultas extincta est, si delirium abest: quo posito, mentem ægrotare coniiciendum.

communis.
1. in lib.
6. apud.

10 Obsesso thorace.

11 Quod est signum incendii viscerum.

12 Talis enim sopor concidente robore spiritus animalis accidit, nisi multus in cerebro dominetur humor, ab Austrina cō-

stitutione genitus.

13 Est enim aliquando sanorum simile. Sæpius verò turbatum, *lib. 3. epi - ut notat Hippocrates, & nos in multis obseruauimus in eo pedem. sect. stilentis statu, qui Luterianos in primis torfit, anno salutis mil- 3. part. 15. lesimo quingentesimo octogesimo.*

14 Quum in inguine tumor apparet, hepatis: quum in axillis, cordis: quum sub aure, cerebri robur indicatur, si febris nõdum apparet, vel mediocris est, viriũque robur, & symptomatum lenitas existit. Sin signa, quæ commemorantur hoc capite, se proferunt cum bubone vel carbunculo, malum. Hinc enim colligitur materiæ malignæ quantitas. Nec verò signis vel optimis fidendum in hac febre, quia cuncta sunt infida, moriturque repentè, qui vitam in multos annos polliceri videbatur.

** libro 2.*

reg. c. 24.

& 1. Pa-

ralis. c. 21.

** cap. 44.*

** cap. 5.*

15 Hoc in* Dauide notatur, cuius ob numeratum populum crimine pestilens morbus triduo ita sæuit, vt septuaginta viro- rum millia perierint. Eandem luen* Ieremias & * Ezechiel prophetae Iudæis minantur, errata sua non agnoscentibus.

LIBRI SECVNDI FINIS.



DE SIGNIS

MORBORVM

liber tertius.

OE SOPHAGI STOMACHI- QUE MALE AFFECTI SIGNA.

Caput primum.

B²VLIMVS, atque fames, quæ dicitur esse¹ canina,
⁴Pica, dolor³ spinæ, potus via^o stricta, cibique,
⁷Lautarumque dapum fastidia longa, sitisque,
Contingunt patiente gula mortalibus ægris.

1 OEsophagus viæ cibi nomen, ait Galenus, est proprium: stomachus, commune. Quare qui stomachum ait, œsophagum etiam, ex eius sententia comprehendere videtur: unde cōplures ea nomina confundunt. Propriè tamen œsophagus ille meatus est, qui à faucibus ad os vsq; ventriculi laryngi subteditur. Stomachus autem, vētriculi solum superius orificium, quod xiphoidi cartilagini subiacer, à natura cōparatæ, vt ipsi⁹ sit propugnaculū.

2 Bulimus fit, quum os ventriculi refrigeratur ab externa causa. Vehemens autem frigus cuius nervosæ parti, quamobrem & gulæ, molestiam infert. Hæc igitur vt tollatur, stomachus calidi sicque desiderio, nempè fame tenetur. Hinc in cibos avidissimè ruit. Quorum copiam cum nequeat conficere ventriculus, frigidus fit, nativumque calorem amittit: unde postea deicitur appetentia, pulsus languet, & animi deliquium accidit, prostratis denique viribus. Itaque Bulimus, vt nomen sonat, initio quidem famem ingentē habet, post autem inappetentiam.

3 Appetentia canina fit interdum ab externa refrigeratione,

*lib. 4. de
usu part.*

quæ sensum inanitionis inducit, vt bulimus. Interdum ab acido quodam humore, ventriculi os imbuen- te. Sed in appetitu canino frequens est vomitus: in Bulimo, nequaquam.

4 Appetentiæ depravatæ symptoma Pica est, qua stomachus alienos cibos, vt terram, carbones, incoctas carnes, & peiora his expetit, mulieribus granidis, quàm viris magis peculiare vitium. Quod accidit, ventriculi tunicis excrementitio quodam humore delibutis, & infarctis.

5 In quam reclinat, & adhærescit œsophagus.

6 OEsophag⁹ interdum, sed rariùs, ab intemperie simplici, vel à scirrho, phlegmoneve têtatur, vix vnquam à cæteris affectibus. Scirrhum indicat maxima deglutiendi difficultas, at sine dolore: Phlegmonem dolor lancinans, calor, febris, sitis cum difficultate vorandi: Simplicem intemperiem cibi potûsque tardior transitus, citra angustia dolorisve sensum.

7 Periphrasis est anorexiæ: quæ sit alimenti copia referto corpore, nec huius quicquam fugentibus è ventriculo venis.

8 Sitis, est frigidi humidique potus appetentia. Quæ duplex est, naturalis & animalis. Illa principiû ducit à iecore: hæc ab orificio ventriculi per neruos sextæ cõiugationis illic insitos, per quos cibi, potûsque penuria pressum animal, inuitatur ad expetendum id quod sibi iucundum est.

INTEMPERIEI VENTRICVLI SIGNA. CAPVT II.

L'ONGA sitis, gelidi facilis concoctio potus,
Gratâque quæ frigent admotâque, sumptâque,
'nidor

A calidis, sensus rodens, vt & oris amaror,
Nausea, singultûsque, notant ardore teneri
Ventriculum. Sin frigus habet, contraria dictis
Signa vigent. Sic, si madidus supereminet humor,
'Potus obest, calidique cibi, sicci que petuntur,
Quos stomachus refugit, vëter cum pendulus aret.

I Quum

1 Quum ventriculus intemperie calida premitur, sitis diuturna torquet, si talis intemperies est impressa parti solidæ, nempe tunicis. Sin vitium est in humoribus, quos ille suo sinu continet, his sublati cessat & sitis.

2 Calida torrentur & assantur à calido ventriculo. Quare tunc non hæc, sed frigida conferunt, nempe quæ temperent illius ardorem.

3 Bilefcentibus in ventriculo succis. Assati etenim ob intemperiem ventriculi calidam humores, in bilem abeunt.

4 Qualia sunt cibi potúsque calidi desiderium, horror, perfrigeratio, tarda cōcoctio, ructus acidus, ventriculi grauitas, & lāguor.

5 Quum potus humectet, humido ventriculo molestus est, siquidem eum obtundit atque dissoluit. Quum verò multus humor aquosus huic innatat, aut eius tunicis impactus est, expuitio fit frequens sine tussi, saliuam multa per interioris tunicæ continuationem in os exurgente.

CHOLERÆ MORBI SIGNA.

CAPVT III.

INTESTINA ferox, stomachumque immaniter vrget

Bilis, & erumpens vomitu, motuque per aluum,
In cholera, subitum dat signa minantia lethum.
Namque intrò refugit pulsus, crebròque cietur,
Atque acris sitis est, extremaque frigore torpent.
Quique venit sudor¹ malus est, sit¹ luridus vnguis,
Conuellique⁶ manus, carnosaque sura videtur,
7Mens labat, &⁸ diri sequitur mors plena doloris.

1 Cholera morbus, acutissimus affectus est, ita nuncupatus, quòd in eo bilis (quam choleram vulgus medicorum appellat) sursum ac deorsum impellatur. Non tamen ἀπὸ τῆς χολῆς, sed ἀπὸ τῶν χολαίων plerique deriuant. At vtrumque verum est, quum sit cholera vetriculi intestinorumque commune vitium. Nec verò sola bilis per hunc affectum educitur. Nam, inquit Aretæus, quæ primùm euomuntur, aquæ similia: quæ anus effundit, stercorea sunt, & liquida, tetricque odoris, siquidem longa cruditas id

libro 2. de
signis &
caus. acut.
morb. c. 5.

malum excitauit. Si magis sæuiat morbus, tum syncerè flaua bilis, deinde nigricās excitatur: deiectiones quoque similes sunt.

2 Ob bilem, pungentem os ventriculi superius, ibique sensum caloris excitantem.

3 Nam calor intrò cogitur.

4 Nempe paucus, & diaphoreticus. Aut ἐφιδρωσις est, aut σίσις, siue mador, non verus sudor, præsertim apparentibus signis lethalibus.

5 Ob extremarum partium frigus, quo natius earum calor obruitur, & quasi suffocatur.

6 Nervosi generis sympathia. Nam in hoc affectu ventriculus & intestina, vicinæque his membranæ cum nervis mirè torquentur à copia flatuum, violento motu bilis, & eiusdem acrimonia atque calore, quibus ut liæ, sic extremæ partes resiccantur, distendantur atque conuellantur, in primis quidem manus, pedes, & suræ, quia musculos habent plures.

7 Affecto corde per consensum oris ventriculi.

8 Per conuulsionem, strangulatum, & inanem vomitum.

OBSTRVCTI IECORIS NOTÆ.

CAPVT IIII.

QVVM iecur¹ obstruitur, ²grauis est, & ³tensa dolorem

Exhibet ⁴obtusum lateris pars infima dextri.

1 In iecur, facultatis naturalis sedem, & præcipuam gignendi sanguinis officinam, humor aliquando pituitosus è cerebro per ventriculum & venas illabitur. Interdum etiam crassum, viscidum, & multum illuc trāsmittitur alimentum. Nōnunquā & biliosus humor in eo genitus ibidem crassescit, & contumaciter adhæret. Quæ quū per tenuissimas venas necessariò traducantur, nullū æquè viscus, ut hepar, obstructione tetari cōsuevit.

2 Obstructio iecoris à commemoratis modò causis efficitur, quæ nullius tumoris febrisve particeps, si ea simplex est.

3 In hepatis obstructione tensio fit ad hypochondrium dextrum, potissimum si mox à cibo subitur exercitatio. Tum enim ut materiæ cōstituentis obstructionem, sic & ingesti cibi portio quædam abit in flatus.

4 Obstructo citra phlogosin aut inflammationem iecore, dolor aut nullus, aut obtusus est. Etenim crassus ac lentus humor obstru-

obstructionem facit, & affecta pars non est exquisito sensu prædita. Nam in hepar minimus inseritur nervus, non tam ad sensum, ait Galenus, quàm ad infestæ rei dignotionem à natura tributus.

*libro 5. de
usu part.*

INFLAMMATI IECORIS INDICIA. CAPVT V.

SI N tumor igneus est, dextrum graue fit latus
imū,
Eque³ nothis costis⁴ iugulum dolor appetit ardens:
⁵Sicca tenet tussis, ⁶dyspnœaque, febris ⁷acuta,
Nausea, contemptusque cibi, sitis ignea, linguæ
Scabrities, & huic⁸ saniosus lentor inhærens.
Erumpit vomitu bilis⁹ syncera, vel ¹⁰aluo
Deiicitur, lotiūmque rubens vesica profundit.

1 Cum sanguis tenuis, aut feruidus, aut acer, aut præ copia nimium exuperans e suis vasis in carnosam hepatis substantiam effertur, ibique putrescens, eius parenchyma labefactat, iecur inflammationem concipit. Cuius phlegmone periculosa, ob ipsius visceris nobilitatem, febris magnitudinem, & consensum, quem ille cum cæteris principibus partibus nanciscitur

2 In hepatis phlegmone dextrum hypochondrium est graue. Nam hepar ibi consistens sanguinis multi copia turget, suæque mole deprimitur.

3 E regione diaphragmatis, cui iecur annectitur.

4 Dolor hîc à nothis costis ad iugulum vsq; protenditur, per continuationem succingentis membranæ, quæ tum cõuellitur seu retrahitur. Quod in primis obseruatur, quum tactu premitur hepatis regio.

5 Nec enim in thorace materia continetur, vt excludi possit per tussim, sed sub diaphragmate reconditur. Ideoque non propriè tussis appellari potest, sed ad tussim proritatio quædam, ab humoris serosi resudatione in diaphragma, hepati incumbens & contiguum.

6 Quum inflammatio gibbam hepatis regionem magis obsidet, spirandi difficultas, tussis, dolorque iugulum retrahens est grauior, & decubitus in dextrum latus molestior. Sin sinam

seu cauam, cibi fastidium, nausea, sitis, vomitio, vel per aluum deiectio biliosa magis vrget, nec æquè grauis est in latus ægrum decubitus.

7 Febris hæc, vt acuta est, ita symptomatica. Nec enim in venis maioribus eius materia proxima, continensque causa reconditur, sed in parenchymate iecoris, ex quo vapor teter ac putridus assiduè cor impetit, dum febris omnino desinat. Est enim affecta pars cordi vicina, quæ & insignem veluti tubum habet, nempe venam cauam, per quam affectus suos eidem communicet.

8 Qui flauescit primò, deinde nigricat.

9 Syncera bilis excernitur in hoc affectu, calidioribus per inflammationem redditis humoribus. Excernitur & æruginosa, vitellinæque, flaua bile per summum calorem assata.

10 A qua vel diarrhœa, vel dysenteria nōnunquam infligitur.

11 Vt rubrum, ita crassum ac turbidum lotium in hoc affectu profunditur. Rubrum quidem, à sanguinis dominio: crassum ac turbidum, ab humorum iecoris partes cauas implentium abundantia.

SCIRRHI IECORIS NOTÆ.

CAPVT VI.

HINC scirrhus sequitur, durus tumor³ absque dolore,

Quem³ circumscribit iecoris situs atque figura.

Exanguis facilè in dextra tum parte reclinat

Æger, at in ¹læua regione quiescere nescit.

*libro 2. ad
Glauc.
capit. 1.*

1 Inflammationem statuit Galenus duplicem: humidam & siccam. Humida, ex calida fluxione membrum occupante fit: Sicca ex naturali calore membri efferuescente. Prior, quæ vera est phlegmone, rarò scirrhi iecoris est causa. Sed quum hepar inflammationem concipit, quia viscus est natura calidum & humidum, in periculosum abscessum ferè desinit: quamuis idonea vacuatione, sumptis & admotis refrigerantibus & roborantibus nōnullos obseruauerimus pristinæ restitutos sanitati. Posterior (quæ potius est erysipelas phlegmonodes, aut hepatis sola phlogosis) interdum iecoris scirrhum facit in iſtericis, & natura biliosis. Aliàs, ex obstructione contumaci fit in iecore scirrhus, humore crasso terrenoque, per eius effuso substantiam, illicque coale-

coalescente.

2 Nisi quando pars affecta durius premitur.

3 Si gibbā, simāque simul, vel gibbam solum iecoris partem scirrhus occupat, tumor est in hypochondrio dextro circumscriptus, qui tactu facile dignoscitur. Sin simam tantum, nulla substantiæ iecoris, proinde nec scirrhī figura notari potest. Quin & tumor plerumque decipit, quum profundus sit & à gibbo iecoris corpore, quod primum occurrit, tangi prohibeatur.

4 In scirrho iecoris, decubitus sinistri lateris molestus est, tum quia tenduntur ligamenta, quibus id alligatur, tum quod in ventericulum incumbit moles, quæ suffocationis metum incutit. Contrā fit in scirrho lienis.

IECORIS 'IMBECILLI NOTÆ.

CAPVT VII.

NOVERIS 'hepaticos, niueus si 'cremor ab aluo

Labitur, aut 'liquidus, vel 'crudus quilibet humor, 'Rubra velut sanies, aut 'fæx velut atra cruoris.

1 Facultatibus, à quibus regitur hepar, à suo munere deficientibus.

2 Hepatici propriè dicuntur, vt monent Galenus & Aetius, quibus citra manifestum aliquod in viscere malum, in actionib⁹ propriis languescit hepar. Vnde colligendum, affectionis hepaticæ causam esse solam iecoris intemperiem, per quam facultates quidem omnes, sed alteratrix omnium prima ad tantam imbecillitatem peruenit, vt quæ prius ex proba tēperie laudabilem creabat sanguinem, ab ea deficiens, crudum & semicoctum reponat.

3 Confectus chylus, expultrice ventriculi facultate in mesaraias venas impellitur, attrahendus à iecore: cuius quum facultas attrahitrix languet, chylosa, quæ cremoris speciem habent, per sedem elabuntur.

4 Quum hepar est validum, exugit à ventriculo venisq; proximis humorem, quem in crassat coctione. Quum imbecillum, eum vt antè trahere non potest, ideoque liquida per aluum excernuntur.

5 Alteratrice, & sanguifica vi languida. Cuius certum argu-

E

*libro 8. de
composit.
medic. se-
cundum
loc.
terrab. 3.
sermon. 2.
capit. 1.*

mentum est, si pedes primùm, deindèque cæteræ partes intumescunt, ut in iis animaduertitur, qui è gravi morbo resurgunt, nec non hydropicis, scirrhosis, isticis.

6 Rubra veluti sanies, loturæ carnis recens macerata similis, alteratricem iecoris facultatem moliri aliquid indicat, sed imperfectè, nempe quæ sanguinem nō gignat colore & cōsistentia laudabilem: Retētricem verò plurimùm imbecillam, ut quæ semicoctum sanguinem sinat effluere.

7 Quæ nigrum sanguinem refert. Diligenter tamen consideranti nec sanguis niger est, nec grumus, sed veluti limus quidam sanguinis crassus, qui propè ad atrā bilem accedit, ut ait loco nuper citato Galenus. Arguit autem ista deiectio frigidam hepatis intemperiem, ut calidam colliquationes primùm humorum, dein carnis hepatis, deiectiōque bilis crassa, graueolens, & valde colorata.

TENSIONIS LIENIS SIGNA.

CAPVT VIIII.

DI STENDENS tumor est in molli sæpe
liene,

Quem dyspnœa notat, leuis & defectio cordis,

Et pallens facies, concoctio praua, soporque

Confusus spectris, pavor, & præcordia læua

Flatibus aeris cum murmure tensa sonoro,

Contēptusq; fugax rerum, graue corpus, inersq;.

1 Lienis corpus, instar spongiæ laxum & rarum est: & humores, quos in se continet, flatulenti sunt. Hinc fit, ut interdum sine scirrho distendatur. Scirrhum indicat tumor durus ac renitens: tensionem contrā, tumor laxus, & tactui cedens. Tensionis verò materia sæpe solo liene concluditur, tūmq; splenis situm figuramque retinet. Interdum vniuersum hypochondrium implet. Nonnunquam etiam in omentum effunditur, tūmq; sub vmbilico tumor est.

2 Humor melancholici (qui terrenus est, ac veluti fæx, limusque sanguinis) sede.

3 Presso diaphragmate per lienis amplificationem, & tum maxime, cum ventriculus cibo turget, aut in dextrum latus decumbitur,

bitur, aut curritur.

4 Fuliginosis vaporibus in os vetriculi superius aut cor elatis.

5 Tumor enim attollit ventriculum : ideòq; cibi vel illius fundum ingredi nequeunt, vel in eo diutius immorari.

6 Quia caput grauaturs crassorum vaporũ ascensu, qui quum fuliginosi sint, terrorem incutiunt dormienti.

7 Suscitatis cum ab humore melancholico, crudove, tum ab imperfecta chylosi.

8 Fuliginoso vapore, menti tenebras offundente.

9 Humoris terrestris tæculenti que dominio.

HYPOCHONDRIACÆ MELANCHOLIÆ SIGNA. CAP. IX.

ATER & interdum præcordia detinet humor,
Inuoluens picea trepidam caligine mentem.
Qui quando ferus est, & anhelio turgēt ab æstu,
Mollia ventoso reboant hypochōdria flatu,
Cor tremīt, & validè pulsans citò linquitur, atque
Puniceus faciem tingit color, iraque feruens
Præcipitat, fumusque vagos obscurat ocellos.

1 Hypochōdrium, eam corporis humani regionem significat, quæ à nothis costis ad ilia vtrinque porrigitur, eamque, quæ xiphoidi cartilagini subiacet. Quibus sedibus quoniam includitur materia, multiplex quidem, sed hîc nigra præsertim, & adusta flatulentaque, quæ hinc prodit affectio, hypochōdriaca melancholia, seu flatulentus morbus appellatur.

2 Atra bilis, hypochōdriacæ melancholiæ causa continens est: quæ quum incalescit & putret, perniciosam substantiæ conditionem induit, quæ maligno vapore non è liene tantum, sed & è mesenterio, vicinisque sedibus in cor & cerebrum exhalat, eaque symptomata, quæ commemorantur hoc capite, cõcitat.

3 Obsessum humoris maligni vapore.

4 In hypochondriaca melancholia, corde, fluctuantis humoris æstu lacessito, pulsant insigniter arteriæ, sed hæ potissimum quæ præcordiis insunt, quia bilis incādescens focus ibi consistit, ex quo vapor excitatus promptissimè in eas euolat.

E ij

INFLAMMATI MESENTERI

SIGNA. CAP. X.

M^{ULTIPLICES} latitant mesaræi in corpore morbi.

Qui quum sint ¹leuibus soliti se prodere signis,
Inculti iacuere diu. Quin sæpe fefellit
Clausus in hoc ²tumor accensus. Nec enim ³dolor
vrget,

Nec febris, nec magna sitis sed pondus in imo
Ventre grauat, saniesque rubens, púsque exit ab aluo

1 Natura superuacuorum humorum sarcina fessa, portionem eorū in mesenterium, & pancreas, velut in sentinam plerumque deponit. vbi quum hi diu citra molestiam subsistere, tandē aliquando vel acrimonia, vel copia graues, diarrhœam, dysenteriam, melancholiam, choleram morbum, atrophiam, cachexiam, erraticas febres, aliósque latentes morbos inducunt.

2 Mesenterium non omnino doloris est expert, quum præter venas & arterias quamplures neruum vnum accipiat. Sed sine manifesto dolore est, solūque grauitatis sensum habet, inquit Fernelius: licet grauitatis & tensionis sensum ei tribuat Auicennas.

lib. 6. parhol. c. 7. lib. 3. fen. 14. c. 11.

3 i. phlegmone.

4 Quia mesenterium exiguum dolorem sustinet, & à stomacho, cordeque procul abest, in eius phlegmone nec dolor, nec sitis, nec febris, nisi lenta, premit, quum in cæterarum partium inflammationibus plurimum hæc symptomata grauent.

ICTERI NOTÆ.

CAPVT XI.

A^{D NATÆ} croceusve color, viridisve, fluēsque;
Per lorium bilis sumptorū ¹instarq; ciborum
Alui proluues arquati signa putentur.

1 In

1 In iſtero, ſeu morbo regio cutis quidem vniuerſa bile tingu-
gitur, ſed adnata oculi tunica vitium apertius detegit, quia
naturâ cute candidior eſt.

2 Icterus duplex hic notatur, ſtauus, à pallida, ſtauiue: niger
ab atra bile, poſterior cutem inſicit colore ſubuiridi, quia fit à ni-
grâ bile viridi permixta, ſecundum Aretæum; prior ſtauo, vel
citrino.

3 Ex cauſarum iſteri varietate varia per aluū iſterici reſiciunt.
Ve, ſi cysitis, ſeu veſica fellis obſtruitur, ſæces albæ ſunt, atque
erectæ, tardèque descendūt. Nec enim tum ſubit aluum bilis,
ſed in ſecur & venas, vniuerſumque corporis habitum faceſcit:
quam denique natura propellit in renes vni cum vrina, eamque
lucido colore tingens, craſſam, impuramque reddit. Si calida ſic-
cique totius corporis, ac præſertim hepatis intemperies, aut
animalis virulenti morſus, aut potio deleteria, aut facultatis
ſecreticis imbecillitas iſteri cauſa eſt, & obſtructio nulla, vt per
vrias, ita per aluum ſecedit bilis. A liene ſi fit iſternus, excremēta
portacea nigrique redduntur, & quum arida ſint, tardius de-
ſcendunt. quemadmodum & ea quæ candicant à folliculi fellis
obſtructione. Sin à ventriculo (nam hic, vt & colon inteſtinum,
iſterum parit, vt vult Aretæus) arquati cauſa petitur, talia ſerè
per aluum exeunt, qualia ſupra ſunt, læſa coſtricta facultate.

libro 1. de
ſignis &
cauſ. diſ-
cern. mor-
borum ca-
pit. 15.

ATROPHIÆ, CACHEXIÆQUE SIGNA. CAP. XII.

ATROPHIA corpus ſenſim 'langueſcit, &
aret,

'Aſurgit contrà, ſi fortè 'cachexia vexat,

In molem, vnde 'graues ſunt, at ſine viribus artus.

Fit 'pallens linensve color, ſpiratio 'rara,

'Neglectuſq; cibi eſt, abeuntque impura per aluum.

1 Atrophia, nutritionis defectus eſt, quo corpus ſenſim mar-
ceſcit & abſumitur. Symptoma eſt facultatis naturalis, qua malè
trahitur, aut retinetur, aut concoquitur alimentum, aut excre-
menta perperam expelluntur, ex quorum (bilioſorum imprimi-
mis) colluue ſcattente corpore, naturalis ſpiritus, calorque ita
proteritur, vt probum ſanguinem nequeat conficere, quo cor-
pus vniuerſum (ſi communis atrophia eſt, ab aliquo primùm

E ii)

inducta viscere) vel eius pars aliqua (si partis solius est atrophia) nutriatur.

2 Ut in atrophia, sic & cachexia vires effœtæ languent. Sed in atrophia, quod nulla: In cachexia, quod vitiosa sit nutritio.

3 Est in cachexia satis ampla corporis moles, crudis succis in venas habitumque corporis illabentibus.

4 Cachexia, malus corporis habitus est. Quod vitium ex praua ratione victus, & viscerum (ventriculi præsertim ac iecoris) imbecillitate vel impuritate contrahi solet: vnde malè concoquitur alimentum, crudumque permeat singulas corporis partes, quibus apponitur & agglutinatur quidem; non perfectè tamen assimilatur: hincque vitiosa nutritio. Quæ solidas partes attingens, totius corporis œconomiam inuertit.

5 Ex copia crudorum humorum: qui quum inferiores partes naturali motu magis affectent, stantibus pedes tibiæque solent intumescere.

6 Est enim hic affectus oppositus Euexiæ, ex qua chylosis, hæmatosis, & omnis naturæ functio provenit: ideoque bonus color, facilis spiratio, validæ vires, & prima omnium sanitas. In cachexia contraria sunt omnia, imbecilla nempe coctio atque cruditas, sanguinis prauitas, color pallidus, aut citrinus, aut liuidus, graue corpus & inualidum.

7 Ab imbecillitate natiui caloris.

8 Initio quidem morbi ciborum auuiditas est, deinde magna cruditas nequeunte ventriculo quod assumpsit coquere præ caloris inopia. Sed in fine fastidium, multis iisque crudis humoribus in ventre fluctuantibus.

HYDROPI SIGNA.

CAPVT XIII.

HYDROPEM ²fœdus color arguit & tumor
³ingens,
Et ⁴sitis, & ⁵dyspnœa, cibique auersa cupido,
Occupat & ⁶varias inflatio turgida sedes.

1 Hydropis causæ multæ sunt, vt iecoris phlegmone, scirrhus, intemperies: lienis aut folliculi fellis sanguinem non depurantium vitium: renum, serum non trahentium obstructio vel imbecillitas: mensium, aut hæmorrhoidum suppressio, vel fluor im-

immodicus, unde vel suffocatur, vel exhauritur spiritus cum sanguine. Quibus, & aliis plerisque causis refrigeratur hepar, & hæmatoris deprauatur. Causa verò princeps, malus est corporis habitus. Ideoque priusquam hydrops fiat, cachexiæ signa solent præcurrere.

2 Pallidus, & ex virore albicans.

3 Ventrem occupans in Ascite, vel Tympanite. In leucophlegmatia totum corporis habitum implens, unde nonnullis ea species hydropis vniuersale vocatur œdema, quum tamen inflatio veriùs, quàm tumor appelletur.

4 Quæ plurimum in Ascite viger. Serosus enim peritonæo contentus humor putredine falsedinem acquirit, ideoque sitim inuehit, vt & febrim, sed lentam.

5 Presso diaphragmate ex aquarum in abdomine stagnantium, si sit Ascites, aut flatuum copia, si Tympanites: aut plenitudine venarumque distensione, si Leucophlegmatias. Quæ tres sunt hydropis species.

6 Vt, in Ascite ilia, scrotum, ac pedes inflantur, brachiis ac facie reliquisque partibus gracilibus. In leucophlegmatia facies, collum, & brachia, mammaeque tument, & abdomen ex inflatione crassescit. In Tympanite solum tenditur abdomen, quod percussum sonorum est.

FAECES ALVI RETENTAS QUÆ SIGNA COMITENTVR.

Caput decimumquartum.

INTESTINORVM sinuosus orbibus¹ humor
Affixus, claususque diu, nec lapsus in aluum,
²Ventriculo, ³stomachoque nocet, cerebrumque
⁴vapore
Percellit, corpusque ⁵gravi torpore fatigat.

1 Faeces retinentur in intestinis à tumore præter naturam, in eorum substantia genito: vel à ventriculi, viscerumve tumore, vermibus, enterocèle, cibus, aut enematis astringentibus: vel ab obtuso sensu, vt in apoplexia, paralyfi, veterino, sopito nervorum principio: vel stimuli, nempe bilis ad excernendum excitare solitæ penuria, quod fit in iætero: Vel denique vi caloris

E iij

exhausto succo, vel à mesenterii venis exuſto.

2 Inter humores, pituita maximè ventrem ſupprimi, non ea tenuis & aquoſa, quæ gigni in ventriculo conſuevit, & in ventriculū aliquando procumbere: ſed craſſa, lentāq;, peculiare ventriculi & inteſtinorum excrementum: quæ ibi concreſcens, vitrea fit & gypſea. Nonnumquam etiam in cæci, colivæ inteſtini cellulis diu coercita concreſcit in calculos.

3 Concoctionem impediendo.

4 Vaporibus, aut fumis, aut humoribus, nervos, qui illic è ſexta coniugatione reſident, ferientibus.

5 E retentis alui ſæcibus, in cerebrum efferitur vapor tenuis, vnde vertigo, cephalalgia: vel craſſus, vnde lethargus & apoplexia plerumque contingunt.

6 Denegata quippe excrementorum vacuandorum communiviam, peculiare corporis meatus implentur, obſtruunturque.

ILEI SIGNA.

CAPVT XV.

VOLVULVS hinc ſequitur, ſtomachus quo turgidus humet,

Et dolor intenus cruciat cum murmure ventrem:

Singultus, vomitūſque, furorque, & ructus inanis

Accedit, dyſpnœa, ſitis, pallorque, rigorque,

Defectūſque animi, ſtranguria, ſudor & algens,

Denique crudelis conuulſio, nuntia lethi

Sævit, & horrendum, dependet ſtercus ab ore.

1 Excrementorum alui retentio, de qua nuper, immediata eſt & prima, coniuncta nimirum ilei cauſa. Antecedens verò, ciborum multorum, vartorum, inuſitatorūque corruptio, & alia ſuper aliam cruditas. Retinentur autem hæc ob cauſas ſuperiori capite part. i. commemoratas.

2 Arctatis enim inteſtinis ab obſtructione, ſuſum exprimitur humiditas.

3 Nam inſtar chordæ tenſæ conſtringi & circumuolui inteſtina videntur ob magnam ex ilei phlegmone tenſionem. Quem affectum ideo χορδαſμός, & εἰλὴν dici contendūt. Quamvis chorda-
pſi nomen aliter deriuat Aretæus: & εἰλὴς, ſeu vōlvulus proprium

um nomen inuenire possit à torminibus, quæ plurima concitat flatus aut humor, dum per intestinorum anfractus reuolutus, sub viam & exitum quærit.

4 A flatibus, qui per longum intestini spatium admota manu persæpe sentiuntur.

5 Ileus non raro fit à crudis humoribus, retentis primò, deinde corruptis. Interdum ab intestinorum phlegmonosa diathesi, nonnunquam ab hausto veneno. Quæ tres causæ singultum prouocant.

6 i. malum non allegans.

7 Ileum definit Aretæus phlegmonem in intestinis, quæ perniciosum dolorem, tormina nimirum tanta, & tam acerba plerumque suscitatur, ut illis plurimi necentur. Quo posito sitiunt ileosi, stomachi vicini sympathia.

8 Hoc accidit quum putris humor in stomachum exhalat, aut stercus fædum ac fœtidum per os euomitur.

9 Compressis renibus ex intestinorum obstructione.

10 Resolutis viribus.

11 Ab ileo vomitus, desipientia, singultus, atque conuulsio, malum, inquit Hippocrates: Quia ventriculus & cerebrum sympathia laborant. Fieri verò conuulsionem in primis malum & lethale. Sic enim intestina, quæ neruosa sunt, retroactio naturæ impetu violenter moueri coguntur, molestamque materiam ad superiora loca reiectionem. Quæ quum sit putris & graueolens, cibos omnino corrumpit, ut nec chylosis, nec hæmatosis esse possit. Quare, si protrahitur morbus, corpus necessario marcescit, & contabescit atrophia. Sed nec esse longa potest affectio, quum ad symptomatum vehemetiam vapor humorque fœtidus stomachum graniter feriens, frequentes leipothymias inuehat, & infecto breui corde syncopen.

aphor. 10.
libro 7.

12 Ventriculo non trahente, sed ab intestinis excrementa violenter compressa recipiente, ut bene censet Galenus. Is enim tantum à superioribus trahit, cum ob appetentiæ sensum in eius ore superiore positum, tum ob rectas eò directas fibras, quibus trahendi facultas est, ut expellendi transuersis, & obliquis continendi.

libro 3. de
symptom.
causis.

AFFECTI 'COLI SIGNA.

CAPVT XVI.

NAUSEA cum vomitu est colo patiente,
dolorque

¹Distendens, idémque ⁴vagus cum ⁶tormine diro.
Non bene se ⁶renes lotio, nec ¹fæcibus aluus
Expediunt, ⁸crepitúsque loco rugitus in imo
Ventre sonat, ructúsque frequens expirat ab ore.

¹ Colum, intestinum est inter cæcum rectúmque medium. Quod quia crassiores varii generis fæces, pituitámque sæpe vitream, flatúsque suis cellulis coercitos continet, à quibus illius membranosa substátia distenditur atque corraditur, tam immanes excitat cruciatus, ut medicamenta dolorem sedantia *καλικά φάρμακα* veteres appellarint: ab affectu, qui, quia maximos dolores habet, imprimis sedari postulat, communi deducto nomine.

² Pituitoso, atque corrupto. Frequentior autem & grauior est in colico, quàm nephritico dolore vomitus, quia colum est ventriculo vicinius, sensum habet exquisitiorem, & materiam qualitate peiorem, & copia maiorem in se continet.

³ Distendens quidem, si causa mali flatus est. Sin pituita crassa, præsertimque vitrea mali fomes est, sic corrodens atque dilacerás est dolor, ut quasi terebello perforari sentiat^{ur} intestinũ.

*libro 6. de
loc. affect.
capit. 2.*

⁴ Distinguit Galenus nephriticum dolorem à colico: quòd ille fixus stabilis^{que} sit, hic veluti circuire videatur, hanc illam^{que} partem variè torquens, atque concutiens. Quod sæpenumero fit, nempe quando colon, potissimam flatuum sedem, flatulenta materia diuellit. At quum phlegmone, quam ardor, febris, sitis, vigilix denuntiant: aut humor crassus & viscidus colon obsidet, fixus est dolor, altè^{que} crucians.

⁵ Flatibus, aut humoribus exitum sibi quærentibus, & solido intestini corpore subsistente, contráque nitente.

⁶ Renes obstruuntur in dolore colico, quia dilatatur intestinum à flatibus aut fæcibus, illósque dilatatum comprimit. Hinc colicus dolor nephriticũ persæpe mentitur. Nam in vtroque nausea vomitúsque fit, meiendique difficultas. Sed hoc discrimen est, quòd in colico dolore nausea vomitúsque grauius affligunt, sæpiúsque reperit^{ur}, ut prius expositum, dolor vagus est & subitus, urinæque colore tingitur. In nephritide tenuis & aquosa primum est, deinde spissa, cum sedimento sæpe rubro, dolor^{que} fixus, & sensim ingrauescens.

⁷ Vel obturatis, vel retentis, à flatuum obstruentium copia. Flatus verò tanti sunt interdum, ut iniectum enema non admittant, aut admissum statim reiiciant: & si enematis acrioris vi fæces excluduntur, hæ non deorsum ferantur, sed innatent.

⁸ Flatus

8 Flatus in intestinis cōtenti, debēt expultricis facultatis vi crepitu per anum excludi, nec tamen faciliē possunt dolente colo propter obstructionem. Quare necessum est, vt vel murmur vel rugitum excitent in ventre, vel ructu per os exeant via non naturali. Nam qui sæpe pro crepitu ructum edunt, malē concoquunt, flatibus ventriculū attollentibus, & refrigerantibus.

AFFECTIONIS 'COELIACÆ, 'LEIENTERIÆQVE SIGNA.

Caput decimumseptimum.

ASSIDVÈ sine bile fluunt ³lutulenta per aluū
⁴Albave, torminibus nullis, nullóq; dolore,
Cœliaco morbo, leienteriave premente.

⁵Aspera fit sed in hac deiectione, læuis in illo.

1 Affectionis cœliacæ nomine, non omnis ventris fluor intelligitur, sed is quo excrementa læuia pariter & aquosa, semicottaque continenter ab aluo descendunt. Cuius causam statuit Aetius imbecillitatem ventriculi, qui perfectē coquere, ac digerere nequeat alimentum. Sed Fernellius, medicorum æui nostri lumen, non cruditatem, non imbecillam ventriculi coctionem, sed imperfectam, malāmque chyli distributionem, quam mesenterii, lienis, aut iecoris obstructio, vel trahentis facultatis imbecillitas, vel alimentorum, maximeque fructuum fugacium, & potus immoderata copia peperit, eius esse causam asseuerat. retrab. 3.
sermon. 1.
capit. 37.

2 Lienteria, est æquabilis & continua superficies, seu læuitas intestinorum. Quæ fit, vel à relicta cicatrice, vel ab humore glutinoso, qui interiorem intestinorum tunicam totam oblinat, redditque lubricam: quas ob causas assumpti cibi statim elabuntur. Nam, vt retineantur, siccitas, & asperitas, his contrariæ causæ requiruntur. Sed & lienteria primæ cōcoctionis imbecillitatem agnoscit, qua, ventriculo cibos non cōficiēte nec retinente, contingit eos tales ab aluo descendere, quales fuerint per os assumpti.

3 Vel cinerea: quæ graueolentia solent esse, præsertim in cœliaca. Per hanc enim quod educitur excrementum, diutius hæsit in ventre, faciliēque putruit, natiui caloris benignitate destitutum.

4 Interdum specie cremoris, vt in hepaticis, attractrice nem-

pe iecoris, & retentrice facultate ventriculi languida. Sed albæ sæpius apparent fæces, quia bile priuatur. Cæterum aquosæ sunt & humentes, quia calore (qui consuevit humidum, vt pabulū absumere) destituuntur, nec hepar à ventre, veluti natura solet, exugit.

§ Quia cibi substantia non atteritur. Id verò præcipuè fit, quia non retinetur in ventriculo. Contrà, quæ deliciuntur in affectu coeliaco, læuia sunt & æqualia: quoniam diutius in ventriculo, vel mesenterio substerunt, & aliquod sustinuere coctionis rudimentum.

DIARRHOEÆ, DYSENTERIÆ ÆQUE SIGNA. CAPVT XVIII.

VL CERE si nullo ¹bilis, ²pituitave, ³sola, Mixrave, decliuem furiosa recūbit in aluum, Crede diarrhœam. Sin ⁴torsio ventris, & vlcus Affligit, manátque ⁵cruor cum ⁶fæcibus alui, Sæua dysenteria est, miserum quæ lancinat ægrum.

1 Flaua vel atra: quarum hæc diarrhœam melancholicam inducit, illa biliosam.

2 Crassa mucosaque, quæ ex intestinis, aut mesenterio corradit solet: aut spumosa, quæ e capite in ventriculum & intestina prolabitur.

3 Omne profluuium alui, præter lienteriam ac dysenteriam, authores plurimi diarrhœæ nomine comprehendunt. Proprie tamen Fernellius diarrhœam statuit, quum synceriores humores & impermixti (qualis est pituita, flaua bilis, & atra seorsim) effluunt. Quibus etiam adiungit id profluuii genus, in quo, quod inferne procedit, quasi adipe, vel oleo perfusum cernitur: vt sit interdum in pestilentibus febribus, causo colliquati, phthisi, viscerum inflammationibus, & atrophia. Quum tamen syncerus humor rarò vacuetur citra perniciem: diarrhœæ verò multæ fiant bonis ægri rebus. Quumque fluor alui creberrimè fiat permixtis simul humoribus, censemus propriè dici & esse diarrhœam id alui profluuium, quo citra vehementem dolorem & vlcus, humores vel seorsim, vel mixti in aluum erumpunt.

4 Ab acrimonia bilis vel flauæ, vel atræ, vel pituitæ salsæ, substantiam intestinorum vellicantis, & erodentis.

§ Qua-

5 Quatuor habetur dysenteriae species. Prima, qua sanguis per circuitus quosdam emanat, αἱματηρὰ dicta Græcis, nobis sanguinea, seu cruenta. Secunda, qua per aluū elabitur sanguis aquosus, loturæ carniū haud absimilis, ἡπατηρὰ vocata, quia retetricis hepatis imbecillitate contrahitur. Tertia ex melancholico, splendēteque sanguine constat, sine certo nomine. Et hæ tres vlceris expertes. Quarta, cuius hīc signa damus, iunctam habet intestinorum exulcerationem, deiectiones ramentosas, cruentas, ac dolorificas, quæ dysenteria p̄priè nominatur. Quorū omnium commune symptoma est sanguinis per aluum excretio.

6 Si cruor & ramenta reliquis excrementis æquè commiscen-
tur, in superioribus: sin supernatant, in inferioribus intestinis
est exulceratio.

TENESMI SIGNA.

CAPVT XIX.

TENESMVM scire docent dolor¹ acer in ano,
³ Desessūsque frequens, mucosaque pauca per
aluum

Reddita, quæ paucō fuerint infecta⁴ cruore.

1 Tenesmus est assidua desidēdi cupiditas, in qua mucosum quiddam & cruentum egeritur. Cuius eadem, quæ dysenteriae veræ, causæ sunt, acrimonia nimirum vtriusque bilis, & pituitæ falsæ. Sed dysenteria, cōmune intestinorum vlcus est: tenesmus solius intestini recti, vel potius eius extremæ partis exulceratio.

2 Pars enim affecta (nimirum intestini recti postremum) nervosa est, humorque mordax.

3 Quia rugis ani contentus humor acer ac pungens ad excretionem inuitat, nec, quamuis inuitet, nisi sensim excerni potest.

4 Referatis ani venulis à conatu: vel potius erosio ab humoris acrimonia.

'LUMBRICORVM SIGNA.

CAPVT XX.

Si lumbricus edax in corpore conditus hæret,
Fit¹ licentericus fluor, & cum¹ murmure venter

¹Torquetur, vitreos ²suffusio fallit ocellos,
³Pallefcit facies, vritque ⁴sine ordine febris.
⁵Pruritus nares, & ⁶tussis sicca fatigat,
 Intestina fero ⁷fuctu morfuque premuntur,
⁸Pungitur & stomachus: ⁹tremor hinc, defectio,
 morbus

Quem veteres dixere sacrum. Quæ tanta ferendo
 Quum nō sint, mortì occumbūt plerumq; ¹⁰puelli.

1 In quibusdam partibus corporis, vt auribus, vesica, sordidis
 vlceribus, exigui vermes aliquando, licet raro, nascuntur, σκώληκες
 appellati. Sed λυμνίδες, seu lumbrici, de quibus hoc capite, cre-
 antur in solis intestinis. Horum quidam longi sunt, ac teretes
 seu rotundi, in superioribus & gracilibus intestinis nasci, & in
 ventriculum subeuntes, per os interdum & nares exire soliti.
 Quidam lati, ex tenuium intestinorum, vt volunt, interiori
 substantia geniti, longitudine nōnunquam incredibili. Alii par-
 ui, tenues ac teretes: quos in longanonis extremo, vel musculi
 sphincteris initio generari, vehemes ad anum pruritus indicat.

2 In quo plerumque seminis cucurbitæ similia cum sæcibus in
 aluum præcipitantur.

3 Crudæ materiæ portione in flatu abeunte. Vnde non mur-
 mur tantum, sed & distentio ventris est.

4 Crassus enim ac pituitosus humor, lumbricorum materia,
 putredine contrahit acrimoniam, qua torsiones, seu tormina
 fiunt in intestinis. Tormina quoque fiunt à flatibus, quos cru-
 da materia suppeditat.

5 Fumis crassis & putridis, in oculos exhalantibus.

6 Pallent qui lumbricis infestantur, vel ob pituitæ dominium:
 vel quia minus conficiunt sanguinis quam par sit, & alendis o-
 mnibus corporis partibus sit satis. Cruditate namque plurima
 scatent, & lumbricis auidè cibum rapientibus contingit inter-
 dum eos velut atrophia contabescere. Quorum si facies, vt
 aliquando, rubet, accusanda febris.

7 Ex inordinato motu vermium, excitatum materiam in in-
 testinis putrem: cuius teter vapor in corillapsus causa fit febris.

8 Ab inhærente falsa pituita.

9 Commota in cerebro liquatæque pituita, & in fauces decum-
 bente. Quæ quum tenuis & pauca sit, siccam, non veram tussim
 efficit.

10 Vermes famelici sugunt interdum ac mordent intestina. Nam alimenti penuria pituitam dulcem hærentem eorum tunicis attrahunt, ex qua nutriantur. Quod verum esse docet euentus. Etenim cibo sumpto morsus ac rosio conquiescit.

11 Quando lumbrici sursum remeant.

12 Vellicato, pūctōque à vermibus stomacho tremor fit, itémque morbus facer, sympathia neruorum & cerebri: quemadmodum & animi deliquium, cordis cum ore ventriculi consortio.

13 Lumbrici gignuntur in pueris potius quàm adultis. Sunt enim addicti gulæ pueri, natuique caloris in humido plurimum habent, quo in crudam crassamque materiam agente viuum animans producitur.

IMBECILLITATIS RENVM SIGNA. CAPVT XXI.

Si dolor² à lumbis dorsum pertingit, & illic
Figitur,⁺ obscœnūque refert vrina cruorem
Aut speciem commōstrat aquæ, labat actio renum.

1 Quæ tum esse dicitur, cum renes, citra manifestum in illis malum, vt arenulas, abscessum, vlcus, à proprio munere deficiūt. Est autem eorum proprium munus & actio, serum è venis in vesicam propellendum trahere, & cum sero sanguinem, quem sensim in substantiam suam conuertant.

2 Qui etiam in cæteris renū affectibus affici solent ob viciniā.

3 Renum dolor fixus esse consuevit. Nec enim hi facile dilatantur ob densam duramque substantiam.

4 Loturæ carniū recētium assimilem. Quod accidit, quum renum facultas imbecilla non segregat serum à sanguine. Renes enim si naturaliter habent, multum tenuioris humidiorisque sanguinis cum bile simul attrahunt. Et biliosi quidem excrementi quicquid non admodum crassum fuerit, cum vrina permeat. Sanguis verò carni renum aspergitur instar fæcis cuiusdam. Inde iam vaporis modo paulatim in totam carnem dispergitur, adhæresciturque, fitque demum alimentum renibus. Idēque natura serum biliosum est, non cruentum.

5 Lorium aquosum, alteratricis renum facultatis imbecillæ signum est, ait^{*} Galenus. Quod tale profundi censet^{*} Auicennas

^{*} lib. 1. de
Crisib.

^{*} lib. 3. sen

18. tract.

1. cap. 12.

ante cibi digestionem, & aduentum eius ad venas: pòst verò crassum & cruentum, aut loturæ carnis assimilē.

'DIABETIS NOTÆ.

CAPVT XXII.

PLV RIMA ¹præcurrunt diabeten signa, sed ingens,
Et ²nunquam sedata sitis comitatur, eaque
Crescit in immensum potus, minor attamen hic est
³Incocto lotio. ⁴Teneri nam carnea moles
Corporis in tenuem transfertur abítque liquorem.

¹ Quem alias dipsacum, hydropem ad matulam, & profluuiū
de locis ⁶ *aff. c. 3.* urinae vocari scribit Galenus. Cuius causam statuit retertricis re-
num imbecillitatem.

² Qualia sunt oris siccitas, alba saliuā, præcordiorum grauitas,
calor aut frigus à ventre in vesicam: sitis, sed nondum vt in
affectu confirmato vehemens, urinae profusio solito maior. Et
si morbus incrementum accipit, calefactio parua quidem, sed
mordax visceribus inhærens, abdomen rugosum, extantes ve-
cap. 2. lib. ³ *2. de sign.* *et caus.* *diuturn.* *morb.* nae, totius corporis habit³ gracilis, vt disertè percurrit Aretæus.

³ Quemadmodum his contingere canit Lucanus, qui à dipsa-
de reptili fera mors sunt. Quæ potest huius affectus esse causa,
vt & venenum aliquod ex his quæ vesicam & renes proprietate
quadam infestant.

⁴ Quæ in diabete profunditur vrina, potus est nequaquā à sua
qualitate mutatus, vt ait Galenus. At in tribus, quos hoc affectu
deprehenso vidimus, lotium apparuit sero lactis persimile.

⁵ In diabete, potus quidem plurimus est, multitudini tamen
lotii non respondens. Copiosior enim vrina redditur, quàm
assumpta sit per os humida substantia. Quare quum corporis
habitus fiat inde gracilis, mole corporis in vrinam facellente,
diabetes ab Aretæo bene definitur, carniū ac membrorum
in vrinam colliquatio.

R E N V M

RENVM INFLAMMATIONIS

NOTÆ. CAPVT XXIII.

IGNIS edax renum,quem copia sanguinis auget,
 Inducit ²grauitate truem, ³pulsūque dolorem.
 Qui ⁴circum pubem, lumbos, & inania sæuit
 Ilia: tumque ⁵rigent extremæ frigore partes,
 Vicini stupor est cruris, lotiumque ⁷frequenter
 Exit, & ⁸exicca fæces retinentur in aluo.
 Tenditur hinc venter, vomitus, ructusq; sequitur,
 Assiduusque calor febrilis corpus adurit.

1 Periphrasis est phlegmones. Est enim hæc, tumor calidus, ex immoderata sanguinis in partem influentis copia genitus.

2 Ob humoris copiam, & substantiæ renum densitatem.

3 Turgentibus arteriis eius loci spirituofo, feruido, multoque sanguine.

4 Renum dolor vicinas partes per cōsensum occupans, distensione sæpe conuellit, dilatatis membranis ab inflammationis magnitudine.

5 Remeante in renes & viscera calore.

6 Insignis arteriæ magnæ, venæque cauæ ramus incumbens dorso, in renes & vtrumque crus expullulat. Qui quum à renib⁹ in eorum inflammatione comprimatur, doloris in crure stupidi fit causa per cōsensum. Hæc quidem est opinio Galeni. Quam eodem authore, stupor seu torpor, sensus motusque diminutus nervosarum partium est, à paralyfi sola magnitudine dissidens. Itaque censuerim, turgente grauique præ sanguinis abundantia crure (dextro quidem, si dextrum, si læuum, sinistro) subiectum comprimi neruum, pressuque stuporem parere.

7 Frequenter vrina melitur in renum phlegmone. Nam eorū immoderato calore fit acrior, ideoque pungens ac lancinans, ad excretionem sui sollicitat. Sed ista mixtio (quæ primò tenuis esse solet, deinde rubra, denique crassa) sæpe cum dolore fit, vt in stranguria Quod verò Galenus ait his vrinas supprimi, quibus renes patiuntur inflammationem, sic accipiendum, in renum phlegmone copiosam vrinam non profundi, quum eius portio vi caloris partim absumatur, partim retineatur à renibus. Cre-

*libro intro
duct. in
puls.*

brò tamen, sed veluti guttatim vrinam excerni, propter acrimoniam quam naturaliter habet à permiffione bilis, & ab extirperante calore renum afciuit, docet euentus & ratio.

8 Humore propter vicinum incendium exhausto, cuius, vt vehiculi, penuria, fæces in intestinis stabulant. Adde quòd tunc intestina comprimuntur, & obstruuntur ob renum dilatione.

9 Nam quum fæces non exeunt, impeditur coctio, sequiturque flatuum seges à cruditate.

10 In renum phlegmone continua febris est. Assidue namq; putridus vapor in cor ascendit per arterias, quæ pari magnitudine qua venæ, in renes inferuntur.

ABSCESSVS RENV M

SIGNA. CAPVT XXIIII.

HINC grauitatis inest & sensus maior & horror

Febrilis, sanguisque dein, saniesve, carove
Meiitur, aut fundo matulae pus subsidet, vnde
Maius Telephio, grauiusque relinquitur vlcus.

1 Omnis phlegmone, quæ digeri non potest, transit in abscessum. minus verò digeri potest illa, quæ in densa compactaque carne, nec bene perspirabili consistet. Talis est caro renum. Hinc eorum inflammatio sæpius in abscessum vertitur.

2 In abscessu, materia phlegmones in vnu coacta coquitur, & coctione crassescit. Vnde tunc grauitatis sensus in affecta parte maior est quàm in phlegmone, in qua turgens humor nullo consistit loco.

3 Quum abscessus fit, febris horrorque simul affligunt. Febris quidem, putris substantiæ vapore in cor elato: horror verò, mor daci materia cutem erodente. Sed hæc varia inordinatq; cum horrore febris est, ait Galenus: forsan quòd materia purulenta non vsquequaque moueatur, ideòque nec putridi vapores in cordis arcem continenter exhalent. At abscessu facto cõquiescit horror, ac febris dolorque minuitur, expirante, & foras egrediente putri materia.

6 de locis
affect. c. 3.

4 Exiguæ carunculæ cum vrina simul emittæ, renum exulceratorum certissimam exhibent coniecturam. Apparent enim erosa putrique renum substantia. Ita sanguinis purisve mistio
renum

renum aut vesicæ exulcerationem significat, vt *Hippocrates & *aph. 75.
 *Galenus vnâ pronunciant. & 76.

5 Hoc si fœtidum, liuidum, aut mucosum est, malignum vl-
 cus. Sin album, æquale, læue, paucum, benignum & salutare. lib. 4.
 *6. de loc. affect. c. 3.

6 Est enim vlcus renum, si radices egerit, insanabile. Nam
 eorum exesa substantiæ portio, vtpote spermatica, reparari
 nequit, & vrina præterfluens assidue non sinit vlcus agglutinari.

NEPHRITICI DOLORIS

SEV RENVM CALCULI SIGNA.

Caput vigesimum quintum.

CALCVLVVS in rene est, lotium si fertur aquo-
 sum

Principio, purumque, dehinc fabulosa residunt,
 Spurcæque non raro sanies commista cruori
 Meiitur, estque grauis sedes affecta, propinqui
 Fitque stupor cruris, nec dorsi spina repandi
 Flectitur ex facili. Species non vna doloris.
 Namque cauo renis statuas hæere lapillum,
 Si dolor obtusus forsan premit. At furor amens
 Torquet & immanis, quum sede priore relictâ
 Vretera petit: bilis pituitaque demum
 Reiicitur vomitu, leuior quo redditur ardor,
 Ager in affecta querulus si parte recumbit.

1 Νεφρίτις, commune nomen est omnium renum affectuum.
 Propriè tamen renum calculus hoc nomine designatur, for-
 sitan quòd is omnes renum morbos doloris magnitudine supe-
 ret, sitque cruciatus vehementia cæteris anteponendus. Cuius
 materia crassus est crudusque succus, & igneus in renibus calor,
 qui humorem adassans, eum cogit, & indurat in lapidem.

2 In renum calculo quia dolor est ingens, serum crudum ab
 eisdem attrahitur. Hinc vrina meiitur aquosa. Meiitur & tenuis
 obstructis meatibus, per quos id tantum quod subtilium partium
 est, percolatur, & crassum in renis cauo retinetur, appositumque

F ij

calculo molem illius auget.

3 i. sine arenulis.

4 Solutis obstructionibus, naturæ medicamentive robore.

5 Nempe quando calculus è renis substantia prodiit in eius cauum. Tunc enim partē cui adhærescebat, dilacerat, vnde cruor & sanies.

6 Ob calculi molem, & pondus.

7 In nephritide spina dorsi non facillè flectitur. Hac enim inflexa concurritur calculus, qui dolorem acerbum attritu concitat.

8 Quum in renibus consistit calculus, dolor obtusus est: siquidem hi nervi exiguis præditi sunt, vt & iecur. Sin ille se in vreteris caput insinuat, acerbissimum inuehit dolorem, quia dilatando lancinat, interdumque dilacerat vreterem, cuius est nervosa substantia.

*comment.
1. ad part.
6. lib. 6.
epidem.*

9 In dolore nephritico, velut & colico, vomitus fit, connexione renum & coli per peritonæum, vt sentit Galenus. Sed & è sexta nervorum coniugatione gracilis nervus renibus & omnibus intestinis distribuitur, per quem est illis cōnexio societasque cum orificio ventriculi. Qui verò fit vomitus in coli renumque cruciatu, pituitosus est initio, quia talis succus in ventriculo creari solet à cibis crassis, aut multis: deinde biliosus, affato: æruginosus denique per dolores ac vigilias corrupto sanguine.

10 Per vomitum calculosi liberantur ab accessionibus, at non ab affectu. Tum enim doloris quidem acerbitas conquiescit, rene liberiore, sed materia coniuncta, nempe calculus, non tollitur. Ita si decubit in affectam partem æger, remissum dolorem sentit, quia calculus non suspenditur, vt quum in contrarium latus inclinatur. Nec tamen hinc ille sanationem recipit, quum de calculi mole nihil eo pacto detrahatur.

LITHIASIS, SEV VESICÆ CALCVLI SIGNA. CAP. XXVI.

SIN vesica fouet lapidem, leuis ille putetur
Quum prurit pubes, cōtrectaturque pudēdum
Sæpius. At grandis fieri gravitate notatur.

Tūmque dolor tristis motu saltūque cietur,
Mictio fitque frequens, excernēdique per aluum
Crebra cupido tenet, lotium crassescit, idēque

Turbatur

Turbatur, fundumque petens pars spissior, albi
Virofive refert puris, muccive colorem.

1 *Λιθιασς*, calculi morbus est, communiter quidem renum ac vesicæ: sed huius, quam illorum magis peculiaris. Cuius causa cruditas est, ardorque ventris, aut vesicæ, quo vrina retinetur, quodque crassissimum ac turbidissimum in ea est, sensim acervatur, ac denique concrevit in tophum.

2 Pruritus pubis & perinæ, fit ob titillationem oberrantis calculi circa pubem & isthmum vesicæ: significatque calculum exiguum, si gravitas affectæ partis, & alia in textu posita signa non comparent. Quibus existentibus si pruritus est, huius causam serum aquosum esse probabile, quod quando calculum præterlabitur, ob meatus angustiam tenuatur, & acrimonia sua sensibiles vesicæ partes leuiter pungit ac mordicat.

3 Vesica, membranosa, pluribusque & magnis prædita nervis est ad exquisitiorem sensum. Ideoque quum in hac agitur calculus, dolorem acerbum inducit.

4 Dum urinæ meatum obturat calculus, vrina calefit, & mora contrahit acrimoniam: ideoque pungens, ad excretionem sui concitat & impellit. Quumque semel & copiose (sphinctere musculo violenter compresso) nequeat excerni, quod semel non potest, frequentia mictionis excludere natura contendit.

5 Intestino recto compresso à calculi magnitudine: vel potius irritatis musculis ani levatoribus, qui vesicæ substrati, eidem sphincteri adhærent.

6 Calculosi variam urinam effundunt. Interdum quidem splendidam seroque similem, quando quod crassissimum ac turbidissimum est, in vesica manet, coacervatur, atque concrevit, inquit Hippocrates. Aliquando subcruentam, vesica à calculo qui scaber sit, & inæqualis, exulcerata, ut idem ait. Crassam interdum ac turbidam cum sedimento mucoso vel purulento, ab arenularum & humoris crassi viscosique copia, quam adiunxit, agglutinavitque sibi calculus, ac dein vrina præterfluens, quæ natura mordax, tenuiūque partium est, corrasit: vel ab ulcere vesicæ fordido.

*lib. de aera
aqu. et loc.*

*lib. 4. de
morb.*

PHLEGMONES VESICÆ

SIGNA. CAPVT XXVII.

INFLAMMATA fero cruciat vesica dolore.

Quem rubor ignitus perinæ prodit, & ardor,

F iij

Febris acuta, ²gravis distento in pectine sensus,
³Fæcibus occlusæque viæ, ⁴lotiûmque retentum.

*retrab. 2.
 sermon. 3.
 cap. 26.*

1 Inflammationem vesicæ lethalem facit Aetius, non quòd hæc nullam omnino curationem admittat, sed difficillimam. Est enim vesica, nervus (vt Aretæi verbis vtar) frigidus albûsque, ab innato calido quamlongissimè, quamproximè verò externo frigori positus. Quare quum inflammationem subit, in gangrænâ incidit facîle, nisi subitum remedium, imminens periculum antevertat.

2 Pecten & pubes in vesicæ, vel potiùs eius sphincteris inflammatione distenduntur vrinæ copiâ, quæ ob vrinarii meatus angustiam exire prohibetur.

3 Ab inflammatione vesicæ rectum intestinum incalescit & coarctatur, vnde resiccantur, supprimunturque fæces: non ita tamen, vt illis via penitus occludatur: sed quod excluditur ab alio, paucum sit, & cum excernendi summo desiderio, quemadmodum vsuuenit in tenesmo, de cuius signis antè scriptû est.

4 Vrinæ suppressio, quæ fit ob vesicæ phlegmonem, periculosissimum est symptoma. Nec enim si per catheterem immissum viam illi moliri conamur, aliquid proficiamus: imò partem affectam irritamus, & acceleramus gangrænâ, aucto dolore. Sin suppressioni non occurrimus, symptomata grauissima confluent, sequenti capite commemoranda.

ISCHVRIÆ SIGNA.

CAPVT XXVIII.

VRETER, lotio ¹suppresso, plenus vterque
 Tenditur, atque sero renum regio humida
²multo

Turgescit, vesica ³tumet, sensûsque doloris
 Pondere vexantis ventosa per ilia fertur.

⁴Non sibi mens constat, moribundâque membra
 videntur

Horrere interdum, nervis que rigere coactis.

I Vrina

1 Vrina vel guttatim effluit: vel difficulter, & summo cum dolore: vel omnino supprimitur. Prima species, Stranguria: secunda, Dysuria: tertia vocatur Ischuria, de qua nunc agitur. Quæ proprius est vesicæ vel adstrictæ, vel obstructæ morbus. Vulgo tamen suppressionem omnem sonat, seu renum, seu vesicæ vitio, cuius hinc communia signa referuntur. Quum Ischuria peculiaris vesicæ morbus est, meiendi desiderium inuitat summo quidem, sed irritato conatu, pubes distenditur ac dolitat urinae collectæ copia, immissoque cathetere copiosior vrina profunditur, unde lenatur æger. Sin Ischuria symptoma renum est, grauitas in lumbis, dolorque sentitur: nulla, vel minima meiendi cupiditas, in pube nec dolor nec tumor: inanis est vesica, proinde nec ab ea quicquam, immisso cathetere prolabitur.

2 Vrinæ refluxu.

3 Nam hæc vrina repleta distenditur, distentaque fit arctior, sic, ut eius meatus, ob angustiam, & contractionem in sese nihil humoris exire patiatur. Quod contingit quando pus crassum, lapis, tuberculum innatum ipsius vesicæ meatui, phlegmone, scirrhus, aut quiduis aliud præter naturam vesicæ viam intercipit & obturat.

4 Vrina sursum in Ischuria remeas talia producit symptomata: bilis acrimonia, quam hæc in se plurimam continet, cerebrum, nervosque corpora feriente.

'PRIAPISMI SIGNA.

CAPVT XXIX.

ARRIGITVR nulla si fortè libidine coles,
Et ² tetano quodam premitur, ³ medicina paranda est

Quæ citò succurrat: siquidem distenditur imus
Venter, & ⁴ exorto gelido spes nulla madore.

1 Affectus hic à Priapo (quem ex prægrandi pene superstitione nobilitauit antiquitas) nomen habet, quoniam eo qui tenentur, pudendum assidue tensum habent, longum ac timidum, sed citra Veneris appetentiam. Arrigitur verò, tenditurque in priapismo pudendum à causa vel calida, vel frigida. Frigida quidem, flatulento spiritu in fistuloso neruo genito: Calida verò arteriarum osculis nimio opere patentibus. Cui posteriori causæ

E iiii

quamprimùm occurrendum, ne vitali spiritu in neruum fistulosum confertim effuso vires exoluantur. Prior autem causa minus vrget. Nec tamen est curatio negligenda, quum vtriusq; symptoma sit conuulsio, quæ doloris magnitudine vires proster nit, aut saltem plurimum imminuit.

2 Fistulosus quippe neruus flatulenti spiritus copia tensus, reliquum genus neruosum sympathia quadam afficit.

3 Hic purgante deorsum pharmaco non est opus, ne cōmoti semel humores in partem affectam, alio vicinam traducantur; sed vomitu, clystere blando, roborantibus assumptis & admo tis topicis, quæ medicinæ nomine comprehendimus.

4 Natiui caloris extinctionione.

V E R Æ G O N O R R H O E Æ

SIGNA. CAPVT XXX.

QUUM nequit obscæni fieri tentigo² pudendi, Et fluit immodicè Veneris sine munere semē, Id³ crudum fluit instar aquæ, tenuis⁴que liquoris. Et tunc à⁴ lumbis totum⁵ macilefcere corpus Incipit, & tenues languor grauis occupat artus.

1 Omnis inuoluntaria seminis excretio, siue quæ tenso pene fit, siue nō, Gonorrhœa generali significatione dicitur. Propriè verò sic nominatur hæc, in qua perpetuò semen, citra pudendi tensionem effluit, quam hoc capite describimus. Hæc quidem spermaticorum vasorum facultate retentrice resoluta fit. quæ verò tenso pudendo accidit, affectio pudendi est, à conuulsione profecta.

2 Pudendum (mentula, penis, seu coles, idem) attollitur naturaliter à copia spirituum, fistulosum neruum implentium. Ac in Gonorrhœa spiritus abeunt cum semine. Quare, quum in hoc affectu pauci relinquuntur, coles etiam non arrigitur.

3 In parastatis quippe coctionem non admittit. Nam in his non immoratur, ob spermaticarum partium infirmitatem.

4 A quibus, vt spermatica vasa continentibus, effluit seminalis materia.

5 Est enim semen ex omni corporis parte (sed vberius è iecore per venas, è corde per arterias, & è cerebro per nervos) deciduū. Quamobrem eius fluor immodicus omnes corporis partes

ses emaciat, debilitatque: spiritibus, qui robur tuentur, molemque corporis augment, cum sanguine (sit enim ex eo semen) simul abeuntibus.

GONORRHOEÆ VIRULENTÆ SIGNA. CAPVT XXXI.

Ille quidem¹ vetus est, & primis natus in annis,
Hic verò, cuius meditamur signa, fefellit
Morbos auos, nostròque genus deducit ab æuo:
Atque Gonorrhœæ vocitatur nomine fœdæ,
Furtiuo quia congressu de cole perenne
Seminis effluuium est,² non aduertentibus ægris.
Quòdque fluit semen,³ candet, palletve colore,
Fœtet odore⁴ graui, tensòque vt fune pudendo.
In mictu sensus⁵ ferus est, acérque doloris.
Hinc ductum penis stillans depascitur vlcus,
⁶Suppressumve cauat perinæum virus, & extrà
Materiam fundit, prius intus pure coacto.

I Gonorrhœa vera, cuius superiori capite data signa sunt, veterum scriptis est celebrata: fœda verò, quæ contactu polluit, cuius hoc capite persequimur notas, eandem cum lue venerea trahit originem. Luem autem venereâ, de qua sequenti capite, tum cœpisse perhibent, quum Carolus octauus Galliarum Rex Neapolin cum exercitu profectus est. Ideo quoniam in Gallis tum primùm, quasi popularis apparuit hic morbus, Gallicus appellatur. A nonnullis Italicus & Neapolitanus, siquidem in Italia primùm grassatus est, itémque Neapoli. Verùm Hispanos eum primò contraxisse certum est in Hispaniola, quæ spectat Americam, eo tempore, quo ductore Columbo illic cum classe resederunt, anno salutis 1496. Post quæ tempora Fernando, principi Siculo suppetias ferentes Hispani cōtra Carolum octauum Galliarum regem, Neapolitanos, & Gallos, Italosque polluerunt, vt ab illis ideo iure dicatur Hispanicus. Potest idem nunc quoque dici Barbaricus, quum in Barbaria, prima Africæ parte, sit endemius & vernaculus. Illos enim duntaxat, qui regionem hanc

lib. 1. ferè
sub finem.

incolunt, quasi populariter ferit. Vicinos autem his populos, ut Numidas, eosque qui Libyam & montem Atlantis (ubi Marochia, quondam vrbs nobilis & Africæ totius imperium) inhabitant, haudquaquam attingit. Multoque minus Nubios: ad quos qui se, venerea conspurcati labe conferunt, solius peregrini soli benignitate, sine pharmaco vlllo sanatur, ut Ioannes Leo, scriptor Afer, oculatus testis, asserit in Africæ noua descriptione.

2 Vigilantibus, pariterque dormientibus, sine manifesto sensu, in hac, ut vera Gonorrhœa, semen elabitur, à spermaticorum vasorum ac testium imbecillitate.

3 i. album vel citrinum. Citrinum quidem semen magis virulentum est & acrius, ideoque citius exedit, & exulcerat.

4 Superat enim vulgarem putredinem, quia contagione poluit, atque contaminat.

5 In Gonorrhœa, materia quæ vasis spermaticis includitur, in tetrum fœdumque virus facessit, quod penis meatum exedens & exulcerans, dolorem semper quidem infert, sed in emissionem, quam alio tempore grauiorem. Nam quum vrina sit acris, locum affectum permeans exasperat.

6 Virulentus fluor in hac fœda gonorrhœa citò supprimi non debet. Aliàs, remeante materia colligitur intus abscessus circa testiculum, aut in perinæo, quo pus tetrum & graueolens effunditur.

'VENEREI MORBI SIGNA.

CAPVT XXXII.

DIRA lues Veneris, quæ Gallica proditur,
omnes

Inficit, & minimis latitat vix cognita signis

Principio, sensimque truci lacrymosa dolore

Exigit à scorto meritas pro crimine pœnas.

Exucca siquidem primò radice pilorum

Barba cadit sensim, decorant nec tempora crines,

Aspiciturque cutis macula conspersa frequenti

Et parua, croceum, rubrumve tenente colorem.

Pustula dein maior crustis obducta videtur

Sicca, rotunda, caput, frontemque, & tempus
vtrumque, Et

Et totum corpus ¹ vario fœdare colore.
 Ulcerat & teneras fauces, tenerúmque palatum
 Virus, & authores morbi, genitalia, sedes.
 Quúmque malum serpēs solidis in partibus hæret,
 Tunc dolor & grauitas capiti est, ac aura maligna
 Effusa in latos humeros, perioſtia, collum,
 Oſſaque, membranas, tendones, vincula, neruos,
 Affligens in ² nocte magis, ³ cruciatibus implet
 Innumeris, corpúsque vigil ⁴ tabescit, & inde
 Viribus exhaustis homo fit deforme cadauer.

1 Morbum hunc, non Gallicum, Hispanicum, Italicum, aut Neapolitanum, inuisum suæ cuique genti nomen, sed Venereum appellamus, quia venereo concubitu primùm & maximè contrahitur. Qui, quia nulli nec sexui, nec ætati parcit, sed in omnes venenata quadam & maligna qualitate, perniciosaque labe grassatur, bene definitur à Fernelio, Contagiosus *lib. 6. patholog.* affectus, qui cum vlcere, vel ingenti cruciatu variis locis emergit, ac sæpius extuberat.

2 Huius, & aliorum ex varia gente nominum ad venereæ luis appellationem origo fuit exposita superiori capite, partic. 1.

3 Contactu, non halitu solo. Venenata quippe luis venereæ qualitas simplex & solitaria non est, sed in humore, vt subiecto quodam & vehiculo subsistit.

4 Primùm enim inficit spiritus, dein humores, partes denique solidas.

5 Hæc calamitosa lues, non tantùm est miserabile scortatorum flagellum, sed infantes (vt puellios, & impuberes) pariter ac fontes truculenter affligit, nimirum hos qui contagioso parentum semine sati sunt, aut maligni humoris cōtactu laceſſiti.

6 A tenui malignoque vapore.

7 Virulenta bile in summa corporis effusa.

8 Massa sanguinis labem sentiente, ex qua portio quædam tenuis in corporis habitum rapta, cutis densitate cogitur.

9 i. sine pure. Non tamen perpetuò sicca pustulæ sunt: sed, si negliguntur, serpunt in ambitum, & cutim excavant, vnde fit vlcus virulentum, ac sordidum.

10 Nec enim vnus tantùm coloris existunt pustulæ, quemadmodum nec vnus humoris est venerea labe. Sed in biliosis

bilis exæstuat, huiusque signa conspicua sunt ex colore pustularum flauo, pallido, citrinove. In pituitosis albæ maculæ: rubræ, quum peccat sanguis: & nigræ, quum atra bilis dominatur, efflorescunt.

11 In hac sæda perniciosaque lue noctu dolores exacerbantur, & ingrauescunt: vel quòd pituita (quam plerique communem huius morbi volunt esse materiam) nocturno tempore moueri solita, in partes sentientes fluxione decumbit, in hisque congestam virulentam materiam excitat: Vel quòd ob immensas noctis vigilias (quæ præter naturam sunt, vt naturales diurnæ) doloris sensus est exquisitior.

12 Nam ossa quasi terebello perforari sentiuntur, tendines & vincula distendi, rigere nerui, periostia, membranæque reliquæ diuelli.

13 Hoc enim affectu non modò partium corporis temperamentum, sed & tota substantia peruertitur, vt vix vlla deinceps probò puròque fruatur alimento.

14 A neglecta lue venerea tabes, & ab ea mors sequitur, quia vires concidunt spiritibus exhaustis per vigilias & atrophiam, corruptoque denique solidorum corporum temperamento, si curatio negligitur. Sin verò priusquam vires omnino decendant, idoneis pharmacis corpus repurgetur, malignaque qualitas per ea quæ proprietate quadam arcana valere comperiuntur, vt per lignum sanctum, seu Guaiacum, Chynam, Sarzapariliam sumpta, & admotum hydrargyrum à multis celebribus improbatum medicis, sed vsu vtile compertum, non temere tamen, nec, nisi quum morbus solidas partes occupat, admittendum eluatur, & diætâ congruens imperata teneatur: refarcitur tandem ea substantiæ portio quæ defluxit, & quod alteratum est, ad reperiem denique reuocatur. Hinc ab affectu tam crudeli vindicatur æger & pristinæ restituitur sanitati.

LIBRI TERTII FINIS.



DE SIGNIS MORBORVM *liber quartus.*

CALIDIORIS VTERI SIGNA. CAPVT PRIMVM.

QUVM calor est vteri, reliquum calor vrere
corpus
Assolet, & menses certa sine lege feruntur,
Fundētes paucum, ac tenuem, nigrūve cruorem.
Vlcerat & pungens humor muliebri pudendum,
Amplexusque cupit mulier lasciuia salaxque.

1 Vterus, μήτρα Græcis appellatur, quod ab hoc animantia cun-
cta, velut à matre ducant originem. Is enim est cōcipiendi ge-
rendique fœtus instrumentum. Qui quamuis posterior situ sit
omnibus visceribus (hinc & ὑστέρα dicitur) & ignobili loco consti-
tutus, nimirum inter vesicam & rectum intestinum: cum prin-
cipibus tamen partibus summam habet affinitatem per nervos,
venas & arterias. Per quæ organa, suos illis affectus sæpe commu-
nicat, vt hoc libro, quo morborum hystericorum peculiare
traduntur notæ, patebit.

2 Quum est intemperies vteri calida, reliquum corpus cali-
dum esse non est necesse, nisi pariter calidum sit totius corporis
temperamentum. Sæpe fit tamen, vt toti corpori suam intem-
periem communicet, siquidem cum omnibus eius partibus
consentit.

3 Quum intemperies vteri calidior est, menstrua purgatio nul-
lum ordinem seruat, quia sanguis ob tenuitatem & acrimoniam

in venis diu contineri nequit.

4 Immoderato calore, plurimum humoris è sanguine confu-
mente.

5 Si bilefcit fanguis.

6 Si per aduftionem efficitur melancholicus.

7 Talis humor, fanguis biliofus eft, aut ferum.

8 Mulieres, quarum vterus eft calidior, magis lasciuæ sunt at-
que falaces. Nam, præterquam quòd fanguis cõcitur, femén-
que titillat in vasis per calorem: humiditas etiam serofa cum spi-
ritu iuncta commouetur, & euacuari postulans, acrimonia &
mordacitate fua genitales partes excitat ad agendum, eisque vo-
luptatem incredibilem fufcitatur, acrium humorum exemplo, qui
delitescunt fub cute maximum pruritum inducunt, fuoque
lib. 14. de
vfu part. motu non exiguam inferunt voluptatem: vt docet Galenus.

FRIGIDIORIS VTERI NOTÆ.

CAPVT SECVNDVM.

F R I G I D I O R E ¹ labant vtero titubantia crura,
² Deficiunt menses, ³ Venerisque retunditur ardor,
⁴ Lûborumque grauat ftupidus cum pectine fensus,
⁵ Oisque coit gelido contractæ frigore metra.

1 In affectu vteri frigido crurum imbecillitas eft, neruis qui
eorum mufculos mouent, per confenfum affectis. Eadem verò
frigore titubant, vel quia rigent, torpentve ab intemperie frigi-
da fimplici, vel quia craffo, vifcidoque quodam humore eorum
nerui referti funt.

2 Frigus enim cogit fanguinem in vteri venis contentum, &
meatus, per quos elabi debet, obftruit.

3 Nam vt ad cõgreflum inuitat calor & humor, à quibus pru-
ritus & titillatio: fic ab eodem auocat frigus, à quo fenfum ftu-
por, & omnis voluptatis alienatio.

4 *ὀσπερ*, feu lumbus, communiter ea dorsi pars eft qua cin-
gimur: propriè verò, pars infra dorfum quinque vertebris, o-
mnium craffiffimis maximisque compacta. Quæ, quia offi facro
(quod firmiffimis ligamentis connectit vterum) adhæret;
vteroque fubiaceret, eius quoque confentit affectibus. Cuius fi
intemperies eft frigida, eaque fimplex, ftuporis tantum: fin cum
humore, grauitatis quoque fenfu lumbus obfideretur.

5 Vterus

5 Vterus (quē *μίτρα* appellari præmonuimus) quū intemperiem frigidam nactus est, eius os imprimis contrahitur. Est enim id, ut totum vteri collum, musculosum quidem, sed dura cartilaginosaque carne compactum: ideoque per se iam frigidum, intemperie frigida totius vterini corporis redditur frigidius. Frigoris autem est constringere, ut dilatare caloris.

SICCIORIS, ET HUMIDIORIS VTERI SIGNA. CAP. III.

SICC A facit sterilem, quia ²menstrua nulla mouentur.

Humida sin matrix, vterino sæpe ³fluore
Fœmina vexatur, menses & ⁴aquosa profundunt
Multaque, sentit onus pubes lumbique molestum.

1 Intemperies vteri sicca, sterilitatis vna quidem, non sola causa est. Omnis enim intemperies vteri, sterilitatem inferre potest. Nam quæ mulieres frigidos vteros habent, non concipiunt, ob earum substantiæ densitatem. Humidis extinguitur genitura. Siccioribus & æstuosiss alimēti penuria semen corrumpitur, ut scribit Hippocrates. Nec solum intemperies vteri steriles facit: sed & principum partium, ut ventriculi, iecoris, lienis, pulmonumque latens vitium, obstructio, scirrhus, cachexia, leucophlegmatias, icterus, atrophia, tabes, lenta febris, omnis denique cacoehymiae soboles. Itemque viri semen infœcundum, eiusdemque partium obscenarum vitia, qualia sunt gonorrhœa, spermaticorum vasorum obstructio, coarctatio, contusio testium, & pudendi exilitas, & mala conformatio quælibet. Ad hæc in mulieribus testium, spermaticorumque vasorum vitia, oris, aut cervicis vteri vel amplitudo, vel angustia, obstructio, obliquitas, peruersio, ab eisque mensium suppressio.

2 Viragines, saltatrices, & cantrices naturaliter nō purgantur, ait Aetius, quia quicquid in eis superfluum est, nimia exercitii *sermab. 4.* vehementia consumit. Eædem ob siccitatem sunt steriles, quia *sermon. 4.* semen quod à viro in earum vterum immittitur, priuatum ali- *cap. 51.* mento, nempe menstruo sanguine, vel aduritur, vel euandidum excidit.

3 Reseratis vteri venarum osculis ab eorum imbecillitate, vel humoris copia.

4 Sanguis enim ob humidam intemperiem crudus est.

SIGNA MENSTRVÆ PUR-
GATIONIS PRÆTER NAT-
turam suppressæ. Caput quartum.

MENSTRVA ¹si vitio quodam retinentur,
²in omni
Corpore pondus inest, sed inest in ³pectine maius :
Atque ⁴dolor lumbis, ⁵femorique insistit utrique,
Sincipiti colloque grauis. Tum ⁶febris, & ⁷horror,
⁸Nausea, ⁹defectus, ¹⁰vomitibus, ¹¹privatio vocis,
Et ¹²sitis exoritur, sed non insurgit ¹³orexis,
Purpureusque cutim tumor, aut sacer ignis adurit.
¹⁴Turbidius fieri lotium, matulamque ¹⁵rubore
Sæpius, interdum ¹⁶picea fuligine tingi
Cernitur, aut ¹⁷guttis multo conamine labi.
Denique vel ¹⁸propriis vaga mens à sedibus errat,
Abdomenve ¹⁹tumet, turgent & crura, pedesque.

1 Menstrua purgatio præter naturam deficit multas ob causas. Externas quidem, ut ob inediam, laborem impensum, copiosum sudorem, immodicam sanguinis profusionem, curas, mœrorem. Internas autem, ut ventriculi, iecoris, lienis, & pulmonum intemperiem, obstructionem, scirrhum, iæterum, cachexiam, tabem, atrophiam, hydropem, asthma, & alios id genus affectus, quorum vitio, venarum sanguis labefactatur: quemadmodum idem crassus lentusque fit otio diuturno, viscosorum & crassorum alimentorum usu, frigidaque multa portione. Sic uteri refrigeratio, obstructio, peruersio, & quicquid interius os eius obturat, ut concretus sanguis, adipis copia, caro excrescens, adnata pellicula, malè inducta cicatrix ab ulcere: conformationis denique naturale vitium, suppressionis mensuum plerumque causa fit.

2 Nam plenis uteri venis, sanguis in alias corporis partes continuatione quadam illabatur, easque turgidas reddens, tensusam parit lassitudinem.

3 Hic quippe subiectus est utero, cuius in venis conculcatus san-

sanguis, cum onere grauat.

4 Tensis vteri ligamentis, & fibrosis nervosisque, quæ his locis adiacent, partibus, à plenitudine.

5 Ab obstructione, putredinis parente.

6 Tenui mordacique materia ex sanguine in sentientes corporis partes illapsa.

7 Inferiore ventriculi ore sursum elato, commotisque qui in ventre sunt humoribus.

8 Vellicato ore superiore ventriculi ab acri vapore: vel oppresso corde potius. Nam ab vtero sursum elatus sanguis, thoracis venas implet, vnde dyspnœa: multisque ex maioribus vasis interdum excitatur vapor, quo pericardium humore perfunditur defectionis crebræ causa.

9 Affecto neruorum principio, cum quo maximum habet consensum vterus per nervos, & spinæ membranas. Vel musculis linguæ, sanguinis copia prægnantibus, ideoque ad motum ineptis.

10 Nam, sanguine multo per obstructionem putrente, febrilis calor accenditur, quo multiplicatur bilis: quæ in stomachum irrepens sitim inducit.

11 Nauseat nempe ventriculus ex ciborum abundantia.

12 Ex humorum vitio, & spirituum agitatione.

13 Ex copia sanguinis. Nam urinæ color & consistentia, humorum in venis contentorum index est, nisi renum aut vesicæ vitium iudicium inturbet.

14 Quæ portenditur sæculentum in venis dominari sanguinem. Cuius causa calor, aut frigus est. Nam ab utroque nigredo fit. A calore quidem, in humidum agente: frigore in siccum, ut demonstrat Auicennas. Ideo sanguis, qui in venis concitatus effervuit, & cōtrà qui perstitit immobilis, terrestrémque nactus est qualitatem, serum nigricans in renes exprimit, suppressis mensibus.

*lib. 1. fen.
1. doct. 4.*

15 Obstructis renibus, & bilefcente sero.

16 Mulieres, suppressis mensibus, incidunt interdum in phrenitidem, maniam, & melancholiam, bilioso, vel adusto vapore, vel humore in mentis domicilium elato.

17 Oppresso iecore præ copia sanguinis, illuc ab vtero regurgitantis, hydrops consequitur. Facultas quippe sanguifica resoluitur, & natiui caloris penuria, vice sanguinis aquæ procreantur quæ primò decumbunt in abdomen, crura, pedes. Sunt enim partes hæ decliues, natura frigidæ, & à natiui caloris fonte remotiores.

HYSTERICÆ 'SVFFOCATIO-
NIS NOTÆ. CAPVT V.

STRANGVLAT ¹hinc vterus, si non succurritur, ægram.
Namque³ cibos grauidus venter fastidit, & odit,
Et desiderium sequitur, sed ⁴inane, vomendi:
⁵Cor labat obsessum, breuis est, & sæpe mouetur
Spiritus, atque rubet facies, geminæque putantur
Occludi fauces. Gelido perculsa pauore
Fœmina tunc diffidit, & vt moribunda quiescit,
⁶Vt pulsu motûque carens, ita munere linguæ.
Nō tamen horrendæ sunt hæc certa omina mortis.
Sed ⁷pulsus, sensûsque redit, quum murmure leni
Venter mollior est, vteri laxantur habenæ,
Eque locis humor liquidus muliebribus exit.

I Suffocatio, seu stragulatus vteri nominatur hic affectus, quoniam in hoc, vteri vitio, respiratio præpeditur, tetro quodam vapore in diaphragma cerebrumque, per spinæ membranas & nervos: inq; cor, per arterias elato. Vel vteri corpore sursum impulsio, & mutuo contactu ventriculum diaphragmæque premente: vel remeante ex vtero in venas arteriasque superiores sanguine, quo thoracis venæ præcipue turgent, & plenæ carotides arteriæ spiritum intercipiunt.

2 Non solum à suppressis mensibus, quorum superiore capite commemorata signa sunt: sed etiam à retento semine contingit hysterica suffocatio. Quumque sit hæc Epilepsiæ similis: Epilepsia verò fiat non à repletionem tantum, sed etiam inanitione, siccitas etiam inter suffocationis vteri causas recensetur. Interdum enim impensè vacuatis, inanibusque muliebribus vasis, vterus sursum ad iecur conuertitur, à quo demum humiditatem attrahat, vt plerique contra Galeni sententiam contendunt, ⁸Hippocratis doctrinam sequuti. Nec enim absurdum est vterum sursum, deorsum, & in vtrumque latus concitari, quum id, admodum plerumque manu, verum esse deprehendatur.

*libro 6. de
loc. affect.
capit. 5.
lib. 1. de
morb.*

3 Eos enim tum non bene continet, neque conficit ventriculus. Siquidem eius os, præsertim inferius, comprimit vterus, dum sursum attollitur.

4 Nihil enim, aut parum cibi cōtinet ventriculus, ob frequentem ante paroxysmum anorexiam. Nec leuat vomitus, quia suffocationis causam efficientem non tollit.

5 Sequentia signa quum insolita sint, & plena terroris, à suppressi sanguinis sola copia putridive seminis vulgari qualitate fieri non posse videntur. Sed rationi magis est consonum ex illis spiritum quendam, aut vaporem tenuem suscitari, qui scorpio-
nis ictus instar malignus, principes corporis partes offendit.

6 Ut in confesso est spirationem à vita, vitamque à spiratione seiungi non posse: sic pulsus non esse, viuere tamen animal est impossibile. Mulieres tamen hystericae, quum paroxysmus est vehemens, sine spiritu pulsuque iacent, interiisseque vulgò putantur, quæ nihilominus viuunt. Venenatus quippe malignusque vapor non modo per venas & arterias, sed & cæca spiracula sublatu ab utero, partium quas attigerit facultates offundit, & earum intercipit functiones. Aut, ut quidam opinantur, frigidum humidumque semen corpus vniuersum refrigerat, ut qui reliquus est in corde calor, sine respirationis pulsusque nota tueri se possit, contentus sola transpiratione, quæ per poros efficitur. Quæ transpiratio, quamuis cordis arteriarumque motu definiatur, hic tamen ita paruus est, ut omnino sensum effugiat. Calor enim imbecillus, ventilatione, quæ spiratione fit, & arteriarum euidenti motione, nulla prorsus indiget: ut probat Galenus eorum animantium exemplo, quæ per hyemem in latebris, sine respirationis usu degunt, conuenientique vita fruuntur.

7 Deorsum vrgente materia noxia, relinquenteque partes nobiles, vnde quiescit paroxysmus.

FURORIS VTERINI SIGNA.

CAPUT VI.

Q V V M furor est vteri, lachrymis nunc mœret
obortis,

Nunc ira infræni sæuit, nunc gaudet, & instar
Mœnados impatiens, dicenda tacendaque passim
Effutit mulier. Cui non Cirrhæus Apollo,
Nec Lucina placet, Paphia ut placet aliger infans.

G ij

Quod loquitur, ²Venus est, Venus est quod mente capeſſit,

³Prurit inexpletum nullo tangente pudendum,
Contactúmque mouet ⁴mira dulcedine ſenſus.

tetrab. 4.
ſerm. 4.
capit. 74

1 Morbus hic, furor vterinus appellatur, quia cerebro per vteri conſenſum affecto rabioſum in eo ſequitur delirium. In quo ſlet interdum, mox excandescit: nonnunquam, & ſæpius, inſolenti gaudio geſtit mulier, pro varia qualitate vaporum cerebrũ ferientium, qui vel ſanguinei ſunt, vel bilioſi, vel aduſti. Quamquam Actius híc negat vaporum aſcenſum. Sed qualitatẽ vitiõſam ab vtero per ſpinæ medullam, & alias ſibi inſertas propagines in cerebrum emitti contendit vtero conſiſtente, non, vt in ſtrágulatu, ſuperas ſedes affectante.

2 Nam furoris vterini præcipua, continensque cauſa, copia ſeminis eſt, qua vaſa turgent.

3 Incaleſcente, titillantéque ſemine.

4 Ob præſtantiam ſpirituum, leuiter ferientium partes vteri ſenſibiles. His verò ſymptomatis corripiuntur, quæ calido temperamento ſunt, ætate florentes, virgines, & quæ Veneris conſuetum uſum intermiſerunt, quæque cibis euclymis & multis indulſerunt.

M E N S I V M I M M O D I C E F L U E N T I V M N O T Æ . C A P . V I I .

DE C O L O R eſt facies, quum menſtrua plura feruntur,
Vêtriculúsque nouas ſpernit, veterésque relinquit
Incoctas epulas, auidus quas antè recepit:
Vnde ³pedum tumor eſt, ac omnis corporis albus,
Membraque vitali torpent exhausta calore.

1 Floridus color emicat à ſpiritibus & ſanguine. Quum verò, menſtruis immodicè fluentibus, cum ſanguine ſpiritus ſimul exeant, neceſſum eſt faciem fieri decolorem.

2 Quia plurimis, iisque crudis abundat humoribus. Etenim in exceſſu menſtruorum, abeuntibus vnà cum ſanguine ſpiritibus

bus languet natiuus calor: ideoque ventriculus quos assumpsit cibos non conficit.

3 Ex mensium immodico fluore nō modò pedes tument, sed & totum corpus œdematosum est, ac turgidū instar leucophlegmatix, quia natiuus atteritur calor. Qui quum in visceribus minimus existat, elucere nequit in habitu corporis. Hinc mendosa fit partium extimarum nutritio, in aquas, flatus alicuius participes abeunte sanguine.

FLVXVS MVLIEBRIS A
MENSIBVS DISCRIMEN,
& signa. Caput octauum.

MENSTRVVS hic sanguis, certo qui tempore prodit

Ex utero, tunicamque, rubens vt purpura, tingit.

At fluor est, quando sanies nullo ordine fertur

³Pallida, vel citrina, sed & ⁴commixta cruori.

Quæ, qua parte fluit, corrodit, & excitat vlcus,

Quod plerumque graui nares offendit odore.

Interdum ¹lactisque fero, niueoque videmus

Cremori similem ex utero manare liquorem.

1 Quarta quaque hebdomade, seu quouis lunari mense, qui viginti septem diebus, & tertia ferè diei parte peragitur, mulieres boni habitus per menstrua repurgantur: iuniores quidem vt plurimum increfcente, seniores verò decrefcente Luna: vnde versus,

Luna vetus veteres, iuuenes noua Luna repurgat.

Aristoteles tamen ab ea sententia desistere videtur, dū ait profluuium mensium non increfcente, sed decrefcente Luna contingere: ideoque nonnullos cauillo sexum fœmineum Lunæ tribuere, quoniam ea decrefcente purgetur mulier, mōxque repleatur ambæ. Quæadmodum & quum asserit, menstrua singulis mensibus paucis moueri, contra vulgarem medicorum opinionem, & mulierum sanarum experientiam, quæ singulis mensibus isthæc ex seipsis effluere summo suo cōmodo profitentur. Quorum periodi causam refert Galenus in naturæ vim, omnia

libro 7. de
animal.
capit. 2.

libro 2. de
diebus
decret.

certis legibus administrantis: aut in sempiternos & immutabiles Lunæ cursus: quæ ut luminum varietate, tum crescens, tum decrescens mensem dimetitur: sic hominis, maximèque fœminæ, ut reliquorum etiam omnium humores rata ordinis cōstantia regit atque moderatur.

2 Natura superuacaneos humores regere nequeunte, propter eius imbecillitatem. Etenim fere fit, ut ad refrigerationem viscerum, obstructionem, & scirrhum (vnde cruditas & cachexia) fluor hic consequatur, & corruptus humor à reliquis corporis partibus procumbat in uterum. Quare frequenter eas mulieres exercet, quæ crudis oleribus, aqua multa, lacte, placentis, libis, laganis, artocreis, & aliis id genus ventrem farciunt.

3 Si talis sanies est crassior, diūque profluit, ante, postque menses, cum ardore lumborum, virulentæ gonorrhœæ signum est: nec ab utero, sed à vasis spermaticis origo mali repetenda.

4 Corrosio vteri venis ob acrimoniam humoris: vel apertis ob eius copiam, aut vasorum imbecillitatem. Copiam indicat fluor multus: acrimoniam longus, stillans ac pungens.

5 Hoc floris genus in cacochymis mulieribus, iisque præsertim, quæ fœdis coloribus & leucophlegmatia tenentur, existit freques. Quod à pituita fieri probabile est, ut citrinum & pallidum à bile. sæpius etiam gonorrhœæ (qua præhenduntur mulieres ut viri) signum est: veræ quidem, quum expers est acrimonie fluor virulentæ, quum graueolens. Sed in gonorrhœa per intervalla materia decidit, assidue verò in uterino fluore.

VTERI DEBILIS INDICIA.

CAPVT IX.

MENSTRA ¹nigra fluunt & aquosa ²sine ordine, quando
 Debilis est uterus, ³Venerisque cupidine nulla
 Tangitur imbellis mulier, refugitque viriles
 Contactus: semenque viri si fortè recepit,
 Non retinere diu potis est, atque ocyus infans,
 Si concepit, abit, prærepto tempore partus.
 Quumque instat menses, grauitas cum pectine crura
 Occupat & lumbos, ⁴stomachusque, caputque
 premuntur. i Re-

1 Refrigerato sanguine.

2 Nempe bis aut ter, ait Aetius, in mense. Quod in multis *tetrab. 4.*
annotamus. Nonnullæ verò sunt, in quibus nec dierum nume- *sermon. 4.*
rus ullus obseruatur, adeò menses incerto ordine sæpe repetunt *capit. 73.*
ac desinunt.

3 Quæ sequuntur, vteri frigus indicant, & humoris copiam.

4 Imbecillus vterus, humores è corpore superuacaneos in se
recipit: vnde stomachus, qui propter viciniam & nervos ei con
sentit, imprimis afficitur, itémque cerebrum, elatis sursum
vaporibus.

INFLAMMATIONIS VTERI SIGNA. CAPVT X.

FERVIDIORE tumor genitus de sangui-
ne, collum

² Afficit, immisso digito si durius illud

Contrahitur, tactúque facit pressúque dolorem.

Sin vteri fundo tumor est, dolor vrget in imo

Ventre & pube ferox, vrinæque ³ tardiùs exit.

Ardor inest lumbis spinam diffusus in omnem,

Nec ⁴ faeces abeunt solito de more per aluum.

Inguina tum, coxæque grauant, febrísque calore

⁵ Ilias in corpus diffunditur omne malorum.

1 Collum vteri quia musculosum, inflammationem concipit.
Inflammatum verò ex duritie cum dolore cognoscitur. Quum
enim id duplici substãtia constet, musculosa nimirum & cartila-
ginea: calore, phlegmones comite, siccus, ideòque durius effi-
citur. Dolet etiam, quoniam vi caloris alteratur, & copia san-
guinis, in eius venis capillaribus contenti distenditur.

2 Inflammationis vteri causa, tenuis est feruidúsque sanguis, qui
è venâ caua per exiguas venas in vteri substantiam illabatur, ibi-
que collectus putret & accenditur. Cuius dolor in cervice, seu
collo maior est. Huic enim, vt virgæ maris, cæterisque quæ ad
pudendum spectant, nervi plures insiti, quòd sensum absolutio-
rem, venereorum ratione postulent, vt Galenus animadvertit. *lib. 14. de*

3 Compressa vesica per vteri dilatationem.

usu part.

G iij

4 Si vteri sola pars antica phlegmonem concipit, dolor est in hypogastrio pubèque tactu conspicuus. Sin postica tantum, ad anum molestiæ percipitur sensus. Tum enim rectum intestinum arctius est, & duriores alui fæces, ob affectæ partis viciniam. Quum autem inflammatio totum vteri corpus occupat, omnes etiam eius partes dolor obsidet.

capit. 83.
retrab. 4.
sermon. 4.

5 Nam, inquit Acrius, dolor capitis, delirium, afflictio stomachi, tumor inferioris ventris, distentio præcordiorum, horrores discurrentes ac pungentes, pedum torpor, genuum perfrigeratio, partium extremarum exudatio, parui densique pulsus, & animi deliquium, inualecente phlegmone contingunt. Hastenus ille. Si verò suppurat inflammatio, sequitur vlcus non raro depascens, & in vlceratum carcinoma plerumque degeneras, quum hic locus excrementis putredinique pateat.

DESCRIPTIO CARCINOMATIS, ET EIVS IN VTERO

signa. Caput undecimum.

C¹ANCER, ²inæqualis tumor est, tactuque renitens,

³Luridus aspectu, turgentibus vndique venis,

⁴Mole grauis, saniem, comes est si forsitan vlcus,

Effundens ⁵tenuem, fuscam, nigramve colore,

Cuius odor teter virus docet esse malignum.

Interdum hic vterum ⁶mollem depascitur, & tunc

⁷Inguinibus ferus ardor inest, pecténque pilosus.

Venter & inferior quatitur, lumbique dolore.

1 Hic affectus ab animali cancro nomen habet. Quod ut asperum ac durum est, & si quid forcipibus suis ceperit, haud facile dimittit: ita tumor iste prominet, tactuque renititur, & ægrè tractabilis est, nec ab eo loco, in quo semel hæserit, auelli tollique, nisi difficillimè, potest. Cuius feritas ex eo cognoscitur, quòd, quo blandius tractatur, hoc sænior & insolentior est: cuius ideo curationem Hippocrates tentari vetuit.

aph. 38.
lib. 6. aph.

2 Cum rotunditate. Pariunt autem hanc inæqualitatem venæ, quæ in ambitu turgidæ, canceri pedum effigiem exprimunt,

vr

ut tumor ipse canceri corpus.

3 Obliuidas & nigricantes venas.

4 Quia fæculentus est, nec meabilis humor ille, qui cancerum inducit.

5 Nec enim ater hic humor verum pus (quod album & æquale esse conuenit) admittere potest, quia toto genere præter naturam est, ideoque pepasmi penitus expers.

6 Partes laxæ, molles, & quæ crassissimam materiam promptè suscipiunt, eadem & cancerum faciliè contrahunt, inquit Paulus Ægineta. Ideoque quum in omni corporis parte cancer oriri soleat, in mammis, vteroque maximè versari consuevit. *capit. 26.
libr. 4. de
re medica*

7 Per sympathiam earum partium cum vtero. Cæterum calor ac dolor quasi ferientis acus excitari solet in cancro, minùs quidem pungens in vlceris experte seu simplici: magis autem in exulcerato, si causa sit, ut sæpius, atra bilis, sanguisve feruidus, ac retorridus. Sin humor melancholicus, frigidus nimirum & siccus, nullus caloris dolorisve sensus est.

MOLÆ SIGNA.

CAPVT XII.

CONCEPTVM primis fallit' mola sæpe diebus.
Menstrua nam cessant, lumbi grauitate premuntur,

Vtraque mamma tumet: sensimque attollitur imus
Venter, & appositæ pariunt fastidia mensæ.

²Sed dolor hinc veluti pungens, vitiûmque coloris,
Et graciles artus, onerosum in pectine pondus,
Non motus leuis atque fugax, ³gestatio longa,
Durâque pars vteri quando est, mola vera putetur.

1 Mola, caro quædam est informis, quæ veluti fœtus, in vteri capacitate gignitur, alimentumque sumit per venas quas intus habet, nutritur, & augetur more plantarum. Ideo, quemadmodum in conceptu, sic in mola menses supprimuntur, menstruo sanguine in alimentum abeunte: ponderis sensus est in lumbis, quoniam hi subiacent materiæ mensum & molæ corpori: mæ turgent, translata illuc ex vteri venis materiæ portione: venter attollitur, quoniam mola pariter ac fœtus incrementum su-

mit in vtero, ventri subiecto. Fit etiam anorexia, quia dum impletur vterus, intestina sursum attolluntur, & inferius os ventriculi subleuant: inde commouetur bilis, & cibi vel corrumpuntur, vel non digeruntur.

2 Molam à vero fœtu distinguunt signa in textu sequentia: quorum hæ sunt causæ. Dolor quidem veluti punctorius existit in mola, corrumpi iam incipiente materia. Nec enim hic humores, vt in legitimo fœtu natura regit. Fœdatur color, quia natiuus calor, & sanguis alteratur. Corpus velut atrophia contabescit, quia ventriculus & hepar nutriendis partibus dicata languent: ventriculus quidem, molæ pondere pressus: hepar autem refluyente sanguine quasi suffocatum, vnde fit interdum hydrops. Pondus in pectore, totoque hypochondrio grauans est, cum ob incumbentem molam, tum ob suppressos menses. Motus etiam est instar lapidis, quia mola naturali duntaxat motu cietur, fœtus autem etiam animali. Quamobrem hic calcitrans, sursum, deorsum, & in vtrumque latus ferri percipitur, mola tantum deorsum, sua nempe mole præcipitata.

3 Mola, quadragesimo die, tertiove mense sæpius excluditur. Per multos etiam annos interdum, & aliquando per totam vitam in vtero gestatur. Hinc ea per se mollis, scirrhum corpus tempore contrahit in vteri regione tactu conspicuum. Distinguitur tamen à scirrho. Siquidem hic in vteri substantia residet & cogitur, ab humore crasso terrenoque genitus. Mola verò non in vteri substantia, sed in eius capacitate generationis suæ sumit exordium. Huius enim duæ causæ sunt: efficiens quidem & præcipua, viri semen: paucum id, & infœcundum, eo nempe calore destitutum, quo perfectè formam hominis absoluat. Materialis autem, copia mensum ad semen accedens, eiusque formatricem vim obruens.

INFLATIONIS VTERI NOTÆ.

CAPVT XIII.

TENDITVR inferior venter, pecténque tumore,
Pars quoque tensa dolens imitatur tympana tactu
Flatibus inclusis vtero: quos fœmina tactu
Percipit efferri nonnunquam è sede verenda.

I Dolo-

1 Dolore propemodum assimili colico : non tanto tamen, quum vterus amplior laxiorque sit, minúsque doloris sustinens quàm colum.

2 Inclusa vtero flatulenta materia, qualis est quæ Tympanitem hydropis speciem parit. Distinguitur in hoc, quòd Tympanites totum ventrem occupet : vteri verò flatulentus tumor duntaxat inferiorem.

3 Per vteri cervicem. Quod idem solatium adfert, atque crepitus per podicem in cruciatu colico. Flatulenta namque materia, quæ in vteri vacua capacitate coercebatur, exclusa, tensio dolorque conquiescit.

HYDROPI S VTERINI

SIGNA. CAPVT XIII.

PONDVS inest vtero 'gravius, si gignitur hydrops.

'Nec, velut in tactu, digitis pars dura resistit.
Sed vario motu surgens vnda, atque relabens
Fluctuat, & tactu mollem notat esse tumorem.

1 Flatulentus tumor minús grauat, quum aeræ naturæ sit particeps. Serosus autem & aqueus (vt qui constituit hydropem) est grauior, quoniam ad elementaris aquæ speciem, quæ densior est aere, propius accedit.

2 Tumor ille, quem flatus pariunt, digitis non cedit, quia tenditur. Tenditur verò, quia siccescit in eo contentus aer, cum à motu, tum ab aliquantulo calore. Contrà tumor aqueus ideo tactui cedit, quoniam impensè mollis.

ASCENSVS AC DESCENSVS

VTERI SIGNA. CAP. XV.

ASCENSVS tumidæ 'dolitât præcordia metra,
'Defectus cordis 'leuis, & dyspnœa fatigat.
Descensu 'gravis anus, vt & muliebri pudendum:
Nec facilis lotio datur exitus, atque virilem
Congressum 'metuit mulier, quo sæpius arsit.

1 Dum enim sursum attollitur uterus, diaphragma premitur plurimum sensile, quia membranosum & nerveum.

2 Presso diaphragmate, difficultas fit spiritus, quoniam arctatur interna thoracis capacitas, ideoque sequitur & animi defectio, corde non satis ventilato.

3 Nam talis ascensus causa flatus est, vaporque tenuis, qui facile dissipatur ac evanescit. Inde fit ut admota manu calida manifeste deprimatur, inque suam sedem deoluatur uterus.

4 In uteri descensu gravatur intestinum rectum, & pudendum. His enim partibus incumbit. Urina quoque difficile exprimitur. Siquidem ille vesicæ suæ mole premit, eiusque vias occludit.

5 Vtero de sede propria delapso mulier viriles amplexus reformidat, quia muliebri pudendo, sedi veneris, tum incumbit uterus: cuius corpus crassum est, densum, ac dolorem inducens, ratione fibrosarum partium, quibus is adalligatur intestino recto, vesicæque: quas tendi necessarium est, laxatis ligamentis robustis, quæ illum ossi sacro spinæque connectunt. Nihil autem est, quod æque venerem arceat ac dolor. Siquidem venus est excellens tangibile, natura concessum animantibus, ad speciei cuiusque conservationem.

SIGNA CONCEPTVS.

CAPVT XVI.

HORROR ab ardenti coitu, semenque retentum,

³Suppressi menses, Venerisque ⁴remissior ignis,
⁵Os uteri clausum, mæma utraque ⁶turgida, ventris,
Lûborum, laterumque tumor ⁷sine pòdere, liuens
Exortis facies maculis, & ⁸segnis ocellus,
⁹Nausea, defectusque leues, anorexia, pica
Conceptum perhibent. ¹⁰Lotio ne fide, nec ullis
Antè notis, fœtum quàm ¹¹notis sede moueri.

*lib. de
carn.*

1 Mulier quum in ventre concepit, statim, ait Hippocrates, horret, & calor, & dentium stridor consequitur, conuulsio occupat articulos, totumque corpus, utrumque segnitie ac torpor. Horroris verò causa quum sit multiplex, hic quidem potissimum

tissimum esse videtur motus vehemens in utero, à calido semine, quod uterus avidius amplectitur, excitatus.

2 Congressus aviditas calfacit uterum. Calidior autem uterus attrahit promptius, retinetque semen, unde conceptus fit. Nec vero solus calor conceptus est causa. Sed oscula vasorum uteri, per quæ menses erumpunt, aperiri necessarium est, quando mulier est conceptura. Quod contingit incipientibus, aut desinentibus fluere menstruis. Hoc enim tempore, nec multitudine sanguinis influentis eluitur semen, ut quum menses vbertim & copiose fluunt: nec semen alimento suo priuatur. Sanguinis enim veluti rore conspergitur, cuius asperitate quadam, seu visco, uteri parietibus adhæret, ibique retinetur in fœtus formationem, ut Galenus ratio cinatur.

*libro de
uter. dis-
sect.*

3 Quando concepit mulier, supprimuntur menses, quia sanguis menstruus abit in fœtus alimentum. Hos itaque tunc fluere malum. Unde scribit Hippocrates, si prægnanti purgationes eant, impossibile fœtum esse sanum. Quanquam nonnullæ sunt quibus per aliquot, eosque primos menses, interdum & per omne gestationis tempus menstrua fluunt, incolumi tandem exeunte fœtu: Sed hoc rarum, & his contingere solitum, quibus abunde suppetit sanguis.

*aph. 60.
libr. 5.*

4 Mulier, ut equa, prægnans, non recusat coitum, præter consuetudinem omnium animalium, quæ ubi gravida fuerint, fugiunt mares, ait Aristoteles. Non tamen sic expetit, atque quum fœcunda non est, quia plenus uterus eo semine potitur, cuius antè summo desiderio tenebatur.

*libro 7. de
animal.
capit. 4.*

5 Utro suam omnem contrahente capacitatem, ut semen retineat.

6 Portione sanguinis illuc ex utero confluente, unde lac fiat, idoneum exituro fœtui nutrimentum.

7 Mulieribus gravidis tumet venter sine manifesto pondere, si sanæ sunt, quia tumoris causa naturalis est. Sin tumor est præter naturam, ut in uteri scirrho vel hydrope: vel earum corpus cacoehymia redundat, tumor est onerosus.

8 Quum mulier habuerit in ventre, purus illius sanguis, inquit Hippocrates, ex toto corpore destillat, & in fœtum descendit, unde tota fit cum virore pallida. Quo posito, non est mirum si languent illius oculi. Nam, affluente ex universo corpore in uterum sanguine, spiritus animales, à quibus fit visio, non æquè vigent. Quandoquidem hi fieri debent, ut solent, ex optimo sanguine. Qui si decumbit in uterum, impurum in plexu retiformi necessum est elaborari, ex quo spiritus animales fiant aliquantulum caliginosi.

*libro 1. de
morb. mis-
liebr.*

9 Cordis & ventriculi cum vtero sympathia.

lib. 1. fen. 10 Nam imprægnationis ex vrina petita signa valde suspecta
2. cap. 10. sunt, necdum vsu satis explorata, quamuis Auicennas plurima
dott. 3. & commemoret.

lib. 3. fen. 11 Sunt enim præmissa signa probabilia quidem, sed incerta
21. cap. 11. tamen. Etenim supprimi possunt menses à crasso sanguine, vel
huius lib. vteri refrigeratione, vel ictero, vel aliis * antè commemoratis
capit. 4. causis. Potest & os vteri claudi à tumore præter naturâ, vt phle-
part. 1. gmone, scirrhone. Nauseam, anorexiam, lipothymiam, picam
inducere vitiosi possunt humores in stomacho ventriculôque
stabilantes. In mola mammæ turgent, vigéntque plurima con-
cept⁹ symptomata. Sed ad vteri regionem admota manu calida,
si morum percipis lenem, blandum ac ordinatum, quo venter
inferior aliquantulum impellatur & attollatur, certissimum ha-
beto conceptus & fœtus indicium.

CONCEPTI MASCULI

SIGNA. CAPVT XVII.

Si gestat fœcûda marem, ¹ bene tincta colore est,
Slaturque iocis, & quum de sede recedit,
Promouet ante pedem ² dextrum, iecorîq; propin-
Parte vteri fœtum retinet, sentitque moueri (qua
³ Ocyus, & leuiter dexter ⁴ micat huius ocellus.
Dextera māmā ⁵ tumet magis, atq; arrecta papilla est
Nigrâque, lac niueum ⁶ citius quàm læua profundēs,
Illiusque loci turgescunt sanguine venæ.

1 A calore bonus color & hilaritas. At mulier, quæ marem
vtero gerit, calidior est ea quæ concepit fœminam. Etenim à
femine quod perfectius monetur, & calidius est, fit masculus.
Ergo lætior, & coloratior.

lib. 14. de 2 Partes dextræ calidiores, quia secundum hepatis reſtituti-
usu part. nem locatæ sunt, vt scribit Galenus. Ideoque mulier, quæ dex-
tra vteri parte fœtum moueri percipit, magisque tumentem ha-
bet dexteram mammam, venas ampliores, eiusdemque loci ma-
gis micantes arterias, dextrumque pedem primum è sede pro-
gressura promouet, sæpius masculum vtero continet: siquidem
mas fœmina calidior existit. Quod, vt probabile, sic aliquando
fallax.

fallax. Quum enim sit duplex generationis masculorum principium, in fœminis quidem dextra matrix, in viris autem dexter testiculus: è sinistro viri teste semen in dextrum vteri sinum emitti potest, quod quū sit imbecillius, fœmellam producer. Fieri quoque potest, vt viri semen aquosum, crudum ac lāgidum in frigida matricis cornu dextrum effundatur, tumque pariat fœminam. Sed & aquæ crudæ frigidaque sola potio partum fœmineum efficit, sit licet in dextram vteri regionem à viro strenuo fœcundum semen immisum.

3 Conformatur primū masculus. Nam à fortiore crassioreq; genitura fit. idem quoq; mouetur primū, quia fœmella fortior est. Tempus verò principii motus ambiguum apud authores est. Nā Hippocrates mares moueri dicit trimestres: fœminas quadri-
lib. de natura. puer. & 1. de morb. * libro 3. sen. 2. tra- ff. 1. c. 13.
 mestres. * Auicennas verò non tertio mense quidem, sed post tertium masculos: post quartum fœmellas moueri indefinitè pronunciat. At mulieres, quibus fidem in similibus adhiberi vult Hippocrates, mares quadragesimo plerumque die: nonnunquam & mense tertio, additis ad hunc quindecim ferè diebus moueri masculum: fœminam verò sæpius medio imprægnationis tempore, nimirum intra quartum & quintum à conceptu mensem sumere motus exordium asserunt, experientia longa confirmatæ.

4 Mulierem id nosse expedit, inquit Hippocrates, vtra mam-
lib. de summa. persær.
 ma ipsi maior est: illic enim fœtus existit. Similiter & oculum cōsiderabit. Maior enim, & splendor omnino erit intra palpebram eius partis, cuius mamma maior existit. Vtriusque ratio hæc est. mamma maior est ea parte qua geritur fœtus, quia plus sanguinis in eius venas illabitur: oculūque splendor atque velocior, quia plures & vegetiores spiritus in eum efferuntur ex sanguine.

5 In grauida muliere mammarum venæ turgent, illuc ascende ex vtero sanguine. Qui quum in fœtu masculo velut ebulliat, quandam in papillas, velut in apicem & conum emittit fuliginem, qua nigricant (non vehementi nigredine, sed ei rubedine permista) firmæque sunt, & arrestæ propter siccitatem. Tale quid in fœmineo fœtu vix contingit, quia sanguis non asatur, nec fuliginosus est.

6 Plus enim sanguinis (à quo natiuus partis calor augetur) influit in mammam dextram, quàm in sinistram, vnde lactis generatio celerior.

CONCEPTÆ FOEMELLÆ

SIGNA. CAPVT XVIII.

FOE MINE AM prægnās vtero ſin fœmina prolē
 Concipit, effuſos à ſe fugat ¹anxia riſus,
 Decolor eſt, vteri pars turget læua, ²ſiniſtra
 Mâma tumet, nimium tamē eſt ea ³mollis, & huius
 Flaccida conſpicitur, non firma & recta papilla.
 Ex qua lac mulctum ⁴citò labitur, inſilit infans
⁵Tardiùs, inque caua ⁶leuiter matrice mouetur.

¹ Quū natura frigidiſſior humidiorque viro ſit fœmina, mulieri
 fœmellam geſtanti duplicatur frigus, quo, denſatis ſpiritibus,
 intròque ſe recipiente ſanguine, fit illa decolor ac triſtis.

² Si fœtus calidiores in vteri calidiore parte conſiſtunt, vt vult
comment. Galenus: frigidiſſiores etiam in vteri frigidiore loco par eſt conti-
2. in lib. 6. neri. Fœmella verò mare frigidiſſior, vt demonſtrat ^{*}Ariſtoteles.
epidem. Ergo vteri ſiniſtra parte continebitur.

³ Nam aquoſum crudumque lac continet.

⁴ Lac mulieris geſtantis maſculum, quia ſuſtinet exquiſitam
part. 42. coctionem, moderatè ſpiſſum eſt, album colore, odore gratum,
** lib. 4. de* ſapore dulce. Quod quum in vnguem inſtillatur, neque tardiùs,
generat, neque citiùs diſſluit, ſed aliquandiu remanet atque conſiſtit velut
animal. hydrargyri fruſtū, aut margaritæ granum, vt loquitur Auicēnas.
capit. 1. Eius verò quæ fœmellam habet in vtero, lac ab his qualitati-
 bus deficit, eſtque tenue, quia crudum: ideòque citò diſſluit.

⁵ Poſt quartum à conceptu menſem.

⁶ Mas vehementiùs quidem in vtero mouetur: at fœmina ce-
 leriùs. Quod à calore non pender, quum ſit ea mare frigidiſſior,
 ſed ab animi moribus. Eſt enim oxythyma mulier, ideòque velo-
 ces ac ſubitos habet corporis motus.

MORBORVM A CONCEPTV

SIGNA. CAPVT XIX.

QVÆ ſine ſuccorum vitio concepit, in omni
 Tempore quo grauida eſt, nullis patet obuia
 morbiſ.

morbis.

Sin praua humorum plena est, multaque saburra,
 *Euchymos refugit succos, rabiéque ³canina
 Vult alienorum satiari mole ciborum. (do,
 Et nisi purgetur ⁴vomitum, aut ⁵medicamine blan-
 *Non bene tum spirat, mens anxia linquitur, atque
 Circumfunduntur picea vertigine sensus:
 Inguinibúsque dolor, femoríque onerosus vtrique
 Hæret, vt & lumbis, & pondere crura vacillant.

1 Mulier prægnans, quæ nullo plethoræ aut cacochymix vitio tenetur, nihil offensionis, neque molestiæ toto gestationis decursu perpetitur, quia tum natura nihil habens oppositum in conuenientes vsus singula legitimè disponit.

2 Omnes quidem, sed præcipuè mulieres, & inter eas grauidæ cacochymum habètes corpus, in anorexiam frequenter incurrunt, & euchymos, seu boni succi cibos auersantur. Prauos enim humores in ventriculo congerunt, qui bilefcunt putredine. Nihil autem est, quod æquè facillè vertatur in bilem (si calorem aduentitium nanciscatur) ac cibi dulces. Tales sunt euchymi. Quamobrem hos natura vitiosis humoribus turgens fastidit atque contemnit, eorúmque loco cibus alienis & peregrinis, vt acidis, austeris & omnino vitiosis oblectatur.

3 Pica, seu malacia nominatur hic affectus. Quo grauidæ mulieres vitiosos cibos, & interdum à natura penitus abhorrentes, vt terram, testas, carbones, pannos veteres, putria coria, crudas carnes, & similia his, à secundo ad quartum ferè gestationis mensem expetunt. Caninam famem æmulatur in appetendo, fitque nonnunquam ab eadem causa, licet valentiore.

4 Qui frequens esse solet in pica. Nec enim tam varios humores, innatantes in ventriculo natura potest concoquere. Qui quum ab aduentitio calore turgeant, superius eius os appetunt, vomitioneque reiectantur.

5 Prægnantes cacochymæ repurgari debèt, vt gestationis tempore minus sentiant incommodum, earumque fœtus defæcatione nutritus sanguine, magis à morbis vindicetur. Lene verò debet esse medicamentum, ne commotis nimium humoribus, fœtus in vitæ discrimen adducatur. Maius autem vitæ periculum subit primis, postremisque mensibus. Primis quidem, chorio membrana (secundinam appellant) imbecilliore, nec vtero

H

per cotyledones satis firmiter alligata. Postremis autem, eadem quasi sua sponte dilabere: quemadmodum accidit arborum fructibus, qui prima generatione pediculis infirmis continentur, & ubi perfectè maturuerūt, minima, vel nulla vi decidunt. Quare iubet Hippocrates medio tempore, quarto videlicet ad septimum vsque mensem, turgente materia, pharmacum dari pręgnantibus. Tum enim vehementiores motus sustinent: nec tantus metus est exclusionis cōceptus, quam membranę fœtum inuoluentes vtero longè firmiùs inhæreant.

6 Hęc symptomata contingunt à retentis humoribus, qui vacatione debebant eximi.

ABORTVS FVTVRI SIGNA.

CAPVT XX.

Lac fluit è mammis¹ aqueum, si perditur infans. Quęque priùs tumidę fuerant, ³gracilefcere mammę

Cernuntur, ⁴ventris regio, laterumque minor fit.

Sunt lumbi, coxęque graues, validęque moueri

⁵Assolutus fœtus, ⁶rard, lentęque cietur.

Emanat primò ⁷sanies commixta rubori,

Purior hinc sanguis, tum ⁸grumi sanguinis atri,

Eque locis tandem fœtus muliebribus exit.

1 Abortus, est immatura violentęque fœtus exclusio. Cuius multę sunt euidentes causę, vt metus, mœror, inedia, sanguinis immodica profusio, diarrhœa, febris acuta, saltatio, durior equitatio vestioque, & quęuis exercitatio vehemens, grauioris oneris gestatio, vocis contentio, casusque violenter concutiens. Quę si desint, & mulieres bimestres, aut trimestres abortiunt, his, inquit Hippocrates, acetabula muco plena sunt, nec possunt prę grauitate fœtum continere, sed abruptitur.

2 Ob imbecillitatem costricticis mammarum facultatis.

3 Ob attracticis impotentiam.

4 Quum abortiendi tempus imminet, venter superior, & hypochondria contrahuntur: hypogastrium autem, seu venter inferior cum lūbis expandit se atque dilatat, quia fœtus cum reten

libro 4.
ap. 1.

ap. 4.
libr. 5.

to sanguine deorsum præcipitatur.

5 Quum sanus erat.

6 Quod opprimatur à vicini sanguinis qualitate vel copia: vel quod natiui caloris penuria langueat.

7 i. aqua saniosa, loturæ carniū assimilis.

8 Crumi sanguinis, qui excludūtur in abortu, rubent magis, si fœtus viuit, quum adhuc natiuo calore tepeat. Sin is extinct⁹ est, nigrescunt, cum ab aduentitio calore putrentis iam fœtus, tum ab extincto calore natiuo.

8 In vero partu fœtus primū exit, expultricis facultatis vi: fœtus exitum quærentis, & matris ad eius exclusionem adn- tentis robore. Quorū imbecillitate postremò sequitur abortus.

FOETVS IN VTERO MOR- TVI SIGNA. CAPVT XXI.

EXTINGTVS grauida fœtus retinetur in al-
Si dolore¹ oculis, capiti, cordiq; molest⁹, (uo,
Defect²usque frequens, & ³teter anhelitus, horror
⁴Febrilis, similis⁵que sacri conuulsio morbi,
Venter & inferior⁶ gelidus pendere videtur,
Nec profert vteri ceruix contacta calorem.

1 Vteri sympathia cum his partibus.

2 Per dolorem cordis, cardialgiam, seu cardiogmum intelli-
gimus, oris ventriculi symptoma. Quod (vt leipothymia, quam
defectus nomine designamus) frequens esse consuevit extincto
fœtu, cum ab humoribus in vtero commotis per vteri dilatatio-
nem, tum à corrupti fœtus vapore stomachura eriente.

3 Mortuo in vtero fœtu grauida fœtidum expirat. Is enim
breui corrumpitur: vnde putridi vapores sursum elati per os ex-
eunt. Cuius halitus graueolentiam interdum sentit & mater,
quum in priores cerebri ventriculos, odoratus sedem, aura pu-
tris ascendit, & eosdem inficit.

4 Putridis ex fœtu vaporibus, cor & humores inficientibus.

5 Quum extinctus in vtero fœtus est, venter inferior, cui sub-
iacet vterus, & vteri cernix admota manu frigent, vel quia na-
tius calor in fundum abiit, vt se putredini fœtus opponat: vel
quia calor ita paucus est, vt externis partibus calefaciendis ne-
queat satisfacere.

H ij

DIFFICILIS PARTVS INDI-
CIA. CAPVT XXII.

QUAE paritura breui est, & aquas, roseumve
cruorem

Ex utero, partu fieri nequeunte, profundit.

Quæque leues patitur, nec valde sæpe dolores,

Ægrius in lucem producit fœmina fœtum.

1 Partus difficultas his quidē paucis notis agnoscitur, sed à plu-
ribus causis efficitur, vt mala conformatione matris, breuitate
corporis eiusdem, & virium imbecillitate, dolorū in parturiedo
metu, mala conformatione tum vteri, tum cervicis eiusdem,
aut eorundem angustia, firmiore ossis pubis cōpactione, calcu-
lo vesicæ, siccis in intestino recto fœcibus, & lūborum cauitate.
Contingit etiam interdum imbecillum fœtum matri non opi-
tulari: membranas, quibus continetur, solidiores abrumpi
non posse: geminum, aut monstruosum, aut grandiore esse,
nec rectā in caput ferri, sed eum vel ambos pedes, vel vnum dū-
taxat, manumve proferre primū, vel duplicari, vel alterutrum
latus, aut ventrem exhibere. Quæ medicos astantes non medio-
criter angunt: chirurgis autem & obstetricibus maximum ad-
ferunt negotium, matrique & fœtui sæpius exitium.

2 Allatoides mēbrana, lotium iam efformati fœtus in se recipit
& continet ad partus tēpus, vt id cum fœtu simul exiens, trāsītū
ei facilem ac lubricum præbeat. Quod si totum effluit priusquā
fœtus excludatur, viæ sunt ob siccitatem asperæ, per quas ideo
summo labore fœtus egreditur. Idem contingit, si sanguis mul-
tus exeat ante partum.

3 Instante partus tempore, si fœtus se valide mouet, manibus
pedibusque calcitrans, frequentes dolores vrget, partusque faci-
lis ac repentinus est. Nam illum inuoluentes membranæ citō
rumpuntur, hisque ruptis foras exilit. Sin is parum & inualidē
se explicat, languidi dolores, & ex longioribus interuallis recur-
rentes sunt. Etenim cotyledones (acetabula vocant) abrumpū-
tur ægrius, vixque chorion ab utero diducitur.

EX ANTHEMATVM INDICIA.
CAPVT XXIII.

ERUMPENT illis papulæ, quibus oris hiatus
Crebrior, expāsāq; manus, corpūsq; per omne
Punctio,

† Punctio, cum querulo 'capitis' dorsi'que dolore :
 † Raucāq; vox, faciēs'q; rubēs, † lachrymāq; profusā.
 † Spiritus haud facilis, naris † pruritus, & auris,
 Et † pavor in somnis tremulus, febrísq;, sitísq; est.

1 Exanthemata, & eſthymata, Græci vocant eruptiones leues, efflorescentes in cute: quas Latini papulas appellant. Hæ plures fortiuntur differentias. Quædam enim rubræ, flauæ, pallidæ, violaceæ, liuidæ, nigræque conspiciuntur, pro humoris qui in cutem erumpit, colore vario. Quædam in fastigium attolluntur & extuberant: aliæ deprimuntur & latæ sunt, ut plus minusve caloris obtinet hæc, ex qua fiunt, materia. nonnullæ sine dolore sunt, sine pruritu, sine ulcere: quædā contra pruritum excitant, & summū inferunt scalpendi desiderium, cutim exasperant, rodunt & exulcerant, sanieque virulenta plerumque sordescunt. Aliæ porro malignæ sunt & exitiosæ, ut quæ pestilenti constitutione grassantur, quæ febribus acutis superueniunt cum symptomatū exitialium syndrome, quæq; sub mortem, & in morte certis corporis partibus excitantur: quæ, quia rubræ sunt, purpuræ nomine vulgo designantur. Aliæ critico modo nascuntur, quales in Synochis febribus interdum animaduertimus. Quales etiam variolæ, morbillique sunt. Quas maculas rarissimè senibus & viris, frequentius iuuenibus & adolescentibus, frequentissimè pueris & infantibus apparere solitas, ex menstruo gigni sanguine, qui poris corporis inhæsit, & robore naturæ tandem excluditur, Arabum fert sententia. Quo fit, ut earum post muliebrium affectuum notas explicatas, hoc capite meminerimus.

2 i. oscitatio.

3 i. pādiculatio. Quæ fit cōtento in musculis vniuersis (ut oscitatio in musculis inferioris maxillæ) vaporoso spiritu, ut passim annotat Galenus.

4 Ob humores acres in cutem elatos, cuius densitate coguntur, & in papulas abeunt.

5 Putridis vaporibus eo delatis cū sanguine: siquidem ad sanguinis copiam, vitiumque, papularum est causa referenda.

6 A repletionē venæ cauæ, quæ dorso subiacet, inquit Auicennas.

7 Liquata vi caloris febrilis in cerebro pituita, eaque in fauces decumbente. Vel excitatis exanthematis in vocis organis. Interdum enim guttur, pulmones, intestina, cum aliis partibus interioribus his scatere deprehenduntur.

8 Inuoluntariæ sunt hæ lachrymæ, quæ non tam ab imbecil-

H iij

comment.
 5. ad pass.
 4. libr. 6.
 de epid. 18
 comment.
 aph. 56
 libr. 7.
 * lib. 4. se-
 arab. 4.

la retentrice, quàm ab orgasmo funduntur.

9 Si papulæ sunt mali moris, non modò spirandi difficultas
vrget, sed ingens febris, æstus, iactatio corporis, animi deliquiū
frequens, & alia generis eiusdem pernicioſa ſigna ſe proferunt.

10 Acrioribus per febrem redditis excrementis, quæ intra na
res reſidunt.

11 Ob agitationem animalium ſpirituum, qui ſunt in pueris
(quos hoc affectu præcipuè teneri diximus) imbecilli.

'A R T H R I T I D I S S I G N A.

C A P V T X X I I I I.

Si capitis grauitas ſegni comitata veterno eſt,
Et tumor occipitis ceræ inſtar mollis, & albus:
Aut dolor, inuerſis ſolitus ſæuire capillis,
⁴ Denſaſque, quæ caluam ſuperat cutis, atq; deorſum
⁵ Frigidus, atque ſero ſimilis delabitur humor,
Ceruicem feriens, humeros, cubitòſq; ⁷ manùſque,
Vel dorſum incuruum, coxâmq; genùque, pedèſq;,
Humidius caput eſt gembūda Arthritidis author.
Sin hæc ſigna latent, & protinus ic̃ta dolore
Pars tumet, atque leui pallet cum febre, rubetve,
Cauſa mali iecur eſt, & ⁸ turgida vena cruore.

1 Arthritis, communis omnium articulorum dolor eſt. In cu-
ius initio articulorū vincula, & quæcunque ex offibus orta ſunt,
& in offa inferuntur, dolere incipiunt. Quumque malum au-
ctum eſt, futuræ capitis, vertebræ ceruicis dorſique dolent, offiſq;
ſacri poſtrema pars. In articulis tofacea quædam coaleſcunt.
Renibus & veſicæ, naribus, auribùſque communicatur malum,
vt nihil ferè ſit in toto corpore doloris expers, inquit Aretæus.
Quod morbi genus, vt acerbitate doloris horrendum: ſic, ſi ra-
dices egerit, tam infaſtum in curando, vt in eorum numerum
aſcribatur, quæ vulgus appellat medicorum opprobria. Cuius
cauſa, vitioſus humor eſt in articulis fluxione primū, deinde
congeſtione cumularus.

2 Capitis grauitas & in ſomnium propenſio plenitudinis ſi-
gnum eſt, aut pituitæ redundantis. Vtrum verò ſit, cognoscitur
ex plethoræ pituitæque ſignis expoſitis lib. 1. Sed tumor œde-
matofus ſupra caluariam, pituitæ dominium imprimis oſtēdit,
ma-

eius erit certissima coniectura, si capitis pondus & coma concurrunt.

3 Calfacta putredine pituita, quæ radicibus pilorum inhæret.

4 Cutis, quæ supra caluam, seu cranium est, si dēior est quam par sit, pituitosum humorem inter hanc & pericranium inclusum, quamuis serosum ac tennem, foras exire nō patitur. Quem per summa corporis sub cute deorsum decurrere, arthritidemque parere, multis rationibus conficit doctissimus Fernelius.

5 Solum humorem frigidū Arthritidis causam statuit, non tantum ex neotericis Fernel, sed & inter veteres medicos eximius scriptor* Aretæus. Quorum rationes etsi maximi momēti sunt, superat tamen eorum opinio, qui varios humores Arthritidem efficere cōfirmant. Nos verò duplicem Arthritidis fontem agnoscimus, cerebrum & hepar: viamque fluxionis à cerebro, quam nō minus acutē quam verē statuit eruditissimus Fernelius, & humoris speciem admittimus. Sed & varios humores ab hepate venisque in articulos influere, cum Galeno, cæterisque priscis authoribus consentaneum iudicamus. Etenim, color albus aquæ inter cutem similis, tumor œdematosus, dolor mediocris ac ferē nullus, exacerbationes, si quæ sunt, quotidianæ, pituitæ. Color rubens, dolor pulsatorius, tumorque partis & venarum, sanguinis. Color pallidus aut citrinus, dolor acer, tumor ferē nullus, exacerbationes tertianæ, bilis. Color plumbeus, frigoris sensus, dolor profundus scalpelli perforantis instar, accessiones quartanæ, melancholiæ dominantis indicia sunt, in articulorū affectibus reperiri solita. Quæ varietas humorum, non solum ex signorum multiplicitate, sed etiam curandi varia forma cognoscitur. Nam, Arthritidis à pituita curatio, phlegmagogo pharmaco, & discutientibus admotis: à bile cholagogo, & topicis anodynis: à sanguine phlebotomia: melanagogis à melancholia perficitur. Cur autem à variis humoribus laceessantur articuli, facit partium mittentium robur, recipientium imbecillitas, & ab imbecillitate laxitas, itēque tenuitas humorum influentium. An verò cerebrum, iecurve causa sit, cognoscitur ex signis in textu commemoratis.

6 Nempe tenuis. Tenuis autem est quum influit. Quum verò delituerit in articulis diutiùs, crassior ac viscosior efficitur, trophisque seu nodis, quibus dissiliunt articuli, præbet generationem.

7 Tres sunt Arthritidis species, ischias, podagra, chiragra. Si dolor à poplite vel tibia transit in cotylam, seu coxæ cauum, aut clunem, aut lumbos tantum, ischias est. Sin magnum pedis digitum dolor primū occupat: rursus calcem in priori parte

lib. 6. pathol. c. 18.
* lib. 2. de sign. & caus. diuturn. morbor. ca. 12.

qua nitimur: deinde cauum: & postremus omnium intumescit malleolus, hic affectus, ex Aretæo, podagræ nomine designatur. Si soli manus articuli dolent, aut simul afficitur cubiti flexura, talis affectio chiragra propriè nuncupatur. Quum in omnibus hisce partibus sæuit dolor, Arthritis est: quam à podagra principium sumere solitam esse scribit Galenus.

comment. 8 Qua, venæ sectione depleta, tollitur, aut saltem minuitur
ad aph. dolor, per reuulsionem suspensa materia, & impedita noua flu-
28. lib. 6. xione.

aphorism.

ELEPHANTIASIS SIGNA.

CAPVT XXV.

VISCERIBVS clausum retinens inamabile virus
Fœda ¹Leontiasis, leuibus se prodere signis
Assolet imprimis, nec aperta clade minari.
Namque quies, aliis quæ vix reperitur in ægris,
Hic ³trāquilla datur, ⁴placidus sopor occupat artus,
Luxuriosa ⁵placent Veneris commercia blandæ,
Estque, velut sanis interdum, ⁶durior aluus.
Dein stupet, & gelido violatur ⁷frigore sensus:
⁸Nec flos ille manet, qui viuידus esse solebat,
Sed ⁹flauo cutis est, ¹⁰albo, ¹¹nigrove colore.
Sæuius at gliscente malo ¹²grauis halitus exit,
¹³Raucescit quoque vox, lotium ¹⁴turbatur & albet.
¹⁵Liuet, & ¹⁶obscœnum facies malè tincta, tumorem
Induit, & partes naturæ lege pilosæ
¹⁷Glabrescunt, flauent oculi, ¹⁸fixique tenentur,
¹⁹Lucentesque minùs, curuum ²⁰sinuātur in orbem.
²¹Cōtrahitur quoq; frōs, multiq; fit ²²aspera rugis.
Lingua tumet ²³varis, & ei vtraque subdita vena
²⁴Nigricat: est ²⁵lichen q̃ p̃sora & ²⁶lepra sequuntur.
²⁷Incubus exercet, ²⁸terrent vaga somnia, mœror
²⁹Affiduus comes est, humeri ³⁰panduntur vt alæ,
³¹Spiritus est tardus, pulsus quoque: denique sensus
³²Deperit, & cana maculatur ³³grandine corpus.

I Ele-

1 Elephātiāsis, totius substantiæ morbus est. Nam terrenus ac melancholicus humor, eius materia venenatam qualitatem asciscens, visceribus primū, deinde partibus omnibus contagiosum virus impertit, quo demum inquinatæ, terrenum hunc ac melancholicum succum, vel ex purissimis alimentis gignunt, eiusdem veneni participem: eoque partes imbutæ, nutritæque, tempore similem nanciscuntur naturam.

2 Affectus hic multiplex nomen habet. Sæpius quidem Elephantiasis appellatur, quia cum Elephante bellua cōmunia multa sortitur, quæ longo disertoque sermone percurrit Aretæus. Vocatur & Leōtiāsis, quia quisquis in hunc morbum incidit, plurimas in fronte rugas, easque irati leonis instar ad supercilia contractas habet. item & Satyriāsis, ob malarum ruborem, & inexplabilem impudentemque cocundi libidinem, Satyris quondam familiare vitium. Hercules denique, quoniam eo nullus est maior neque valentior. Summam enim ad mortem inferendam vim obtinet: quippe cuius & mortis eadem origo est, primigenii nimirum humidi ab alieno calore depopulatio, quam omnium partium terrena siccitas consequitur.

*lib. 2. de
sign. &
caus. diu-
turn. mor-
bor. c. 13.*

3 Sanguine crassiore nondum malignam qualitatem adeptus.

4 Ex copioso sanguine quo redundant elephantici, vapores in cerebrum efferuntur, qui maligna qualitate nondum impressa, blandi, placidum ac tranquillum somnum conciliant. Nam, aucto demum affectu, molestissimus est somnus, materiæ somniferæ corruptione: vel vigiliæ premunt ab humoris acrimonia, siccitate, malignitate.

5 Ob falsos humores qui pruritū excitāt flatulentosque spiritus.

6 Quia viscera sicca, cæteræque corporis partes aridæ (plurimum enim terrenæ fæcis ac fuliginis habent, unde corpus vniuersum colore fusco, nigroque sæpius obscuratur, & est umbræ, mortisque simile) omnem humiditatem imbibunt.

7 Quo torpet vniuersa quidem cutis, sed maximè pedum, ob humorum crassitiem, continuitatem spirituum intercipiētem.

8 In elephātico non est floridus color, quia non concoquitur alimentum, sed raptim à partibus attrahitur, ideoque nec sanguis laudabilis, nec vegeti spiritus fiunt.

9 Ex his tribus coloribus tres elephantici differentias statuunt, subflauam, albam, nigram: ut prima sit ab assata flaua bile: à falsæ pituitæ dominio secunda: tertia humorem atrabiliarium, habeat suæ generationis authorem: qui pessimus omnium ac foetidissimus est. Erodit enim exeditque veram cutim, & ferinis ulceribus vniuersum corpus implens, extrema putredine consumit. Quartam his speciem addunt nonnulli, quæ subrubicun-

da nominari potest, à melancholico limosoq, sanguine nata, hoc mitior cæteris, quo sanguis reliquos humores bonitate superat.

10 i. putridus, qui contagione serpit in alium. Nam elephantiorum corrupta spiritus exhalatione, & ulcerū virulentorum fœtore vicinus inquinatur aer: quem quum haurire necesse sit, eos quoque contingit elephantia labe conspurcari, qui cum elephantiscis assidue versantur. Quamobrem his merito cœtu hominum interdicatur.

11 Crassescit enim, exasperaturque grandinosis varis arteria aspera cum gutture.

12 Quum sanguis in elephantiafi crassus sit, instarque fecis turbidus, illius quoque serum, nempe lotium, crassum ac turbidum fieri par est: quamvis interdum sit tenue, non naturâ, sed obstructis renum meatibus. albū etiam apparet, quia crudus sanguis.

13 Liuet elephantiorum facies, quia refriguit sanguis. Refriguit verò, quia non diffatur ob cutis crassitiem, qua pori non aperiuntur.

14 Etenim mentum malæque crassescunt, & livido rubore tinguntur: in eisque, ut reliqua facie tumores extuberant, labra tument & inuertuntur, supercilia prominentia, prædara, glabraque sunt, deorsumque pòdere vergentia. Crassescunt & alæ nariū, & rimis disceptæ, pustulas nigras atque cruentas excutiunt. Quineciam interdū erosa cartilagine nasus excidit, deformi spectaculo.

15 Nec enim aluntur, nec gignuntur pili, ob cutis densitatem & frigus.

16 Ab humorum & spirituum animalium siccitate.

17 Elephantiorum crassiores sunt humores: quamobrem & spiritus. Hinc oculi caliginosi sunt, eorumque candidum mira densitate, velut vngue tegitur.

18 Oculorum figura sphærica, seu rotunda semper quidem est, sed in eis minùs conspicua, quibus est sensuum integritas. Horum enim animales spiritus emicant, qui suos radios hinc inde variè spargentes, intuentium aspectum disgregant. Elephantiscis autem oculorum rotunditas evidentiùs apparet. Eorum quippe crassescunt spiritus, nec radios emittunt. Quod ex Sole demonstrari luculenter & aperte potest: qui quum serena luce se nobis ostendit, globosam suam effigiem aliquantulum celat. Noster enim oculus in illius aspectu caligat, & lumine radiorū obruitur. Cum verò spissus ac nebulosus est aer, aut nubecula quædā interponitur, tum eius rotundum schema facile dignoscimus.

19 Instar rugosæ pellis Leonum: unde Leontiasin hunc affectum appellari priùs meminimus.

20 A siccitate. Cuius signa magis elucet in fronte: quoniam hæc,

hæc, ferè tota cutis est, non, vt verus musculus, carne munita, qua possit natiuam suam humiditatem tueri.

21 Quum lingua supra musculos omnes laxa rarâque sit, in eadem grandinosa tubercula præcipuè tanguntur & inspiciuntur. Quare, qui suum lepram explorant, solam linguam intuentur, & attingunt, ex eâque vel morbosa, vel sana, de reliquo corpore simile ferunt iudicium.

22 Omnes venæ sanguinem atrum in elephantiasi continent. Ideo nigrescere videntur omnes, si non cutis densitas impediret. Linguae verò corpus maximè rarum ac porosum est. Quâobrem eius venæ perspicuè nigrescunt.

23 Malè affecta cute ob copiâ vitiosi succi, qui nequit assimilari.

24 Græcorum, non Arabum. Nam illorum lepra gradus tantum est ad elephantiasin. Arabes autem elephantiasin Græcorum, lepram appellant, vt & nos vulgo. Quæ confirmata curari non potest, quum ea sit vniuersi corporis cancer.

25 Oppressi lienis tumore.

26 Atro vapore, vel potius fumo cerebrum peruadente.

27 Melancholiæ dominantis signum pathognomonicum.

28 Consumptione partis inferioris musculi trapeziti, vt genius Hippocratis Ludou. *Duretus animaduertit.

29 Respiratio fit per musculos. Qui, quum in hoc affectu lentè moueantur ob stuporis sensum, respiratio quoque necessariò tarda fit, ac difficilis. Tardatur etiam pulsus, quia refriguit sanguis.

*comment.
in Foller.
cap. de ele
phantiasi.*

30 In elephâtiâsi confirmata, sensus cutis omnino perit, quia densata tum est, & frigore quasi glacie coaluit. Quare nervi molles, tenues, & quasi fibræ quæ per eam disseminantur, ita coguntur atque crassescunt, vt spiritum non recipiant animale. Morus autem etsi stupet, non tamen interit: quia natiuus calor in musculis conseruatur, cuius munere nervi, qui motui destinantur, minus offensi, spiritum animale excipiunt ac retinent, Musculi namque, præter carnosam substantiam, venas & arterias in se continent, quarum spiritibus & sanguine nutriantur, viuant & incalescant. Cutis autem siccior & frigidior est, vt potestè mediam inter carnem neruûmque naturam adeptâ. Cui nec venæ nec arteriæ sunt, sed in eam illarum tantum extrema subeunt. denique partium omnium est imbecillima: siquidem totius corporis excrementa recipit, & interioribus, externisque patet iniuriis. Nec tamen sicut in musculis motus, ita sensus est, sed in his velut in cute pariter amittitur. Quamobrem, qui volunt elephâticum experiri, acum altius in corpus adigunt. Ex cuius punctura si nullus doloris sensus excitatur, elephantiasin

solutam esse pronunciant: sin secus, minimè.

31 In eo morbo, quem hoc capite persequimur, crassus ac sæculētus humor vel è liene refluīt in hepar: vel in hepate genitus, & venosum genus implēs, in singulas corporis partes illabatur in alimentum. Vbi quum nequeat assimilari, frigore cogitur & candicat. Quamobrem assimilatrice vi languida, cōgesto in quibusque partibus humore, corpus omne verrucis, grādinem æmulantibus scatere consuevit, vt in suis deprehenditur. Tales autem verrucæ consummato iam affectu cernuntur, suntque signum elephantia pathognomonicum.

LIBRI QVARTI DE
signis morborum Finis.

Errata sic emendantur.

Pag. 6, versu 17, lege *sedatur orexis*. Pag. 15, 38, *declinationis*. P. 25, 12, *Aures*, non *Nares*: quamuis ad vtrumque se dicta ibi ratio possit extendere. P. 34, 6. *Ephialtes*. P. 118, 34. *somnum*.

AD FRANCISCVM
DV PORT IACOBVS
ab Amarantho Medicus
Parisiensis.

*Innumeros nuper medijs è faucibus orci
Eripis, & clarum, Portue, nomen habes.
At quum speratis minui se Dis videt umbris,
Sollicitat Stygios in tua damna canes.
Fama volat totam mendax effusa per urbem,
Te rapida pressos arte leuare lue.
Sic illi, placuit quibus impostura, relinquunt,
Turbáque te sequitur, quàm fuit antè, minor.
Sed tua tum virtus multis concussa procellis
Emicat, egregiúmque hac duce condis opus.
Condis opus, quod non tempus delebit auarum,
Nec, qui consumit plurima, liuor edax.*

I ij

Elogium huius operis.

ADESTE sacra vos medentium turba.
Portæus ecce, quem medicum sacrauistis,
Vestræ prophanans artis abditas dotes,
Arcana vulgat, signaque & notas morbi,
Impune ludit inter immeritum vulgus.
Adeste, & in ius ducite hunc reum raptim.

Eheu, quid aio? Præmiis virum contrà
Ornate quantum maximis decet. Namque
Quotquot latentes repperit notas morbi,
Monente Phœbo publicis notis mandat.

Pro formularum tam pio velut furto,
Quas ille medicorum à schola ad populum defert,
An Flauiana fortè præmia expectat:
Tribunus, Ædilis, Senator ut fiat?
Quanquam si vtrique conferenda sint dona
Tanto altiore præmio putem dignum
Hunc, qui popello præbet has notas morbi,
Quanto cuique dulcior bonis vita,
Quantoque litibus execrator morbus.

Ioannes Iacquerius Paris.

A L I V D.

Corporis humani latebroso carcere clausi
Hactenus affectus non potuere capi.
Nec medicina fuit diuinum credita munus,
Quæ sæpe incertam perfida ferret opem.
Portæi at menti radios immisit Apollo,
Quæis morbi causas, signaque certa daret.
Cernimus hinc cæco latitantes corpore morbos,
Cernitur ut tenero lucida forma vitro.

Christ. Vinc.

A L I V D A D L E C T O R E M.

Affectus cuiusque notas Portæus ab illis
Deduxit, per quos nunc medicina viget.
At, si fortè velis causas reperire notarum,
Portæi vnus perlege, Lector, opus.

L. D.

INDEX RERVM IN

HOC OPERE NOTANDA-

RVM: IN QVO PRIOR

numerus paginam, posterior
lineam designat.

A

A bortus futuri signa. 114, 14
Abortus quid. ibidem, 23
Abortus causæ. ibidem
Abortus exit post lochia: verus fœtus,
antè. 115, 10
Abscessu fiente, cur febris, & horror,
82, 27
Accessionis febrilis incipientis signa.
12, 13
Adeps unde. 8, 32
Aluum suppressam quæ signa comiten-
tur. 71, 26
Alui suppressionis causæ. 71, 31
Alui profluuium in febre, cur pernicio-
sum. 20, 12
Angina signa. 40, 3
Apoplexie signa. 31, 34
Aphonia, suppressis mensibus, unde.
97, 14
Arthritidis signa. 118, 11
Arthritidis origo. ibidem, 22
Arthritidis causæ. 119, 9
Arthritidis species. ibidem, 40
Ascensus uteri signa. 107, 29
Ascensus uteri causæ. 108, 6
Asthma quid. 41, 4
Asthmatis causæ. ibid. 7
Atrophie signa. 69, 25
Atrophie quid. ibid. 31
Auris tinnitus unde. 10, 33
Aures in acutis ac lethalibus febribus
cur refrigescunt. 25, 12

B

Bilis flauæ dominantis signa. 5, 3
Bile flaua dominante cur hyposthasis
paucæ, vel nulla. 5, 25
Bile dominante, qualis pulsus. ibid. 6
Bilis syncera, æruginosa, vitellinaque
quando fit, & excernitur. 64, 11
Bilis atra, continens hypochondriacæ
melancholiæ causa 67, 26
Bilis vsus. 17, 43
Bulimi causa. 59, 18

C

Cachexia signa. 69, 25
Cachexia quid. 70, 7
Cachexia causæ. ibidem
Caloris exuperantia quid indicat. 11, 21
Calor acer unde. 5, 22
Calculi renum signa. 83, 11
Calculi vesicæ signa. 84, 32
Calculosi cur variam urinam effundunt.
85, 26
Canceri descriptio, & eius in utero si-
gna. 104, 18
Cancer unde. ibid. 27
Cancer duplex. 105, 14
Canceri causæ. ibid. 15
Capitis affectuum vniuersalia signa.
27, 6
Cari materia. 31, 2
Caruncula parua cum urina simul
emicta quid significant. 62, 35

INDEX.

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Catalepticos, seu catoches causa. | 31, 10 | Diarrhœa, dysenteriaq; signa. | 76, 13 |
| Catarrhi signa. | 35, 4 | Dolor quid. | 27, 14 |
| Catarrhi prafocantis indicia. | 41, 12 | Doloris causa. | ibidem. |
| Causi pathognomonica signa. | 50, 33 | Dysenteria species. | 77, 1 |
| Cœliaci morbi notæ. | 75, 10 | Dyspnœa causa. | 42, 10 |
| Colum intestinum cur acerbissimos cruciatus inducit. | 10, 24 | | |
| Colici doloris notæ. | 73, 39. | E | |
| Colicus dolor, nephriticus aliquando cur putetur. | 74, 29 | Elephantia signa. | 120, 15 |
| Colici doloris à nephritico distinctio. | 74, 30 | Elephantiasis nomina varia. | 121, 8 |
| Conceptus signa. | 108, 23 | Elephantiasis causa, & differentia. | ibidem, 38 |
| Conceptus causa. | 109, 3 | Elephantia coru oculi cur rotundi. | 122, 30 |
| Conceptus quando fit. | ibidem, 7 | Elephantiasis confirmata non curatur. | 123, 15 |
| Conceptus signa cur incerta. | 110, 6 | Elephantia coru corpus grandinosus vari cur fedatur. | 124, 2 |
| Cõceptus signum pathognomonicum, ibidem, | 12 | Elephantia signum pathognomonicum. | ibidem, 9 |
| Cholera morbi signa. | 61, 19 | Epilepsia signa. | 32, 31 |
| Color floridus unde. | 3, 19 | Empyicorum, vide Purulentorum signa. | 44, 14 |
| Columella inflammata signa. | 39, 25 | Ephemeræ signa. | 53, 23 |
| Corpus in morbo non marcescens, quid indicet. | 21, 2 | Ephemeræ symptomata cur leuia. | ibidem, 30 |
| Criseos futura signa. | ibidem, 18 | Exanthematum indicia. | 116, 37 |
| Criseos male signa. | 22, 25 | | |
| Crisis quid. | ibidem, 32 | F | |
| Criseos bonæ signa. | 23, 33 | Faciei color, humoris dominium cur arguit. | 4, 22 |
| Cruentæ expuitionis è pulmone, vel thorace signa. | 47, 4 | Febris intermittens, cur secuta. | 17, 7 |
| Cutis arida causa. | 5, 15 | Februm signa communia. | 14, 4 |
| | | Febris quid. | 48, 19 |
| D | | Febris diuisio. | ibidem, 20 |
| Declinationis februm signa. | 15, 40 | Facmella conceptæ signa. | 112, 3 |
| Deglutiendi difficultas unde. | ibid. 15 | Facmella mare frigidior. | ibidem, 15 |
| Descensus uteri signa. | 107, 30 | Facmella celerius mouetur in utero, mas vehementius. | ibidem, 26 |
| Descensu uteri, cur mulier viriles amplexus odit. | 108, 12 | Facmina quo tempore motus initium sumit in utero. | 111, 13 |
| Diabetes notæ. | 80, 5 | Fœtus in utero mortui signa. | 115, 15 |
| Diaphragma cur plurimum sensibile. | 108, 2 | Fœtu in utero mortuo, cur pregnantis anhelitus fœtet. | ibidem, 27 |
| Diaphragmate pressio cur dyspnœa. | 108, 3 | | |

INDEX.

| | |
|--|-----------|
| <i>Fatus ab utero celerius, aut tardius</i> | |
| <i>exituri notæ.</i> | 116,28 |
| <i>Flatus dominantis indicia.</i> | 10,12 |
| <i>Fluxus muliebris à mensibus discrimen, & signa.</i> | 101,12 |
| <i>Fluxus muliebris causæ.</i> | 102,7 |
| <i>Fluxui muliebri quæ potissimum obnoxia.</i> | ibidem,10 |
| <i>Fluxus alui causæ.</i> | 76,18 |
| <i>Frigoris in febribus causa.</i> | 15,22 |
| <i>Frigiditas extremarum partium in acutis, unde.</i> | 26,2 |

G

Galenus diuini numinis operum ad-
miratione tenetur 2,8
Gallicus morbus, cur potius veneremus
dici debet. 91,12
Gonorrhœa vere signa. 88,15
Gonorrhœa quid. ibidem, 20
Gonorrhœa vigente, cur macies conse-
quitur. ibidem, 35
Gonorrhœa virulenta signa. 89,6
Gonorrhœa virulenta, recens morbus.
89,6
Gonorrhœa non citò supprimenda.
90,20
Grauiditatis signa cur incerta. 110,6
Grumosus, crassus, atérque sanguis è
thorace cur reuicitur. 47,22
Gustus deprauati causæ. 15,13

H

| | |
|---|----------|
| Hemitritæi signa. | 51, 29 |
| Hemitritæi materia. | ibid. 32 |
| Hemitritæus quare periculosa. | ibid. 38 |
| Hæctica signa. | 54, 26 |
| Hæctica sedes. | 55, 18 |
| Hæctica febris, cur dolore non afficit. | 55, 42 |
| Hepatici qui vocantur. | 65, 21 |

| | |
|--|------------|
| Humoris aquosi nota. | 9, 21 |
| Humoris aquosi, seu serosi copia quid indicet. | 9, 26 |
| Humoris aquosi dominio, cur alius lubrica. | 10, 8 |
| Hydropis signa. | 70, 30 |
| Hydropis cause. | ibidem, 34 |
| Hydropis uterini signa. | 107, 14 |
| Hypostasis quid significet. | 17, 34 |
| Hyperbolice figura. | 16, 26 |
| Hypochondrium indolens, equale, molle, quid indicet: & contrà. | 17, 20 |
| Hypochondriacæ melancholicæ signa. | 67, 13 |
| Hysterica suffocationis nota. | 98, 5 |
| Hysterica suffocationis causa. | 98, 24 |
| Hysterica mulieres, cur sine respiratione pulsusq; iacent. | 99, 16 |

1

| | |
|---|-----------|
| Icteri notæ. | 68, 29 |
| Icterus duplex. | 69, 4 |
| Icteri causæ. | ibidem, 9 |
| Ictericus color, in quibus corporis par- tibus magis apparet. | 5, 11 |
| Iecoris obstructi notæ. | 62, 21 |
| Iecoris obstructio simplex, cum nullum aut obtusum infert dolorem. | 62, 37 |
| Iecoris inflammati signa. | 63, 7 |
| Iecoris imbecilli notæ. | 65, 15 |
| Iecoris scirrhi notæ | 64, 21 |
| Ilei signa. | 72, 11 |
| Ileus quid. | 73, 11 |
| in Ileo cur lethalis convulsio. | 73, 22 |
| Incubi signa. | 33, 34 |
| Inflammatio duplex. | 64, 26 |
| Intermittentium febrium initio, cur frigus, horror, rigorue sit. | 50, 36 |

L

Leipothymia causa 14,30

INDEX.

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| Lethargi signa. | 29,40 | Melancholia morbi signa. | 34,13 |
| Lethargici pulsus cur undosus, ma- gnus, rarus, ac languidus. | 30,18. | Mensium immodicè fluentium nota. | 100,24 |
| Lienis tensi nota. | 66,18 | Mensibus immodicè fluentibus, cur fa- cies decolor. | ibidem, 30 |
| Lienis corpus, quale. | ibidem, 25 | Mensibus nimio perefluentibus cur pal- let, tumet ve corpus. | 101,3 |
| Lienterie signa. | 75,10 | Menstruæ purgationis præter naturam suppressæ signa. | 96,4 |
| Linguae deprauata signa. | 39,11 | Menstruæ purgationis præter naturam suppressæ causa. | ibidem, 17 |
| Linguae stupor unde. | ibidem, 21 | Menstruorum periodi causæ. | 101,21 |
| Lithiasis nota. | 84,32 | Mesenterij inflammati nota. | 68,3 |
| Lithiasis quid. | 85,3 | Mesenterium inflammatum cur sym- ptomata leuia comitètur. | ibidem, 22 |
| Lithiasis causa. | ibidem, 4 | Metus à somno, cur malus. | 19,18 |
| Longi morbi signa. | 20,24 | Mola signa. | 105,21 |
| Lumborum grauitas unde. | 15,3 | Mola quid. | ibidem, 29 |
| Lumbricorum signa. | 77,33 | Mola signorum causæ. | 106,6 |
| Lumbricorum species. | 78,12 | Mola ab uteri scirrho discriminè. | ib. 22 |
| Lumbricorum materia. | ibidem, 23 | Morbi imminenti signa. | 11,5 |
| Lumbrici cur intestina mordent, ac sugunt. | 79,2 | Morbi periculosi signa. | 18,6 |
| Lunæ vires in hæc inferiora. | 102,1 | Morituri signa communia quæ. | 13,21 |
| M | | Mortis signa. | 24,23 |
| Masculi concepti signa. | 110,18 | Mulieres quæ non purgantur. | 95,30 |
| Mas, cur scæmpta calidior. | ibidem, 27 | Mulieres ob siccitatē cur steriles. | ib. 32 |
| Marium generationis causa duplex. | 111,1 | Mulieres quando per menstrua repur- gantur. | 101,21 |
| Mas cur primum cōformatur. | ibid. 10 | N | |
| Mas cur primum mouetur. | ibidem, 11 | Narium affectuum signa. | 38,23 |
| Mas quo tēpore moueri incipit. | ibid. 13 | Nares in acutis, & sub mortem cur a- ciuntur. | 25,9 |
| Mammarum papille cur nigricant ma- rem gestantibus. | ibidem, 32 | Nephritici doloris nota. | 83,11 |
| Mamma dextra cur citius lacte stillat mulieribus, quæ masculum utero ge- runt. | ibidem, 38 | Nephritis quid. | ibidem, 24 |
| Medicinæ primæ summæq; partes quot. | 3,7 | Nephritici cur vomunt. | 84,15 |
| Melancholiae dominantis signa. | 6,11 | Nigredinis causa duplex. | 97,27 |
| Melancholicorum corpus, unde siccum, & aridum. | ibidem, 31 | O | |
| Melancholici quare taciturni. | 7,6 | Oculorum cæthi cur sordescunt magis, quàm adnata tunica. | 25,25 |
| Melancholici, cur, & qui nati inge- niosi. | ibidem, 10 | Oculus, in prægnante gestante mascu- | |
| Melancholici, cur timidi, mæstiq;. | ib. 15 | | |

INDEX.

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| lum, cur maior, splendidior, atque velocior. | 111,28 | Priapismi signa. | 87,26 |
| Oesophagi malè affecti signa. | 59,7 | Priapismi nomen unde. | 87,31 |
| Ophthalmia signa. | 36,3 | Priapismi cause. | ibidem,34 |
| Ophthalmia quid. | ibidem,6 | Pulmonis obstructi signa | 40,20 |
| Ophthalmia causa. | ibidem,16 | Pulmonis affectuum cognitio, cur ob- scura. | 47,13 |
| Ofcitatio unde. | 12,9 | Pulmonis obstructi cause. | 40,24 |

P

| | |
|---|-----------|
| Pandiculatio quando fit. | 117,28 |
| Parotidis nota. | 38,12 |
| Paroxysmus criticus cur anticipet. | 22,10 |
| Partus difficilis signa. | 116,3 |
| Partus difficilis cause. | 116,9 |
| Peripneumonia signa. | 41,27 |
| Peripneumonia duplex. | 42,1 |
| Pestilentis febris signa. | 56,15 |
| Pestis quid. | ibidem,34 |
| Phthiseos signa. | 42,34 |
| Pituitæ superantis indicia. | 8,20 |
| Pituita dominante pulsus mollis, par- uus, ac tardus est. | 9,6 |
| Phlegmone quid. | 81,11 |
| Phlegmones vere signa. | 38,15 |
| Plethore signa. | 3,35 |
| Plethora quid. | 4,3 |
| Pleuritidis nota. | 45,36 |
| Pleuritis quid. | 46,3 |
| Pleuritis quotuplex. | 46,4 |
| Phrenitidis signa. | 28,6 |
| Phrenitis quid. | ibidem,24 |
| Phrenitidis causa. | ibidem,29 |
| Phrenitici cur loquaces. | 29,10 |
| Pregnantium morbi. | 113,3 |
| Pregnantes bene habitæ, nihil incom- modi toto gestationis tempore patiun- tur. | ibidem,10 |
| Pregnantibus lenè pharmacum præ- scribi debet. | ibidem,32 |
| Pregnantes cacochymæ medio gesta- tionis tēpore debent repurgari. | 114,4 |
| Pregnatiū oculi cur languent. | 109,38 |

| | |
|--|-----------|
| Priapismi signa. | 87,26 |
| Priapismi nomen unde. | 87,31 |
| Priapismi cause. | ibidem,34 |
| Pulmonis obstructi signa | 40,20 |
| Pulmonis affectuum cognitio, cur ob- scura. | 47,13 |
| Pulmonis obstructi cause. | 40,24 |
| Pulsus, accessionis initio, cur parvus ac contractus. | 12,33 |
| Pulsus inæqualitas in febre putrida, cur. | 13,12 |
| Purulentorum signa. | 44,14 |
| Purulentorum signa salutaria. | 45,20 |

Q

| | |
|--|-----------|
| Quartana signa. | 52,16 |
| Quartana divisio. | ibidem,23 |
| Quartana frigus quale, & cur tale sit. | ibidem,33 |
| Quotidiane signa | 48,12 |
| Quotidiane materia | 49,6 |
| Quotidiana cur nocturnas habet ac- cessiones. | 49,15 |

R

| | |
|--|-----------|
| Renum imbecillitatis nota. | 79,15 |
| Renum dolor cur fixus. | ibidem,24 |
| Renum inflammationis nota. | 81,3 |
| Renibus inflammatis, cur vicinum crus torpet. | ibidem,20 |
| Renum abscessus signa. | 82,14 |
| Renum inflammationi quare superue- nit abscessus. | ibidem,19 |
| Renum ulcus cur insanabile. | 83,5 |
| Rigor febrium causa. | 83,5 |

S

| | |
|---------------------------|-------|
| Salutaris morbi signa. | 16,11 |
| Sanitatis perfectæ signa. | 2,3 |
| Sanitas duplex. | 3,15 |

INDEX.

| | | | |
|--|------------|--|------------|
| Sanguine domināte, qualis pulsus. | 3, 37 | Tenesmus quid. | ibidem, 20 |
| Sanguine superante, cur difficilis incessus. | 4, 11 | Tenesmo correpti, cur ad excernendum saepius inuitantur. | ibidem, 27 |
| Scirrhus quid. | 64, 21 | Tertiana signa. | 50, 21 |
| Semen unde deciduum. | 88, 35 | Tertiana febris, et causus, in quo consentiant, ac discrepent. | 50, 29 |
| Serosi humoris copia, quid indicet. | 9, 26 | Tertiana pulsus unde durus. | 51, 21 |
| Signa cruditatis. | 25, 9 | Transpiratio. | 99, 22 |
| Signa coctionis, unde petuntur. | 24, 14 | Tremor unde. | 53, 5 |
| Signum quid. | 1, 17 | Tumoris flatuleti ab aqueo distinctio. | 107, 19 |
| Signorum genera. | ibidem, 21 | Tussis quid. | 46, 26 |
| Singultus, unde. | 14, 23 | Tussi reiectus è pulmone sanguis, cur dolorem non infert. | 47, 12 |
| Sitis quid. | 68, 18 | Tympanites ab uteri flatulento tumore què distinguitur. | 107, 5 |
| Sitis duplex. | ibidem | | |
| Sitis unde. | 51, 15 | | |
| Somnus nocturnus cur utilis. | 17, 1 | | |
| Sopor causa. | 19, 10 | | |
| Soporosorum affectuum signa. | 30, 25 | | |
| Sordes quid. | 25, 26 | | |
| Spiritus visorius, quando plus minusve videndi vim impertit. | 36, 30 | | |
| Status signa. | 13, 15 | | |
| Sterilitatis cause. | 95, 16 | | |
| Sternutamenta quid indicant. | 17, 12 | | |
| Stertor unde. | 33, 7 | | |
| Stomachi malè affecti signa. | 59, 7 | | |
| Stridor dentium unde. | 33, 14 | | |
| Sudor quid. | 15, 33 | | |
| Sudor bonus, qui. | ibidem | | |
| Suffusionis note. | 37, 8 | | |
| Suffusio duplex. | ibidem 12 | | |
| Suffusio quid. | ibidem, 25 | | |
| Supinum iacere, cur malum. | 19, 22 | | |
| Syncopes note. | 47, 28 | | |
| Synochi signa. | 49, 22 | | |
| Synochi materia. | ibidem, 27 | | |
| Synochus quotuplex. | ibidem, 30 | | |


T


| | | | |
|------------------------------------|-------|----------------|--------|
| Tempora cur in febris collabuntur. | 25, 6 | Tenesmi signa. | 77, 16 |
|------------------------------------|-------|----------------|--------|


INDEX.


| | | | |
|---|-------|---|-------------------|
| <i>resque in dolore colico, quam nephritico.</i> | 74,12 | <i>Vteri calidioris mulieres cur salaces.</i> | 94,7 |
| <i>Vomitibus ex pituita & bile, cur laudatur.</i> | 17,20 | <i>Vteri frigidioris nota.</i> | <i>ibidem, 17</i> |
| <i>Vlcus boni malique moris, quod.</i> | 83,3 | <i>Vteri siccioris, & humidioris signa.</i> | 95,9 |
| <i>Vrinae varietas cur morbi longitudinem denunciet.</i> | 21,6 | <i>Vteri stragulatus nomen unde.</i> | 98,16 |
| <i>Vrina qualis in bile.</i> | 5,5 | <i>Vterini furoris nota.</i> | 99,33 |
| <i>Vrina qualis in melancholia.</i> | 6,19 | <i>Vterinus furor unde nomen habet.</i> | 100,5 |
| <i>Vrina qualis, pituita dominante.</i> | 8,23 | <i>Vterini furoris causa.</i> | <i>ibidem</i> |
| <i>Vrina qualis in Synocho.</i> | 49,22 | <i>Vterino furore quæ corripipi solent.</i> | <i>ibidem, 18</i> |
| <i>Vrina rubra, crassaque, cur.</i> | 64,15 | <i>Vteri debilis indicia.</i> | 102,28 |
| <i>Vrina alba, quid significet.</i> | 20,2 | <i>Vteri phlegmones signa.</i> | 103,14 |
| <i>Vrina loturae carniū recentium asinilis quid significet.</i> | 79,26 | <i>Vteri collum, cur inflamatur.</i> | <i>ibid. 23</i> |
| <i>Vrinae color & consistentia quid notet.</i> | 97,23 | <i>Vteri colli substantia.</i> | <i>ibidem, 24</i> |
| <i>Vteri calidioris signa.</i> | 93,6 | <i>Vteri phlegmones causa.</i> | <i>ibidem, 29</i> |
| | | <i>Vteri tensi nota.</i> | 106,33 |
| | | <i>Vteri corpus quale.</i> | 108,14 |


FINIS.

















te p
pate
Lap p
m p r
casu

9

30

ccc

70